實用植物圖說

朱義方著

中科院植物所图书馆
S0020369

上海新學會社出版

實用植物圖說

甬上張美翊題

例言

一本書為各校學生及實業家參攷自修而輯。故文字務求簡易。不尚高深。

一本書為一般研究植物者記載我國山野之普通植物。為研究地理學者記載外國所產之著名植物。為農工商業家記載內外有用之植物。為研究藥劑者記載藥用植物。

一本書以練習觀察植物之力。使知利用厚生之道。及高尚優美之思想。

一本書之次序。案恩孤來路氏自然分類表而定。先由下等植物起。然後漸及高等植物。

一本書之體例。以日本齋田功太郎佐藤禮介所編之內外實用植物圖說為標準。其他松村任三齋田功太郎之中等植物教科書。

一本書經膠東鞠思敏日本福山維吉諸夫子校閱鄭雲笙朱蓮亭諸夫子亦時賜珍貴助言茲特附筆誌之以表謝忱

中華民國八年十二月　譯者識

齋田功太郎之最近博物學等書亦多引用之

一本書圖畫除用植物圖說之原圖外餘均係植物寫生以期明晰可觀

一本書因植物名稱多係音譯故於各圖之下特注學名俾便查考

一本書於自然分類表前特設漢字索引表此表案植物名詞第一字筆畫之多寡而定且注明頁數至自然分類表及學名表亦注有頁數翻檢查考悉覺便利

一各植物名稱本擬全用漢名但植物繁博無漢名者多不得已以音譯之名下註漢字者為漢名註日字者為日名註拉字者即拉丁係譯學名之音使閱者一目了然省去核對之功

一本書所用術語與普通不同如根莖塊莖改為根狀莖塊狀莖等皆是又圖說內之為植物用途者皆低一格寫以示區別

漢字索引（按植物名詞字數及筆畫之多寡順序排列）

一字

六—八畫

朽（日）三二三
米（漢）四九
艾（漢）五二三
杉（漢）三八
李（漢）二五〇
杏（漢）二三七
芹（漢）三八〇
芒（漢）五七
芥（漢）二一六

九畫

柾（中俗）三二一
柑（漢）二九七
枹（漢）一三六
柊（日）四〇七
柃（日）三四四
柹（漢）四〇〇
柳（漢）一二七
柿（漢）四〇〇
栂（日）三八
柏（日）一三五
柚（漢）二九八
茄（漢）四四六
苳（日）五二〇
韭（漢）一〇〇

十畫

桃（漢）二五七
桐（漢）四五三
桂（漢）二〇七
栗（漢）一三六
桑（漢）一四五
茶（漢）三四二
茗（漢）三四二

十一畫

梅（漢）二三七
梨（漢）二五三
荻（漢）五〇一
荻（漢）二八二
莞（漢）六七
梓（漢）四五九
崧（漢）四〇六

十二畫

匏（漢）四八四
椈（漢）一三八
椅（漢）三五四
椙（日）三八
棗（漢）三二八
菱（漢）三六九
堇（日）三五二
菊（漢）五〇三
栗（漢）四八

01237

實用植物圖說

總目

漢字索引表
恩孤來路氏自然分類一覽表
術語圖解
植物分科圖說
學名索引表

二十—二十二畫
蘆（漢）六四
櫨（漢）三一三
蘋（漢）二四
櫻（日）二四六
櫸（漢）一四〇
二字
一—二畫
一位（日）三〇
一葉（漢）一〇二
人參（漢）三七四
人參（日）三八三
丁子（日）三六五
丁香（漢）三六五
十藥（日）一二四
刀豆（漢）二八〇
力草（漢）六〇
三畫
大豆（漢）二七七
大青（漢）二一八
大麻（漢）一四二
大麥（漢）五〇
大根（日）二一八
大黃（漢）一六二
大戟（漢）三〇八
大蘭（漢）六七
大蓼（漢）一八九
山榆（漢）一五〇
山茹（漢）四二〇
山吹（日）二五八
山藥（中俗）一〇九
山茶（漢）三四三
山椒（漢）二九五
山東（日）一八〇
山蒜（漢）一〇二
山漆（日）三一四
小麥（漢）五五
三手（日）三七二
小蘗（漢）一九九
三股（日）三六〇
千兩（日）一二五
川穀（漢）五六
土參（漢）三七四
女貞（漢）四〇六
小茄（日）三九八
小車四畫四九五
木萩（日）二六八
木瓜（漢）二四四
木蓮（漢）二〇二
木耳（漢）一〇
木槿（漢）三三七
木賊（漢）二六
木棉（漢）三三九
木犀（漢）四〇七
木蘭（漢）二〇二

十三畫

瓠（漢）四八六
楮（漢）一四三
榊（日）三四一
椿（日）三四三
楝（漢）三〇一
楢（日）一三六
楓（漢）二三五
葫（漢）一〇一
葱（漢）一〇一
葛（漢）二六九
菰（漢）六三
椵（日）四二
粳（漢）四九
榆（漢）一四一

十四畫

蒜（中俗）一〇一
榛（漢）一三一
榎（日）一四〇
槐（漢）二六四
構（漢）一四四
蓍（漢）五一七
葦（漢）六四
稗（漢）六〇
槙（日）三二

十五畫

樟（漢）二〇六
樅（漢）四二
槲（漢）一三五
稷（漢）五三
蓮（漢）一七八
榧（漢）三一
蓴（漢）一七八
蔦（日）三二九

十六畫

猶（漢）四二五
蕨（漢）十九
橡（日）三二三
橙（日）
穇（漢）六二
稻（漢）四九

十七—十九畫

蕗（日）五二〇
薄（日）五七
薤（漢）一〇四
薺（漢）二一九
薑（漢）一一五
薇（漢）二三
檜（日）四〇
檜（漢）四一
藤（俗）二八三
藜（漢）一六三
櫟（漢）一三五
櫧（漢）一三七
樒（日）二〇二
藍（漢）一五六

生馬(日)　四一六
生薑(漢)　一一五
令法(日)　三八六
半夏(漢)　七四
玄參(漢)　四五五
目木(日)　一一九
片栗(日)　八八
瓜木(日)　三八五

六畫

地柏(漢)　二八
地黃(漢)　四五七
地錢(漢)　一四
地錦(漢)　三二九
地膚(漢)　一六六
合萌(漢)　二六八
合歡(漢)　二八二
百合(漢)　九四
百部(漢)　八一
羊蹄(漢)　一六〇
羊桃(漢)　二八九
吉納(日)　二六七
西瓜(漢)　四八二
灰菜(中俗)　一六三
朴樹(漢)　一四〇
肉桂(日)　二〇九
江蘺(漢)　六
血櫧(漢)　一三三
竹柏(漢)　三一
吐根(日)　四七〇
米栴(日)　三七

七畫

赤花(日)　三六七
赤茄(日)　四四三
赤根(日)　四六四
赤松(漢)　三三
赤楹(漢)　一三三
赤芽(日)　二四〇
赤楊(漢)　一三二
赤苧　一五〇
杜松(日)　三九
杜松(漢)　四〇
杜衡(漢)　一五五
杉菜(日)　二五
沙木(漢)　三五
沙參(漢)　四八八
沈香(漢)　三五八
牡丹(漢)　一九二
牡蒿(漢)　四二七
牡荊(漢)　四九六
忍冬(漢)　四七四
泡吹(日)　三二五
忍草(日)　二
肝木(日)　四七二
車前(漢)　四六三
伽羅(日)　三五八
佛座(日)　四四〇

水仙（漢）一〇七　及已（漢）一二七　石蒜（漢）一〇八　甘草（漢）二六七
水瓜（日）四八二　五加（漢）三七一　石斛（漢）一二二　甘蘭（漢）二二〇
水芹（漢）三八〇　毛良（漢）一八四　石菖（漢）七六　甘蔗（漢）五五
水萍（漢）七七　日迴（日）五一九　石蓴（漢）三　甘藷（漢）四二〇
水蓼（漢）三八〇　犬覓（日）一六六　石岩（漢）一一三　甘藤（漢）一〇七
水鼈（漢）四七　王瓜（漢）四八〇　白果（中俗）二九　冬瓜（漢）四八四
牛膝（漢）一六七　勾堇（日）三五三　白樺（日）一三〇　冬青（漢）三一五
牛房（日）五〇六　犬樟（日）二〇六　白及（漢）一二一　玉蔥（日）九八
牛蒡（漢）五〇六　五畫　白桐（漢）四五三　玉簪（漢）九七
刈安（日）五二　石髮（日）二　白茅（漢）五九　玉蘭（漢）二〇三
刈萱（日）六五　石竹（漢）一七三　白葛（漢）七五　玉簾（日）一〇七
巴草（日）三四七　石松（漢）二七　白根（日）四三八　古加（日）二九一
巴豆（漢）三〇九　石南（漢）三九三　白樫（日）一三七　古柯（日）二九一
水綿（漢）二　石茸（漢）十三　白檀（漢）一五三　田麻（漢）三三一

岩梨(日) 三八九
卷柏(漢) 二七
岩鏡(日) 三九五
岩榔(日) 二二八
亞麻(漢) 二九〇
九畫
洋葱(中俗) 九八
枸杞(漢) 四四三
長果(中俗) 六
枳椇(漢) 三二八
洋槐(中俗) 二八七
柯樹(漢) 一三七
枸橘(漢) 二九二
秋羅 五二〇
枸骨(漢) 四〇七
科木(日) 五
苜蓿(漢) 二六三
垣通(日) 四三二
苦木(日) 二九九
苦瓜(漢) 四八三
苦草(漢) 四七
苦菜(日) 五一六
苦參(漢) 二七〇
苦蘵(日) 二四三
苦蘵(漢) 四四四
苦艾(日) 五一六
苧麻(漢) 一五二
苘麻(漢) 三三四
芳針(漢) 五九
芳蕈(漢) 一〇
紅花(漢) 二六三
紅著(漢) 五二一
香椿(漢) 四二〇
香瓜 四八五
香蕈(漢) 三〇一
香蒲(漢) 一一
茅菱(漢) 四三
扁柏(漢) 三六九
扁桃(日) 二九四
扁豆(漢) 二八四
胡荽(中俗) 一〇一
胡瓜(漢) 四八一
胡麻(漢) 四五九
胡荽(漢) 三八〇
胡椒(漢) 一二四
南天(日) 一九七
春蘭(日) 一二九
春菊(日) 五〇八
毒芹(日) 三八二
毒麥(日) 六三
省藤(漢) 七〇
建蘭(漢) 一二二
郁李(漢) 二五三
厚朴(漢) 二〇三

芍藥(漢) 一八七
附子(漢) 一九〇
角楤(日) 一三一
皂莢(漢) 二七二
芝草(日) 五六
辛夷(漢) 二〇一

八畫

姜豬(漢) 八三
花椒(中俗) 二九五
油桐(日)
油菜(日) 二一三
油菊(日) 四九一
泡桐(漢) 四五三
枇杷(漢) 二五五

松茸(日) 一一
芥菜(中俗) 二一六
松蕈(漢) 一一
松露(日) 一二
花柏(漢) 三七
岬芝(日) 二六
芸香(漢) 二九六
芫花(漢) 三五九
芭蕉(漢) 一一三
芡實(漢) 一七七
芝實(漢) 三六九
青木(日) 三八四
青芋(漢) 七五
青茅(漢) 五二

青桐(日) 三三九
青黴(日) 七
金松(漢) 三四
金柑(日) 二九三
金橘(漢) 二九三
金蘭(日) 一一八
虎杖(漢) 一五七
虎刺(漢) 四六五
虎掌(漢) 七三
乳香(漢) 三一二
乳樹(日) 三〇〇
狗槐(日) 二八七
忽布(日) 一四七

附子(漢) 一九〇
阿魏(日) 三七七
邪蒿(漢) 三七七
昆布(漢) 三
帚木(日) 一六六
刺楸(漢) 三七五
刺槐(日) 二八七
咖啡(漢) 四六九
岩桂(漢) 四〇七
玫瑰(漢) 二五四
泥樹(日) 一二八
和布(日) 五
兎菊(日) 四九三
卷丹(漢) 八六

荷花(中俗) 一七八
側柏(漢) 三六
淡竹(漢) 六一
梔子(漢) 四六八
梭木(漢) 三八九
梧桐(漢) 三三九
梅桃(漢) 二五八
杪欏(漢) 十六
菩菜(漢) 四一一
莽草(漢) 二〇二
莨菪(漢) 四四七
莢蒾(漢) 四七二
笠管(日) 六五
笠莎 六五
常山(漢) 二九四
商陸(漢) 二一三
球蘭(漢) 四八五
通草(漢) 四二
連翹(漢) 八二
敗醬(漢) 一二
黃柏(漢) 四六七
黃麻(漢) 二
黃梅(日) 四二一
釣花(日) 七四
黃華(漢) 三一二
雀稗(日) 四六〇
雀稗(日) 二五五
黃蓮(漢) 一九三
粗榧(漢) 三〇
掃帚(中俗) 一六六
黃櫨(日) 三一三
黃瓜(中俗) 四八一
黃蘗(漢) 二九三
十二畫
朝顏(日) 四一九
椎子(日) 一三七
椎蕸(日) 一一
棕梠(日) 六九
菜豆(漢) 二六三
圓棗(中俗) 四〇一
茶菜(漢) 一六五
董菜(漢) 三五三
雪柳(日) 二四五

厚子(日) 一三九
十畫
浮萍(中俗) 七七
海松(漢) 三九
海苔(日) 四六八
海棠(漢) 二三九
海帶(中俗) 三
海葱(日) 八八
芡白(中俗) 六三
海藤(漢) 三四六
砧草(日) 四六八
殺牛(日) 二四二
桓楨(日) 三二
桂圓(中俗) 三二四
桂皮(漢) 二〇七
桐壺(日) 四二九
俵麥(日) 五四
桔梗(漢) 四八六
狸豆(日) 二七四
荒布(日) 四
茆芷(漢) 六七
茜草(漢) 四六四
茴香(漢) 三七八
荔枝(漢) 三三五
茗荷(日) 一一六
茼蒿(漢) 五〇八
茨藻(日) 四五
草綿(漢) 三三八
草藤(漢) 二六九
馬蘭(漢) 四六一
馬棘(漢) 二七一
馬蓼(漢) 一五八
烏木(漢) 四〇〇
烏瓜(日) 四八〇
烏芋(漢) 六六
烏白(漢) 三〇九
烏麥(日) 五二
烏頭(漢) 一九〇
唐苣(日) 一六五
唐茄(日) 四八三
拳參(漢) 一五八
射干(漢) 一一二
紅豆(漢) 一四六
桑草(日) 二五
旃那(日) 二七六
夏蔦(日) 三二九
夏椿(日) 三四三
臭橙(漢) 二九六
秦椒(漢) 二九五
秦椒(中俗) 四四五
素馨(漢) 四〇五
鬼縛(日) 三五七
豇豆(漢) 二七二
十一畫

葈耳(漢) 四九七
萵苣(漢) 五一四
葡萄(漢) 三三一
葵菫(日) 三五〇
蓖麻(漢) 三〇七
葶藶(漢) 二一四
裏白(日) 二二
瑞香(漢) 三五九
搗布(日) 四
費菜(漢) 二二五
煙草(漢) 四四五
蜀葵(漢) 三三五
雌松(漢) 三二
鼠李(漢) 三二七

鳩麥(日) 六一
睡蓮(漢) 一七九
當藥(日) 四一三
鈎藤(漢) 四六六
貉藻(日) 二二四
鈎樟(漢) 二〇七

十四畫

榔榆(漢) 一三九
穀樹(中俗) 一四四
榕樹(漢) 一四一
蒼朮(漢) 四九六
蒲桃(漢) 三六六
蒲葵(漢) 七一
蒲蘆(漢) 四八四

蒟蒻(漢) 七六
慈菇(漢) 四六
蓍萩(日) 二八六
蒴藋(漢) 四七五
漆樹(漢) 三一一
銀杏(漢) 二九
銀蘭(日) 一一九
酸模(漢) 一六一
酸醬(漢) 四四九
槖吾(漢) 五一五
壺蘆(漢) 四八六
鳳梨(漢) 七八
綿樹(日) 一二八
綿馬(日) 二二

遠志(漢) 三〇三
翠菊(漢) 四九四
糀菌(日) 八
熊柳(日) 三二七
鳶尾(漢) 一一〇
實櫻(日) 二五九
榮蘭(日) 四三
構莓(日) 二四〇

十五畫

槭樹(漢) 三二二
橘子(中俗) 二九七
蓪草(日) 三七三
淳菜(漢) 二一四
糊木(日) 二三二

蒟藻	(日)	四五三
萊菔	(漢)	二一八
菖蒲	(中俗)	七五
萎蕤	(漢)	八三
菘藍	(漢)	二一八
莵葵	(漢)	一八八
黑松	(漢)	三二
黑菜	(漢)	四
黑藻	(日)	四六
紫芝	(漢)	一二
紫草	(漢)	四二四
紫菜	(漢)	六
紫蕚	(漢)	九〇
紫菫	(漢)	二一二
紫菀	(漢)	五〇八
紫荊	(漢)	二八三
紫威	(漢)	四五八
紫藤	(漢)	二八三
紫檀	(漢)	二七三
紫薇	(漢)	三六二
紫蘇	(漢)	四三七
紫蘭	(日)	一二一
紫珠	(漢)	四二八
絡石	(漢)	四一五
絲瓜	(漢)	四八五
絲葱	(漢)	八二
結香	(漢)	三六〇
娵菜	(日)	五二二
雁皮	(日)	三五七
御形	(日)	五一七
御柳	(漢)	三五〇
棒子	(中俗)	五八
景天	(漢)	二二五
雄松	(日)	三二
越橘	(漢)	三九二
雲實	(漢)	二七三
款冬	(漢)	五二〇
鹿藿	(漢)	二七九
菝葜	(漢)	九五
十三畫		
蜜柑	(日)	二九七
葧薺		六六
溲疏	(漢)	二二八
辣火		四四五
溪蓀	(漢)	一〇九
雉席	(日)	二四四
楤木	(漢)	三七三
椰子	(漢)	七二
楊桐	(漢)	三四一
楊梅	(漢)	一二八
楊櫨	(漢)	四七五
榲桲	(漢)	二五六
葎草	(漢)	一四五
葒蓼	(中俗)	一五九
葒草	(漢)	一五九
葉蘭	(日)	一〇二

櫰槐（漢）	二六二	藤袴（日）	五二一	三字		三畫	
蘇方（漢）	二七五	蘘荷（漢）	一一六	一—二畫		大麻子（中俗）	四四六
蘇鐵（日）	二九	纈草（日）	四七八	一輪草（日）	一八一	大丁草（漢）	五一二
蘆薈（漢）	一〇五	二十二—二十六畫		二葉葵（日）	一五六	大鬼蓮（日）	一七六
穭豆（漢）	二七九	藕木（日）	三一八	二輪草（日）	一九二	大角豆（日）	二七二
臘梅（漢）	二〇四	巖桂（漢）	四〇七	七島藺（日）	六七	大馬蓼（漢）	一五九
藤豆（日）	二八四	蘿摩（漢）	四一七	七葉樹（漢）	三二三	大葉藻（漢）	四四
藤黃（漢）	三四六	蘿蔔（漢）	二一八	八仙花（漢）	二二六	小葉梣（漢）	四〇三
蘗木（漢）	二九三	鷺草（日）	一二〇	八重葎（日）	四七一	小豆蔻（日）	一一六
鐵樹（中俗）	二九	鱧腸（漢）	五一三	九年母（日）	二九四	小卷丹（漢）	九三
蘭菊（日）	四二六	靈芝（日）	一二	九輪草（日）	三九七	小巢菜（漢）	二七四
蘭草（漢）	五二一	鷗蔓（日）	四一八	九蓋草（日）	四五四	小雁皮（日）	三五八
蘭蕉（漢）	一一七	蠶豆（漢）	二七六	九階草（日）	四五四	小連翹（漢）	三四五
蘡薁（漢）	三二九	鬱金（漢）	一一四	十二單（日）	四三九	小鹽竈（日）	四五六

蔦漆(日)　三一二
塔花(日)　四三六
蔦蘿(漢)　四二二
駒草(日)　四一一
豌豆(漢)　二六五
箙藤(日)　二六四
箬竹(漢)　六四
蝦根(日)　一一八
二四三
櫨子(漢)　四四
蝦藻(日)

十六畫

蕁麻(漢)　一五一
澤蘭(日)　一二〇
澤瀉(漢)　四五

蕃杏(漢)　一七〇
櫻樹(中俗)　二八七
蕪菁(漢)　二一五
蕎麥(漢)　一六一
蕓薹(漢)　二一三
蕃椒(漢)　四四五
蕨苑(漢)　五一七
蕺草(漢)　三三五
龍眼(漢)　三三五
龍腦(漢)　三二〇
龍鬚(日)　一一七
龍膽(漢)　隱蔽(日)　四四〇
繁縷(漢)

十七畫

薄荷(漢)　四一
檜柏(漢)

檜扇(日)　一一二
櫻柳(漢)　三五〇
檀特(日)　一一七
檀香(漢)　一五三
藍草(漢)　六一
藜蘆(漢)　四八八
蹙麥(漢)　一二四
鷄冠(漢)　三二四
鎌柄(日)　三四九
爵牀(漢)　九六

十九　二十一畫

檸檬(日)　四一四
鵲豆(漢)　三七二
麹菌(日)　一七五
櫻草(日)

雛菊(日)　四九五
一〇九
六九
五四
九七
一七二
一六七
二四二
四六五
二九八
二八四
八
三九八

十八畫

五敬子(漢)　二八九
五釵松(漢)　三六
牛皮消(漢)　四一六
牛尾菜(漢)　九五
牛繁縷(日)　一七二
不斷草(日)　一六五
心太草(日)　七
孔雀草(日)　一八
父子草(日)　五一四
公孫樹(漢)　二九
元日草(日)　一九一
木栓樹(日)　一三八
犬黃楊(日)　三一五
犬胡麻(日)　四三〇
犬雁皮(日)　三五八
五畫
布袋草(日)　一一九
母子草(日)　五一七
立壺菫(日)　三五二
田五加(日)　五一三
瓦尼拉(拉)　一二三
田平子(日)　四二四
白菜脯　二一八
白山吹(日)　二五〇
白鶴花(中俗)　九七
白木蓮(日)　二〇三
白根葵(日)　一九一
白花菫(日)　三五一
白娥菜(日)　五一〇
白屈菜(漢)　二一〇
白粉花(日)　一六九
白頭翁(漢)　一八二
石呆樹(俗)　三一〇
石刁柏(漢)　八七
石花菜(漢)　七
石鹹樹(日)　二五九
石菖蒲(漢)　七六
石龍芮(漢)　一八九
石蓉蓼(漢)　四三〇
石蘞草(漢)　一七四
加麻剌(日)　三〇六
古倫僕(日)　二〇〇
玉羊齒(日)　一
玉蜀黍(漢)　五八
仙台萩(日)　二七五
仙人車菊(日)　五二四
仙人頭(中俗)　三五六
六畫
羽子木(日)　一五二
合子草(漢)　四八一
百日紅(漢)　三六二
百日草(日)　五二〇
百脈根(漢)　二八五
光梗紅(中俗)　二八三
向日葵(漢)　五一九
光椰子(漢)　七〇

小白根(日)　四三四
山小菜(漢)　四八九
小梅形(日)　九六
山牛蒡(日)　一六九
小判草(日)　五四
山毛欅(漢)　一三四
小夏椿(日)　三四四
山白竹(漢)　六四
山百合(日)　一〇五
山苦蕒(漢)　四九〇
山菜萸(漢)　三八六
山扁豆(漢)　二六六
山胡桃(漢)　一二九
山荷葉(漢)　一九六
山菜豆(漢)　二八一
山蕎菜(漢)　二二〇
山梗菜(漢)　四八七
山慈姑(漢)　八三
山槌子(漢)　二四七
山櫻桃(漢)　二五八
山蘿蔔(漢)　四七九
千日草(日)　一六八
千日紅(漢)　一六八
千本鎗(日)　五一二
千屈菜(漢)　三六二
千兩草(漢)　五〇七
三色菫(日)　三五一
三葉芹(日)　三八四
土馬騣(漢)　一五
千日菊(日)　五〇五
土常山(漢)　二二七
土當歸(漢)　三七一
千竹草(日)　二三二
　四畫
水竹葉(漢)　七九
水苦蕒(漢)　四五二
水晶蘭(漢)　三八七
水楊梅(漢)　二五二
　十七
水龍骨(漢)　四〇三
水蠟樹(漢)　三四一
木天蓼(漢)　三六一
木、半夏(漢)
木防己(漢)　一九九
木珊瑚(日)　四七三
木芙蓉(漢)　三三六
木藜蘆(漢)　三九五
木角豆(日)　四五九
天仙果(漢)　一四三
天門冬(漢)　九一
天南星(漢)　七七
日日草(日)　四一六
月見草(日)　三六八
月季花(漢)　二三九
月桂樹(日)　二〇八
毛連菜(漢)　四九八
毛氈苔(日)　二二三

青藜蘆　八二
青夾葉（漢）　三七五
花菖蒲（日）　一一二
花蘇芳（日）　二八三
金絲桃（漢）　三四八
金花菜（漢）　二六三
金絲梅（漢）　三四六
佩蘭葉　五二一
金魚藻（日）　一七九
金錢荊（中俗）　五一一
金魚草（日）　四五四
金粟蘭（漢）　一二六
金盞草（漢）　五〇五
金線草（漢）　一六三
金蓮花（漢）　二九〇
金銀木（日）　四七三
金縷梅（漢）　二三六
長春花（漢）　二三九
長壽花（漢）　一〇六
虎耳草（漢）　二三三
孟宗竹（日）　六二
吳茱萸（漢）　二九五
狗尾草（漢）　四九
狗酸醬（漢）　四四二
宜母子（漢）　二九八
東風菜（漢）　五〇九
第切草（日）
枝垂柳（日）　一二七
知風草（漢）　五一
岩澤瀉（日）　一七
岩高蘭（日）　三一〇
迎春花（漢）　四〇八
柿葉草（日）　三〇二
委陵菜（漢）　二四一
狐刺刀（日）　一〇六
延齡草（日）　八五
金雀枝　二六三
九畫
爬山虎（中俗）　三二九
泡芙蘭（日）　一一一
秋丁子（日）　四二九
紅葉葵（日）　三三七
秋牡丹（漢）　一八六
秋海棠（漢）　三五五
南天竹（漢）　一九七
南京豆（日）　二八一
括朱亞（拉）　二九九
毒人參（日）　三八二
毒空木（日）　三一一
胡枝子（漢）　二八二
胡頹子（漢）　三六一
指甲桃（俗）　三二六
苦苣苔（漢）　四六一
苦楝子（漢）　二九九
待霄草（日）　三七〇
茅膏菜（漢）　二二二

血止草(日) 三八一
西洋梨(日) 二五二
西洋莓(日) 二三八
回回蒜(漢) 一八三
肉豆蔻(漢) 二〇五
老鴉眼(中俗) 三三〇
　七畫
虫捕堇(日) 四六二
老利皃(日) 二〇八
吉祥草(漢) 八九
安石榴(漢) 三六三
安息香(日) 四〇一
江南竹(漢) 六二
羊栖菜(漢) 五
杜鵑花(漢) 四四三
交讓木(漢) 三一〇
多羅葉(日) 三一七
伊蘋葛(漢) 四一七
西洋莓(日) 二三八
行儀芝(日) 五三
阿列布(日) 四〇四
阿足示(日) 一三九
阿仙藥(日) 二六〇
沙列布(日) 一二一
杠谷樹(日) 四〇七
阿仙藥(日) 四六四
杠板歸(漢) 一五七
杜鵑花(漢) 三九三
牡丹蔓(日) 一九四
里木子(漢) 二九八
赤小豆(漢) 二六〇
延命菊(日) 四九五
赤芽槲(日) 三〇四
　八畫
夾竹桃(漢) 四一四
車百合(日) 九二
貝細工(日) 五〇〇
車輪梅(日) 二四九
君影草(日) 九〇
車葉草(日) 四六九
君遷子(漢) 四〇一
男郎花(日) 四七七
佐保姫(日) 四五七
扶芳藤(漢) 三二〇
防臭木(日) 四二八
含羞草(漢) 二七八
夜繁花 一六九
使君子(漢) 三六四
治癇草(日) 四三二
依蘭苔(日) 一三
刺酸漿(日) 四四二
泥胡菜(漢) 五〇四
沿階草(漢) 九六
波羅樹(漢) 三一七
油點草(漢) 一〇三

蚊母樹（漢）二三四
徐長卿（漢）四一九
夏坊主（日）三五七

十一畫

盜人荻（日）二八一
喇叭花（中俗）四四六
婆婆納（漢）四五〇
娑羅樹（漢）三四九
淫羊藿（漢）一九六
旋覆花（漢）四九五
旌節花（漢）三四五
排草香（漢）四三三
接骨木（漢）四七六
通泉草（漢）四五六
通脫木（漢）三七三
硃砂根（漢）三九六
瓶子草（日）二二一
清風藤（漢）三二六
野木瓜（漢）一九五
野決明（漢）二七五
野芝麻（漢）四三二
野嗇薇（漢）二五四
笹龍膽（日）四一四
雀豌豆（日）二七四
雀鉄砲（日）五七
蛇葡萄（漢）三三〇
剪刀股（漢）五一九
剪夏羅（漢）一七三
密兒拉（日）三〇〇
麥角菌（日）九
牽牛子（漢）四一九
常春藤（漢）三七二
黃大豆（漢）二七七
黃心樹（漢）二〇〇
黃瓜菜（漢）五一六
黃花蒿（漢）五〇六
黃梔花（漢）四六八
甜醬蓋（日）三七二
黃蘿蔔　三八三
黃素馨（日）四〇五
黃蜀葵（漢）三三六
釣蟹草（日）五一
黃瑞香（漢）三六〇
荷蘭芹（日）三七九
猪殃殃（漢）四七一
荷蘭莓（日）二三八
猪籠草（漢）二二二
畦蕃椒（日）四五〇
野蘿蔔（漢）二二一
梅鉢草（日）二二九

十二畫

紫茉莉（漢）一六九
紫金牛（漢）三九六
紫陽花　二二六
紫玉簪（中俗）九〇
敦盛草（日）一一七

珍珠菜(漢)　三九九
珍珠花(漢)　二四五
風輪菜(漢)　四三四
風露草(日)　二八八
砂糖黍(日)　五五
砂糟風(日)　三二三
咱芙蓉(日)　一一一
眉掃草(日)　一二六
香香草(中俗)　五一
香茶菜(漢)　四二九
看麥娘(漢)　五七
相思子(漢)　二七七
柳穿魚(漢)　四五一
柳葉菜(漢)　三六七
柳葉桃(中俗)　四一四
毒蘿蔔(日)　三八二
紅空木　四七五
胡羅蔔(漢)　三八三
珊瑚樹(日)　四七三
美男葛(日)　二〇一
姚芽櫥(日)　一三四
十畫
粉米草(日)　四五五
凌霄花(漢)　四五八
桔梗蘭(日)　九一
酒母菌(漢)　八
海苔菜(日)　二
海金砂(漢)　二三
高野帚(日)　四九八
海桐花(漢)　二三三
海老根(日)　一一八
浦島草(日)　七三
熊谷草(日)　一一九
桃金孃(漢)　三六五
粉米花(日)　二四五
草石蠶(漢)　四三九
起苦樹(日)　四二七
草牡丹(日)　一八五
草珊瑚(漢)　一二五
笑靨花(漢)　二四七
馬齒莧(漢)　一七〇
馬兜鈴(漢)　一五四
馬鈴薯(漢)　四四四
馬錢子(漢)　四一〇
馬鞭草(漢)　四二六
馬來亘　五二二
唐胡麻(日)　三〇七
唐花草(日)　一四六
烏藪苺(漢)　三三〇
唐松草(日)　一八四
迷迭香(漢)　四四一
唐冬青(日)　二三四
唐三手(日)　三七二
厚皮香(漢)　三四五
狼把草(漢)　五一二
狼尾草(漢)　五九

槐葉蘋(漢)　二四
廣心樹(漢)　二〇〇
構槭樹(日)　三二二
蒲公英(漢)　五一三
廣葉杉(日)　三五
樟牙菜(漢)　四一〇
酵母菌(日)　八
銀線草(漢)　一二六
腐敗菌　一
熊竹蘭(日)　一一五
鳳仙花(漢)　三二六
鳳尾松(漢)　二九
滿江紅(日)　二五
榎木草(日)　三〇五
漆枯草(漢)　一七五
十五畫
蝌蚪葉(日)　四六五
撒爾沙(日)　九四
蔓梅擬(日)　三一九
撒兒沙(日)　九四
蓬蒿菜(中俗)五〇八
蔓苔桃(日)　三九二
蝴蝶董(日)　三五一
蝴蝶花(漢)　一一一
蝴蝶樹(漢)　四七七
積雪草(日)　四三二
醉魚草(漢)　四〇九
糊空木(日)　二三二
諸葛菜(漢)　二二一
數珠玉(日)　五六
輪峯菊　四七九
穀精草(漢)　七八
編笠草(日)　三〇五
十六畫
漿瓣草　三九二
蕃南瓜(漢)　四八三
頭髮菜(日)　六
酸簞木(日)　四七三
澤胡桃(日)　一二九
蕃石榴(漢)　三六六
蕃瓜樹(漢)　三五五
蕃紅花(漢)　一一一
蕃荔枝(漢)　二〇四
鴨兒芹(漢)　三八四
鴨跖草(漢)　七九
燈心草(漢)　八〇
錦帶花(漢)　四七六
錦鷄菊(日)　五〇四
戰捷木(日)　七一
麵包樹(日)　一四八
十七畫
濱木斛(日)　二四九
濱防風(日)　三八三
龍舌蘭(日)　一〇八
燕子花(漢)　一一〇

鹿尾菜(日)　五
鹿蹄草(漢)　三八七
黑文字(日)　二〇七
黑百合(日)　九二
富士松(日)　四一
菠薐菜(漢)　一六五
菟絲子(漢)　四二〇
菲沃斯(日)　四四七
萍連草(漢)　一七七
菩提樹(日)　三三三
菩提樹(漢)　一四九
無患子(漢)　三二四
富貴花(中俗)　一九二
無花果(漢)　一四二
絞股藍(漢)　四八〇
棣棠花(漢)　二五八
筋骨草(漢)　四三九
十三畫
番木鼈(漢)　四一〇
雁來紅(漢)　一六八
博落迴(漢)　二一一
裙帶菜(漢)　五
酢漿草(漢)　二八九
朝鮮松(日)　三九
結縷草(漢)　五六
硫黃菌　一
紫丁香(中俗)　四〇九
雄刈萱(日)　五〇
笄石菖　八〇
琴柱草(日)　四三五
棕梠草(日)　九七
十三畫
獅子頭(日)　二十
葉下珠(漢)　三〇七
福壽草(日)　一九一
葉牡丹(日)　二二〇
葉鷄頭(日)　一六八
落花生(漢)　二八一
落葉松(漢)　四一
落霜紅(漢)　三一六
落新婦(日)　二三七
藥刺巴(日)　四二一
蒲蕎麥(日)　一六二
萬年青(漢)　八六
萬壽果(漢)　三五五
萬壽菊(漢)　五一一
猿猴草(日)　一八二
蜀羊泉(漢)　四四八
碎米薺(漢)　二一九
齊墩果(漢)　四〇二
遏藍菜(漢)　二一六
道灌草(日)　一七四
鈴子香(漢)　四三七
鼠尾草(漢)　四二九
鼠麴草(漢)　五一七
十四畫
廣東葱(中俗)　九八

加耶布的(日)三六四
加加阿木(日)三四〇
加密皃列(日)五〇二
大文字草(日)二三一
巴那麻草(日)七三
卡塞恩草(日)四九九
井口邊草　一五
夫苦席阿(拉)三六九
天狗菓菌(日)　九
卡斯麻草(日)二六五
由加利樹(日)三六五
大山玄參(漢)四五二
大琉璃草(日)四二三
大婆婆納(日)四五一
古司白里(英)二三〇
玉紫陽花(日)二三一
六—八畫
阿路坑那(拉)四二三
西洋山葵(日)二一七
西洋赤根(日)四七〇
虫捕撫子(日)一七六
拉愛那拉(拉)一一四
西洋林檎(日)二五一
松葉牡丹(日)一七一
西洋鋸草(日)五一〇
岩柳葉菜(日)三六八
西洋薔薇(日)二五一
考盧苦櫟(拉)一三三
赤治風露(日)二八八
阿那那速(拉)　七八
別刺敦那(拉)四四八
地獄荃蓋(日)四三五
波羅密樹(漢)一四八
河原松葉(日)四六七
考考凹木(日)三四〇
金銀蓮花(漢)四一一
岩南天竹(日)三九〇
米葉拇櫻(日)三九四
尾狀羊齒
九畫
南五味子(漢)二〇一
兗州卷栢(漢)　二八
砂糖大根(日)一六四
秋鼠麴草(日)四九一
秋胡頹子(日)三六〇
秋之賢菜(日)四九〇
耶僕蘭日(日)二九七
刺賢垤爾(日)四四一
為朝百合(日)　九九
持子羊齒(日)　十六
郡內風露(日)二八七
十畫
馬乍子菜(中俗)一七〇
海州常山(漢)　四二五
蚊屋弔草(日)　六六

駿河蘭(日) 一二二
耬斗菜(漢) 一九三
龍芽草(漢) 二四二
薄雪草(日) 四九三

十八畫

鵞腸腸(漢) 一七五
檳榔子(漢) 七二
癒瘡木(日) 二九一
轉子蓮(漢) 一八三
鷄兒腸(漢) 五二二
鷄腸草(漢) 四二四
鵝漿果(英) 二三〇

十九畫

蠍子草(中俗) 一五一
藪柑子(日) 三九六
蠅捕草(日) 二二三
蟹蝙蝠(日) 五〇〇
羅望子(漢) 二七八
羅漢栢(漢) 三三
羅漢松(漢) 三二
蟻塔草(日) 三七〇

二十畫

麗春花(漢) 二一二
蘇合香(日) 二三五
罌子桐(漢) 三〇五
罌子粟(漢) 二〇一
鵯上戶(日) 四四八

二十一—二十二畫

攝涅瓦(日) 三〇三
露兜樹(日) 四三
獼猴桃(漢) 三四〇
繡線菊(漢) 二四八
鐵刀木(漢) 三四七
鐵掃帚(漢) 二八六
鐵線蓮(漢) 一九〇
懸鈎子(漢) 二四一
變豆菜(漢) 三七八
護謨樹(日) 一四七
龜葉草(日) 四三三

二十四—二十九畫

釀母菌(日) 八
鹽膚木(漢) 三一三
鹽皂草(日) 四五七
蠶繭草(漢) 一六〇
鬱金香(漢) 八四

四字

一—五畫

八角金盤(漢) 三七六
十大功勞(漢) 一九八
千成酸漿(日) 四四四
三葉通草 一九五
王不留行(漢) 一七四
水石龍芮(日) 二一五
毛白辛樹(日) 四〇二
天竺牡丹(日) 五一五
孔雀羊齒(日) 一八

加剌拔兒豆(回)二六六
五葉山蘿蹼(日)三九一
加斯加利剌(日)三〇六
大葉馬兜鈴(漢)一五五
大葉白辛樹(日)四〇二
大葉水蠟樹(漢)四〇四

六—十畫

西洋接骨木(日)四七四
洋馬芹子菜(中俗)一七二
伊吹鈴子香(日)四三一
海州骨碎補(漢)二一
恰白茲耶子(日)六八
勞孤吳島樹(日)二七九
草本威靈仙(漢)四五四
卡那比克草(日)一五二
印度護謨樹(日)一四七
烏華烏爾矢(日)三九〇
林待拉潑來考苦(拉)
里篤麻斯岩(日)十四

十一—十八畫

圓葉落霜紅(日)三一五
剎度比爾謨(拉)一九八
遠州鬼督郵(日)四九四
喬考來烏木(日)三四〇
滁州夏枯草(漢)四三一
舞鶴天南星(回)七三
荷蘭鴉兒芹(日)三九
彈性護謨樹(日)三〇四
嗎恩古羅布(日)三六三
嗎豪哈尼樹(拉)三〇二
實支答里斯(拉)四五八
照葉野薔薇(日)二五六
蕎麥葉貝母(漢)八五
撒辯啞椰子(日)六九
薩沙富拉斯(拉)二〇八
菱葉積雪草(日)一五一
鵝毛玉鳳花(漢)二二〇
龍阿倫奴阿(拉)四八

六字—八字

亞美利加瞿麥(日)一七二
安毋尼亞屈謨(日)三七六
盧比阿起男塞斯(拉)四六
百露拔爾撒謨(日)二八四
車前葉山慈姑(漢)八八
待囊待比肥達(拉)三九
刺苦丟葛倫謨(日)五三
倨答百兒加樹(日)三九九
撒而索拉曹達(拉)一六四
羅馬加密兒列(日)五二四
大葉井口邊草(日)一八
木本黃精葉鉤吻(漢)三一
印度彈性護謨樹(日)一四七
卡那達巴魯撒姆樹(拉)三四
亞拉昆亞護謨樹(日)二六一
篤留拔爾撒謨樹(日)二八〇
骨湃波拔爾撒謨樹(日)二七〇

決明（漢）二六一
烟管頭草（日）五〇一
桃葉珊瑚（漢）三八四
桃葉衛矛（漢）三二一
亞爾尼加（拉）四九二
亞爾答亞（拉）三三三
草夾竹桃（日）四二二
草紫陽花（日）二三〇
粉米空樹（日）二四八

十一—十四畫

細葉菖蒲（中俗）七六
健質亞郎（拉）四一二
安羅雙樹（漢）三九四
側金盞花（漢）一九一
麻葉繡球（漢）二四五
曼陀羅花（漢）四四六
牻牛兒苗（漢）二八八
象牙椰子（日）六八
紫蒲公英（日）五一二
紫花地丁（漢）三五二
答滿林度（日）二七八
嗎恩孤樹（日）三一四
獐耳細辛（漢）一八八
雅克百合（日）九九
蜘蛛抱蛋（漢）一〇二
攝綿支奈（日）五一一
當藥龍膽（日）四一三
荷蘭千日（日）五〇五
梅花黃連（日）一八六
蚰蜒羊齒（日）一九
菱葉垣通（日）一五一
鹿子百合（日）八九

十五—二十一畫

撒爾維亞（日）四三六
魯別利亞（拉）四八九
鐵梗海棠（俗）二四三
墨里老篤（日）二八五
鐵脚海棠（中俗）二四三
雙葉細辛（漢）一五六
鷄脚大黃　一六〇
鴿祖麻路（琉球）一四四
蟹仙人掌（日）三五六

五字

一—五畫

乙斯蘭土苔（日）十三
五加葉黃連（日）一八八
白花除虫菊（日）五〇九
八百屋防風（日）三八三
巴拉護謨樹（日）三〇四
古爾矢屈謨（拉）九三
牛蒡郎島麻（日）一〇三
古魯聖篤草（日）四八二
小桃葉衛矛（漢）三一八

恩孤來路氏（德人）自然分類一覽表　植物名下之字數為本文之頁數

第一部　分生植物　一
硫黃菌
腐敗菌
第二部　肉質植物
第三部　鞭毛類
第四部　鬼鞭毛類
疑問部硅質鞭毛類
第五部　硅藻類
第六部　接藻類
水綿（漢）　二
第七部　綠色藻類　二
○石蓴科
乾苔（漢）
紫菜（漢）　六
石蓴（漢）　三
第八部　輪藻類
第九部　褐色藻類　三
○昆布科
昆布（漢）海帶（中俗）
黑菜（漢）荒布（日）　四
搗布　四
裙帶布（漢）若布、和布　五
○富苦司科
羊栖菜、鹿尾菜（漢）　五
第十部　紅色藻類
○紅綿科
○頭髮菜科
江蘺（漢）頭髮菜　六
○石花菜科
石花菜（漢）心太草　七
第十一部　真菌類　七
第一綱藻狀菌類　八
第二綱半子囊菌類
第三綱子囊菌類
一名真子囊菌類
○麴菌科
青黴（漢）
麴菌、糀菌
○酵母菌科

脫肥路的阿加波尼卡(拉)一八四
格拉牛謨也錯烟色
司脫羅芳足斯(拉)四五
慎答吳里吳木(拉)四一三
卡梅累得內拉(拉)三八一
巴拉痴阿以茶(日)三一七
黑德拉斯題司(拉)一九七
阿魯奴司肥魯麻(拉)三三
拉吳羅塞拉司斯(拉)二五七
塞獨母利你亞來(拉)二一四
阿斯捕來尼吳木(拉)二〇
土拉格卡恩土護謨(日)三六
嗎恩孤斯他恩(拉)三四八

蕨類
○苔葱科
○杪欏科
欏杪(漢)　十六
○水龍骨科
岩澤瀉　十七
水龍骨(漢)　十七
大葉井口邊草　十八
孔雀羊齒、孔雀草(日)　十八
蚰蜒羊齒(日)　十九
蕨(漢)　十九
阿斯浦來尼 吳木、加旁尼苦木(拉)　二十
獅子頭(日)　二十
海州骨碎補(漢)　忍草(日)　二十一
玉羊齒(日)　二一
綿馬　二二
○水蕨科
○裏白科
裏白　二二
○海金砂科
海金砂(漢)　二三
○薇科
薇(漢)　二三
第二亞目水生羊齒類
一名蘋類
○蘋科
蘋(漢)　二四
○槐葉蘋科
槐葉蘋(漢)　二四
滿江紅(漢)　二五
第二目觀音座蓮類
○觀音座蓮科
第三目瓶爾小草類
第二綱楔葉類
第三綱木賊類
第一目真木賊類
○木賊科
問荊(漢)　杉菜(日)　二五
木賊(漢)　二六
第二目蘆木類
第四綱石松卷柏類
第一目無舌石松卷柏類

酵母菌、釀母菌、酒母菌、八
○肉座菌科
麥角菌　九
○外子囊菌科
天狗巢菌
第四綱蟲生子囊菌類
第五綱擔子菌類一名擔子胞菌類　十
○茅蕈科
茅蕈　十
○木耳科
木耳(漢)　十
○菌蕈科
香蕈(漢)椎耳(日)　十二

松蕈(漢)松茸(日)　十二
○麥蕈科
麥蕈(漢)松露(日)　十二
○多孔菌科
紫芝、靈芝(漢)　十二
第三綱及第五綱之附屬綱　地衣類　十三
○丕桉米立桉科
乙斯蘭土苔　依蘭苔　十三
○石茸科
石茸(漢)　十三
○里篤麻斯地衣科
里篤麻斯苔　十四
第十二部無管有胚之植物一名苔蘚植物

第一亞部苔蘚植物
第一綱地錢類一名苔類　十四
○地錢科
地錢(漢)　十四
第二綱土馬騣類一名蘚類　十五
○土馬騣科
土馬騣(漢)　十五
第二亞部羊齒植物　十六
第一綱羊齒類
井口邊草　十五
子持羊齒　十六
第一目蕨類
第一亞目真羊齒類一名

五叉松(漢)　三六
側柏(漢)　三六
米姆(日)　三七
花柏(漢)　三七
杉(漢)　三八
梅　三八
海松(漢)　三九
朝鮮松(日)　三九
杜松(日)　三九
杜松(漢)　四〇
扁柏(漢)　檜(日)　四〇
檜檜柏(漢)　柏心白身白心　四一
富士松(日)　落葉松(漢)　四一
櫪(日)　樅(漢)　四二
第六綱　麻黃類
○麻黃科
麻黃(漢)　四二
第二亞部被子植物
第一綱單子葉類
第一目榮蘭類
○香蒲科
香蒲(漢)　四三
○榮蘭科
榮蘭露兜樹　四三
○黑三稜科
第二目沼生類
○眼子菜科
大葉藻(漢)　四四
蝦藻(日)　四四
○茨藻科
茨藻　四五
○芝菜科
○澤瀉科
澤瀉(漢)　四五
慈姑(漢)　四六
○水韭科
黑藻(日)　四六
苦草(漢)　四七
水韭(漢)　四七
第三目本鄉草類
○本鄉草科
第四目頴花類
○禾本科

第一亞目石松類
○石松科
岸芝(日)　二六
石松(漢)　二七
第二亞目松葉蘭類
○松葉蘭類科
第二目有舌石松卷柏類
第一亞目卷柏類
○卷柏科
卷柏(漢)　二七
兗州卷柏(漢)　二八
地柏(漢)　二八
第二亞目鱗木類
第三亞目木賊類
○木賊科　二八
第十三部有管有胚植物　一位
一名顯花植物
第一亞部裸子植物
第一綱蘇鐵類
○蘇鐵科
鳳尾松(漢)　二九
第二綱亞蘇鐵類
第三綱亞松柏類
第四綱公孫樹類
○公孫樹科
公孫樹銀杏(漢)白果(俗)　二九
第五綱松柏類
加那侇把皃撒謨樹
○一位科　三〇
粗榧(漢)　三〇
榧(漢)　三一
竹柏(漢)　三一
羅漢松(漢)槙柏槙　三二
○松科
赤松(漢)　三三
黒松(漢)　三三
羅漢柏(漢)　三三
金松(漢)　三四
卞那達巴魯撒姆樹(漢)　三四
速加加泡尼卞(拉)　三五
沙木(漢)廣葉杉(日)　三五

○棕櫚科 六八
恰白茲耶子(日) 六八
象牙椰子 六八
撒拿啞椰子 六九
棕梠梭櫚(漢) 六九
省藤(漢) 七〇
桄榔子(漢) 七〇
戰捷木 七一
蒲葵(漢) 七一
檳榔子(漢) 七二
椰子(漢) 七二
第六目合花類 七三
○巴那嗎草科 七三
巴那嗎草 七三
第七目佛燄花類 七三
○天南星科 七三
虎掌(漢) 七三
野芋(漢) 七四
半夏(漢) 七四
白菖(漢)菖蒲(中俗) 七五
青芋(漢) 七五
蒟蒻(漢) 七六
石菖石菖蒲(漢) 七六
天南星(漢) 七七
○浮萍科 七七
水萍(漢)浮萍(中俗) 七七
第八目粉狀胚乳類 七八
○山藤科 七八
○穀精草科 七八
穀精草(漢) 七八
○鳳梨科 七八
鳳梨(漢) 七八
○鴨跖草科 七九
水竹葉(漢) 七九
鴨跖草(漢) 七九
○雨久花科 八〇
○狸菖蒲科 八〇
第九目百合花類 八〇
○燈心草科 八〇
燈心草(漢) 八〇
笄石菖(日) 八〇
雀稗(日) 八一

粟(漢) 四八
葩阿俺奴阿 四八
稻粳米(漢) 四九
狗尾草(漢) 四九
雄刈萱(日) 五〇
大麥(漢) 五〇
知風草(漢) 香香草(中俗) 五一
釣蟹草 五一
烏麥(日) 五二
青茅(漢) 刈安(日) 五二
稷(漢) 五三
行儀芝(日) 五三
小判草(日) 俵麥(日) 五四
藎草(漢) 五四
小麥(漢) 五五
甘蔗(漢) 砂糖黍(日) 五五
結縷草(漢) 芝草(日) 五六
川穀(漢) 數珠玉(日) 五六
芒(漢) 薄(日) 五七
看麥娘(漢) 雀鐵砲(日) 五七
雀稗(日) 五八
玉蜀黍(漢) 五八
白茅茅針(漢) 五九
狼尾草(漢) 五九
力草(漢) 六〇
稗(漢) 六〇
淡竹(漢) 六一
薏苡(漢) 鳩麥(日) 六一
穇(漢) 六二
江南竹(漢) 孟宗竹(日) 六二
菰(漢) 茭白(中俗) 六三
毒麥(日) 六三
山白竹箬竹(漢) 六四
蘆葦(漢) 六四
刈萱(日) 六五
○莎草科
笠莎(日) 六五
蚊屋弔草(日) 六六
烏芋(漢) 葧薺 六六
茳芏(漢) 七島藺 六七
莞(漢) 太藺 六七

第五目棕櫚類

葱(漢) 胡葱(俗) 一〇一
山蒜(漢) 一〇二
蜘蛛抱蛋一葉(漢) 葉蘭(日) 一〇二
牛塞郎島麻 一〇三
由點草(漢) 一〇三
嘿阿睼篤 一〇四
薤(漢) 一〇四
蘆薈(漢) 一〇五
山百合(日) 一〇五
○石蒜科
長壽花(漢) 一〇六
狐剃刀(日) 一〇六
水仙(漢) 一〇七
玉簾(日) 一〇七
石蒜(漢) 一〇八
龍舌蘭(日) 一〇八
○薯蕷科
薯蕷(漢) 山葯(中俗) 一〇九
○鳶尾科
溪蓀(漢) 一〇九
鳶尾(漢) 一一〇
燕子花(漢) 一一〇
蕃紅花(漢) 咱夫蘭(日) 一一一
蝴蝶花(漢) 一一二
花菖蒲 一一三
射干(漢) 檜扇(日) 一一三
第十目芭蕉類
○芭蕉科
芭蕉(漢) 一一三
甘蕉(漢) 一一三
拉愛那拉 一一四
○蘘荷科
鬱金(漢) 一一四
熊竹蘭(日) 一一五
生薑(漢) 薑(中俗) 一一五
小豆蔻 一一六
蘘荷(漢) 茗荷(日) 一一六
○曇華科
曇華、蘭焦(漢) 柦特 一一七
第十一目微子類
○雛錫杖科
○蘭科

○百部科
百部(漢)　八一
○百合科
青黎蘆　八二
麥葱絲葱(漢)
姜飩(漢)　八二
山慈姑(漢)　八三
肥路的阿加波尼卡(拉)　八四
鬱金香(漢)　八四
蕎麥葉貝母(漢)　八五
延齡草　八五
卷丹(漢)　八六
萬年青(漢)　八六
石刀拍(漢)　八七
苦榮羅肥土謨卞麻司謨(拉)　八八
海葱(漢)　八八
車前葉山慈姑(漢)　八八
鹿子百合　八九
吉祥草(漢)　八九
紫萼(漢)紫玉簪(中俗)　九〇
君影草(日)　九〇
天門冬(漢)　九一
桔梗蘭(日)　九一
車百合　九二
黑百合　九二
小卷丹　九三
古爾矢屈謨　九三
百合(漢)　九四
撒爾沙撒皃沙　九四
菝葜(漢)　九五
牛尾菜(漢)　九五
小梅形(日)　九六
沿階草(漢)龍鬚(日)　九六
藜蘆(漢)棕榈草(日)　九七
玉簪(漢)白鶴花(中俗)　九七
玉葱(日)廣東葱洋葱(中俗)　九八
海羅你握浦塞司不來唯卞浦撒(拉)　九八
為朝百合(日)鐵砲百合(日)　九九
雅皃百合(日)　九九
魯斯苦斯阿苦來阿土斯(拉)　一〇〇
韭(漢)　一〇〇
葫(漢)蒜(中俗)　一〇一

○樺木科
卡阿皮奴司加跑尼卡(狂)一三〇
白樺(日)一三〇
角榛(日)一三一
榛(漢)一三一
赤楊(漢)一三二
阿魯奴司肥魯麻(狂)一三二
○殼斗科
血櫧(漢)赤櫟(日)一三三
考蘆苦櫟一三三
山毛櫸(漢)一三四
姥茅櫧(日)一三四
槲(漢)柏一三五
櫟(漢)一三五
栗(漢)一三六
柁(漢)楢(俗)一三六
柯樹(漢)椎木一三七
櫧(漢)白櫟(日)一三七
楢(漢)一三八
木栓樹一三八
第九目蓼麻類
○榆科
榔榆(漢)一三九
厚子阿足示(日)一三九
朴樹一名楨一四〇
櫸(漢)一四〇
榆(漢)一四一
○桑科
榕樹(漢)一四一
大麻(漢)一四二
無花果(漢)一四二
天仙果(漢)一四三
楮(漢)一四三
構(漢)谷樹一四四
鴿祖麻路(琉球語)一四四
葎草(漢)一四五
桑(漢)一四五
唐花草(日)一四六
桑草(日)一四六
印度彈性護謨樹(漢)一四七
乳樹(日)一四七
波羅密樹曩伽結樹(漢)一四八

敦盛草(日)　一一七
海老根蝦根(日)　一一八
金蘭(日)　一一八
銀蘭(日)　一一九
熊谷草布袋草(日)　一一九
鵝毛玉鳳花(漢)　一二〇
澤蘭(日)　一二〇
沙列布　一二一
白及(漢)紫蘭(日)　一二一
建蘭(漢)　一二二
石斛(漢)　一二二
春蘭　一二三
瓦尼拉(拉)　一二三
第二綱雙子葉類
第一亞綱離瓣類
第一目輪生類
○木麻黃科
第二目胡椒類
○三白草科
蕺草(漢)十藥(中俗)　三四
○胡椒科
胡椒(漢)　一二四
華澄茄　一二五
○金粟蘭科
草珊瑚(漢)　一二五
金粟蘭(漢)　一二六
銀線草(漢)眉掃草　一二六
及已(漢)　一二七
第三目楊柳類
○楊柳科
柳(漢)　一二七
泥樹(日)綿樹(日)　一二八
第四目楊梅類
○楊梅科
楊梅(漢)　一二八
第五目巴拉橡布斯類　一二九
第六目拉衣島奈利亞類
第七目胡桃類
○胡桃科
山胡桃(漢)　一二九
澤胡桃　一二九
第八目山毛櫸類

○藜科
藜(漢)灰菜(俗) 一六三
撒而索拉曹達(拉) 一六四
砂糖大根(日) 一六四
恭菜(漢)唐芭不斷草(日) 一六五
菠薐菜(漢) 一六五
地膚(漢) 一六六
○莧科
丈莧(日) 一六六
牛膝(漢) 一六七
鷄冠(漢) 一六七
千日紅(漢)千日草(日) 一六八
雁來紅(漢) 一六八
○紫茉莉科
紫茉莉(漢)白粉花 一六九
○大和草科
○商陸科
商陸(漢)山牛蒡 一六九
○蕃杏科
蕃杏(漢) 一七〇
○馬齒莧科
馬齒莧(漢) 一七〇
松葉牡丹(日) 一七一
○落葵科
○石竹科
亞美利加瞿麥(日) 一七一
牛繁縷(日) 一七二
瞿麥(漢) 一七二
石竹(漢) 一七三
剪夏羅(漢) 一七三
石鹼草(日) 一七四
王不留行(漢) 一七四
漆姑草(漢) 一七五
繁縷(漢) 一七五
虫捕撫子(日) 一七六
第十五目毛良類
○睡蓮科
大芡實(日) 一七六
芡實(漢) 一七七
萍蓮草(漢) 一七七
蓴(漢) 一七八
蓮(漢) 一七八

麪包樹(日) 一四八
菩提樹(漢) 一四九
忽布 一四九
○蕁麻科
赤苧 一五〇
蕁麻(漢)蠍子草 一五一
菱葉垣通菱葉積雪草(日) 一五一
苧麻(漢) 一五二
第十一目山茂樫類
○山茂樫科
第十一目檀香類
○檀香科
卡那比克草(日) 一五二
羽子木(日) 一五三
檀香白檀(漢) 一五三
○幌幌木科
○槲寄生科
惟衣斯苦母阿魯巴母(拉) 一五四
○蛇菰科
第十二目馬兜鈴類
○馬兜鈴科
馬兜鈴(漢) 一五四
大葉馬兜鈴 一五五
杜衡(漢) 一五五
雙葉細辛(漢) 一五六
第十三目蓼類
○蓼科
藍(漢) 一五六
杠板歸(漢) 一五七
虎杖(漢) 一五七
馬蓼(漢) 一五八
拳參(漢) 一五八
大馬蓼(日) 一五八
葒草(漢)紅蓼(中俗) 一五九
羊蹄(漢)鷄脚大黃 一六〇
蠶繭草(漢) 一六〇
酸模(漢) 一六一
蕎麥(漢) 一六一
大黃(漢) 一六二
溝蕎麥 一六二
金線草(漢) 一六三
第十四目中央子類

黑德拉期題期(拉) 一九七
十大功勞(漢) 一九八
剝度比爾謨 一九八
小蘗(漢) 一九九
○防已科
木防已(漢) 一九九
古倫僕 二〇〇
○木蘭科
廣心樹、黃心樹(漢) 二〇〇
辛夷(漢) 二〇一
南五味子(漢) 二〇一
莽草(漢)櫁 二〇二
木蘭、木蓮(漢) 二〇二
玉蘭(漢)白木蓮(日) 二〇三
厚朴(漢) 二〇三
○臘梅科
臘梅(漢) 二〇四
○蕃荔枝科
蕃荔枝(漢) 二〇四
○肉豆蔻科
肉豆蔻(漢) 二〇五
○樟科
林待拉潑來考苦(拉) 二〇五
犬樟(日) 二〇六
樟(漢) 二〇六
鉤樟(漢)黑文字(日) 二〇七
桂皮、桂(漢) 二〇七
月桂樹、老利兒 二〇八
薩沙富拉期(拉) 二〇八
里島塞阿孤拉吳卡(拉) 二〇九
肉桂 二〇九
○蓮葉桐科
第十六目罌粟類
○罌粟科
白屈菜(漢) 二一〇
罌子粟(漢) 二一〇
駒草(日) 二一一
博落迴(漢) 二一一
麗春花(漢) 二一二
紫堇(漢) 二一二
○白花菜科
魚木(日) 二一三

睡蓮(漢)　一七九
○金魚草科
金魚藻(日)輪藻　一七九
○雲葉科
開阿塞敵肥路 姆加波你苦姆(拉)一八〇
山車(日)　一八〇
○毛良科
塔利苦陶盧木 米奴司愛拉脫姆(拉)　一八一
一輪草(日)　一八一
猿猴草　一八二
白頭翁(漢)　一八二
轉子蓮(漢)　一八三
回回蒜(漢)　一八三
唐松草(日)　一八四
毛茛(漢)　一八四
梯老里吳司爬足盧司(拉)一八五
草牡丹(日)　一八五
五加葉黃蓮(日)　一八六
秋牡丹(漢)　一八六
芍藥(漢)　一八七
克米克夫吳格肥題達塞木波米苦司(拉)　一八七
獐耳細辛(漢)　一八八
菟葵(漢)　一八八
大藜(漢)　一八九
石龍芮(漢)　一八九
鐵線蓮(漢)　一九〇
烏頭附子(漢)　一九〇
白根葵(日)　一九一
側金盞花(漢)　一九一
牡丹(漢)　一九二
二輪草(日)　一九二
耬斗菜(漢)　一九三
黃蓮(漢)　一九三
牡丹蔓　一九四
○木通科
通草(漢)　一九四
三葉通葉
野木瓜(漢)　一九五
○小蘗科
淫羊藿(漢)　一九六
山荷葉(漢)　一九六
南天門(漢)　一九七

古司白里鵞漿果(英) 二三〇
紫草陽花(日) 二三〇
大文字草(日) 二三一
玉紫陽花(日) 二三一
糊空木(日) 糊木(日) 二三二
阿斯題盧彼起乃恩席斯加保尼蛤(拉) 二三二
虎耳草(漢) 二三三
○海桐花科
海桐花(漢) 二三三
唐冬青(日) 二三四
○金縷樓科
蚊母樹(漢) 二三四
蘇合香 二三五
楓(漢) 二三五
金縷梅(漢) 二三六
○篠懸木科
○薔薇科
扁桃(漢) 二三六
杏(漢) 二三七
梅(漢) 二三七
泡台題爾拉苦來尼亞那(拉) 二三八
荷蘭莓西洋莓(日) 二三八
海棠(漢) 二三九
月季花、長春花(漢) 二三九
構莓 二四〇
赤芽(日) 二四〇
委陵菜(漢) 二四一
懸鉤子(漢) 二四一
龍芽草(漢) 二四二
鎌柄(日) 殺牛(日) 二四二
櫨子(漢) 二四三
苦蘇(日) 二四三
木瓜(漢) 二四四
雉席(日) 二四四
珍珠花(漢) 二四五
麻葉繡毬(漢) 二四五
爬滕題拉夫魯 題考撒(拉) 二四六
櫻 二四六
山櫨子(漢) 二四七
笑靨花(漢) 二四七
繡線菊(漢) 二四八
粉米空樹(日) 二四八

○十字花科
蕓薹(漢)油菜　二一三
蔊菜(漢)　二一四
葶藶(漢)　二一四
水石龍芮(日)　二一五
蕪菁(漢)　二一五
芥(漢)　二一六
遏藍菜(漢)　二一六
西洋山葵(日)　二一七
那司土魯題吳木爬魯司脫來(拉)　二一七
萊菔蘿蔔(漢)大根(日)　二一八
大青菘藍(漢)　二一八
碎米薺(漢)　二一九
薺(漢)　二一九
甘藍(漢)葉牡丹(日)　二二〇
山葡菜(漢)　二二〇
野蘿蔔　二二一
○木犀草科
第十七目瓶子草類
○瓶子草科
瓶子草　二二一
○猪籠草科
猪龍草(漢)　二二二
○芳蕾菜科
芳蕾菜(漢)　二二二
蠅捕草(日)　二二三
毛氊苔　二二三
貉藻　二二四
第十八目薔薇類
○景天科
塞獨姆利你亞而利(拉)　二二四
費菜(漢)　二二五
景天(漢)　二二五
塞獨姆喜保魯抵(拉)　二二六
○虎耳草科
八仙花(漢)紫陽花　二二六
土常山(漢)　二二七
落新婦　二二七
岩搦(日)　二二八
溲疏(漢)　二二八
梅鉢草(日)　二二九
待囊待比肥達(拉)　二二九

葛(漢)　二六九
苦參(漢)　二七〇
胥湃波拔爾撒謨樹
馬棘(漢)　二七一
脫里否里吳木里培恩司(拉)
皂莢(漢)　二七二
豇豆(漢)大角豆　二七二
紫檀(漢)　二七三
雲實(漢)　二七三
狸豆(日)　二七四
小菜菜(漢)　二七四
蘇方(漢)　二七五
野決明黃華(漢)　二七五
葫那　二七六
蠶豆(漢)　二七六
大豆黃大豆(漢)　二七七
相思子(漢)　二七七
含羞草(漢)　二七八
羅望子(漢)答滿林度(日)　二七八
鹿藿(漢)穭豆(日)　二七九
勞孤吳島樹　二七九
篤留拔爾撒謨樹　二八〇
刀豆(漢)　二八〇
落花生(漢)長生果(中俗)　二八一
山菜豆(漢)盜人荻(日)　二八一
合歡(漢)　二八二
胡枝子(漢)荻(中俗)　二八二
紫荊(漢)　二八三
紫藤(漢)　二八三
鵲豆扁豆(漢)　二八四
百露拔爾撒謨　二八四
百脉根(漢)　二八五
墨里老篤　二八五
鐵掃帚(漢)著荻　二八六
土拉格卡恩土護謨　二八六
洋槐(中俗)刺槐狗槐(日)　二八七
第十九目牻牛兒類
〇牻牛兒科　二八七
郡內風露(日)　二八八
赤泊風露(日)　二八八
牻牛兒苗(漢)　二八八
〇酢漿草科

阿埋郎其阿（阿塞阿題卡拉）　二四九
濱木斛（日）車輪梅（日）　二四九
李（漢）　二五〇
白山吹（日）　二五〇
西洋薔薇　二五一
西洋林檎　二五一
水楊梅（漢）　二五二
西洋梨（日）　二五二
梨（漢）　二五三
郁李（漢）　二五三
野薔薇（漢）　二五四
玫瑰（漢）　二五四
枇杷（漢）　二五五
蛇莓（漢）　二五五
榅桲（漢）　二五六
照葉野薔薇（日）　二五六
桃（漢）　二五七
拉吳羅塞拉斯司　二五七
棣棠花（漢）山吹　二五八
山櫻桃梅桃（漢）　二五八
石鹼樹（日）　二五九
實櫻　二五九
○荳科
阿仙葯　二六〇
赤小豆（漢）　二六〇
亞拉昆亞護謨樹　二六一
茳芒決明（漢）　二六一
櫰槐（漢）　二六二
菜荳（漢）　二六二
苜蓿（漢）金花菜　二六三
金雀枝　二六三
箙藤（日）　二六四
槐（漢）　二六四
豌豆（漢）　二六五
卡斯麻草（日）　二六五
山扁豆（漢）　二六六
加剌拔兒豆（漢）　二六六
甘草（漢）　二六七
吉納　二六七
木蘇（日）　二六八
合萠（漢）　二六八
草藤（漢）　二六九

赤芽槲(日) 三〇四
罌子桐(漢) 三〇五
榎木草編笠草(日) 三〇五
加斯加利刺 三〇六
加麻刺(漢) 三〇六
葉下珠(漢) 三〇七
蓖麻(漢) 三〇七
大戟(漢) 三〇八
彈性護謨樹 三〇八
烏臼(漢) 三〇九
巴豆(漢) 三〇九
交讓木(漢) 三一〇
○水馬齒科
第二十目無患子類
○黃楊科
○岩高蘭科
岩高蘭 三一〇
○毒空木科
木本黃精葉鉤吻(漢) 三一一
○漆樹科
漆樹(漢) 三一一
野葛(漢) 三一二
乳香(漢) 三一二
鹽膚木(漢) 三一三
黃櫨(櫨)(漢) 三一三
嗎恩孤樹 三一四
山漆(日) 三一四
○冬青科
圓葉落霜紅(日) 三一五
犬黃楊(日) 三一五
落霜紅(漢) 三一六
冬青(漢) 三一六
波羅樹(漢) 三一七
把拉弇阿以茶 三一七
藕木 三一八
○衛茅科
小桃葉衛茅 三一八
釣花(日) 三一九
蔓梅擬(日) 三一九
扶芳藤(漢) 三二〇
衛茅(漢) 三二〇
柾(中俗) 三二一

酢漿草(漢)　二八九
五敛子羊桃(漢)　二八九
○金蓮花科
金蓮花(漢)　二九〇
○亞麻科
亞麻　二九〇
○古加科
古加古柯　二九一
○蒺藜科
癒瘡木　二九一
○芸香科
崖椒(漢)　二九二
枸橘(漢)　二九二
黃檗檗木黃柏(漢)　二九三
金橘(漢)　二九三
香橙(漢)九年母(旦)二九四
常山(漢)　二九四
吳茱萸(漢)　二九五
山椒秦椒(漢)　二九五
臭橙(漢)　二九六
芸香(漢)　二九六
柑(漢)蜜橘　二九七
耶僕蘭日　二九七
柚(漢)　二九八
里木子宜母子(漢)　二九八
○苦木科
括婁亞　二九九
苦楝子(漢)　二九九
○橄欖科
乳香(漢)　三〇〇
蜜皃拉　三〇〇
○楝科
楝(漢)　三〇一
香椿(漢)　三〇一
嗎豪蛤尼樹　三〇二
○金虎尾科
○遠志科
柙葉草(日)　三〇二
欄涅瓦　三〇三
遠志(漢)　三〇三
○大戟科
巴西護謨樹　三〇四

黃蜀葵(漢) 三三六
木芙蓉(漢) 三三六
木槿(漢) 三三七
紅葉葵 三三七
草綿(漢) 三三八
○木綿科 三三八
拔惡拔勃 三三八
木綿(漢) 三三九
○梧桐科 三三九
梧桐(漢) 三三九
加加阿木 三四〇
第二十三目側膜胎座類 三四〇
○獼猴桃科 三四〇
獼猴桃(漢) 三四〇
木天蓼 三四一
○山茶科 三四一
楊桐(漢)榊(日) 三四一
茶梅(漢) 三四二
茗茶(漢) 三四二
山茶(漢) 三四三
夏椿(日) 三四三
柃(漢) 三四四
小夏椿(日) 三四四
厚皮香(漢) 三四五
○金絲桃科 三四六
小連翹(漢)弟切草 三四五
金絲梅(漢) 三四六
藤黃海藤(漢) 三四六
鐵刀木(漢) 三四七
巴草 三四七
金絲桃(漢) 三四八
嗎恩孤斯他恩(拉) 三四八
龍腦香科 三四九
娑羅樹娑羅雙樹(漢) 三四九
龍腦(漢) 三四九
○溝繁縷科 三五〇
○櫂柳科 三五〇
櫂柳御柳(漢) 三五〇
○菫菜科 三五〇
葵菫(日) 三五〇
三色菫(日) 三五一
白花菫(日) 三五一

桃葉衛茅(漢)　三二一
○省沽油科
○槭樹科
構槭樹(日)　三二二
槭樹(漢)　三二二
砂糖楓(日)　三二三
○七葉樹科
七葉樹(漢)　三二三
○無患子科
無患子(漢)　三二四
龍眼(漢)　三二四
荔枝(漢)　三二五
○泡吹科
泡吹(日)　三二五
清風藤(漢)　三二六
○鳳仙花科
鳳仙花(漢)　三二六
第二十一目鼠李類
○鼠李科
熊柳(日)　三二七
鼠李(漢)　三二七
枳椇(漢)　三二八
棗(漢)　三二八
○葡萄科
蘡薁(漢)　三二九
地錦(漢)　三二九
蛇葡萄(漢)　三三〇
烏蔹莓(漢)　三三〇
葡萄(漢)　三三一
第二十二目錦葵類
○膽八樹科
○田麻科
田麻(漢)　三三一
科木(日)　三三二
黃麻(漢)　三三二
菩提樹(日)　三三三
○錦葵科
亞爾答亞(拉)　三三三
苘麻(漢)　三三四
阿不起羅米格哀波塔米苦母(拉)　三三四
錦葵(漢)　三三五
蜀葵(漢)　三三五

丁香(漢)丁子　三六五
桃金孃(漢)　三六五
蕃石榴(漢)　三六六
蒲桃(漢)　三六六
由加利樹　三六七
○野牡丹科
○柳葉菜科
柳葉菜(漢)赤花(日)三六七
岩柳葉菜　三六八
月見草　三六八
夫苔席阿(拉)　三六九
菱芰實(漢)　三六九
待霄草(日)　三七〇
蟻塔科
蟻塔草　三七〇
○杉菜藻科
第二十六目繖形花類
○五加科
五加(漢)　三七一
土當歸(漢)　三七一
隱蓑(漢)　三七二
常春藤(漢)　三七二
楤木(漢)　三七三
通草通脫木(漢)　三七三
土參(漢)　三七四
人參(漢)　三七四
青葵葉(漢)　三七五
刺楸(漢)　三七五
八角金盤(漢)　三七六
○繖形科
安母尼亞屈謨(拉)　三七六
阿魏　三七七
邪蒿(漢)　三七七
茴香(漢)　三七八
變豆菜(漢)　三七八
荷蘭芹　三七九
荷蘭瞩皃芹(日)　三七九
胡荽(漢)　三八〇
水芹水斳芹(漢)　三八〇
卞梅累得內拉(拉)　三八一
血止草(日)　三八一
毒芹(日)　三八二

紫花地丁(漢)堇菜　三五二
立壺堇
堇菜(漢)　三五二
彐堇(日)　三五三
○椅科
椅(漢)　三五四
○旌節花科
旌節花(漢)　三五四
○西蕃蓮科
○蕃瓜樹科
蕃瓜樹萬壽果(漢)三五五
○秋海棠科
秋海棠(漢)　三五五
第二十四目仙人掌類
○仙人掌科
仙人頭(俗)開來吳司
麻路題浦來可斯(拉)　三五六
蟹仙人掌　三五六
第二十五目桃金孃花類
○瑞香科
夏坊主鬼縛(日)　三五七
雁皮
沈香(漢)伽羅　三五八
小雁皮(日)大雁皮(日)三五八
瑞香(漢)　三五九
芫花(漢)　三五九
結香黃瑞香(漢)三股(日)三六〇
○胡頹子科
秋胡頹子(日)　三六〇
木半夏(漢)　三六一
胡頹子(漢)　三六一
○千屈菜科
紫薇百日紅(漢)　三六二
千屈菜(漢)　三六二
○安石榴科
安石榴(漢)　三六三
○玉蕊科
○紅樹科
嗎恩古羅布　三六三
○使君子科
使君子(漢)　三六四
○桃金孃科
加耶布的　三六四

櫻草　三九八
珍珠菜(漢)　三九九
○磯松科
第三目烏木類
○赤鐵科
倭答百兒加樹　三九九
○柿樹科
柹(漢)柿(日)　四〇〇
烏木(漢)黑檀　四〇〇
君遷子(漢)　四〇一
○灰木科
○齊墩果科
安息香　四〇一
齊墩果(漢)　四〇二
大葉白辛樹毛白辛(桂)(日)　四〇二
第四目回旋花類
○木犀科
小葉栲　四〇三
水蠟樹(漢)　四〇三
大葉水蠟樹(漢)　四〇四
阿列布　四〇四
黃素馨(日)　四〇五
素馨(漢)　四〇五
女貞(漢)　四〇六
栲(漢)　四〇六
枸骨(漢)杠谷樹柊　四〇七
木犀巖桂(漢)　四〇七
連翹(漢)　四〇八
黃梅(俗)迎春花(漢)　四〇八
紫丁香(中俗)　四〇九
○馬錢科
醉魚草(漢)　四〇九
馬錢子番木鼈(漢)　四一〇
○龍腦科
獐牙菜(漢)　四一〇
苦菜(漢)　四一一
金銀蓮花(漢)　四一一
健質亞那　四一二
慎答吳里吳木(拉)　四一二
當歸　四一三
當歸龍腦　四一三
龍腦(漢)　四一四

毒人參(日)毒蘿蔔(日)三二
胡蘿蔔(漢)三八三
濱防風(日)八百屋防風(日)三八三
鴨兒芹(漢)三葉芹(日)三八四
○山茉萸科
桃葉珊瑚(漢)三八四
瓜木(日)三八五
考阿奴司依古撓拉他(拉)三八五
山茉萸(漢)三八六
第二亞綱合瓣類
第一目石南類
○令法科
令法三八六
○鹿蹄草科
鹿蹄草(漢)三八七
水晶蘭(漢)三八七
○石南科
格吳路梯里亞阿帶撓陶里茲(拉)三八八
巴苦喜牛姆(日牙波你苦謨(拉)三八八
梫木(漢)三八九
岩梨(日)三八九
岩南天竹(日)三九〇
烏華烏皃矢三九〇
石巖(漢)三九一
五葉山躑躅(日)三九一
越橘(漢)三九二
蔓苔桃(日)三九二
杜鵑花(漢)三九三
石南(漢)三九三
哖克阿恩祖司加保尼苦司(拉)三九四
米葉拇櫻(日)三九四
木藜蘆(漢)三九五
○岩梅科
岩鏡(日)三九五
第二目櫻草類
○紫金牛科
硃砂根(漢)三九六
紫金牛(漢)藪柑子(日)三九六
○櫻草科
里席麻其阿夫盧格里司(拉)三九七
九輪草(日)三九七
小茄(日)三九八

伊吹鈴子香(日)　四三一
滁州夏枯草(漢)　四三一
野芝麻(漢)　四三二
垣通、積雪草、治癇草(日)　四三二
排草香(漢)　四三三
龜葉草(日)　四三三
小白根(日)　四三四
風輪菜(漢)　四三四
琴柱草(日)　四三五
地獄釜蓋(日)　四三五
撒爾維亞　四三六
塔花(日)　四三六
紫蘇(漢)　四三七
鈴子香(漢)　四三七
白根(日)　四三八
司苦苔拉里阿(寅蔽卡加保尼卡拉)　四三八
草石蠶(漢)　四三九
筋骨草(漢)　四三九
十二單(日)　四三九
薄荷(漢)　四四〇
佛座　四四〇
送迭香(漢)　四四一
刺賢垤兒　四四一
○茄科　
刺酸漿(日)　四四二
狗酸漿(漢)　四四二
赤茄(日)　四四三
多麻斗(日)　四四三
枸杞(漢)　四四三
馬鈴薯(漢)　四四四
苦蘵(漢)　四四四
千成酸漿(日)　四四四
蕃椒(漢)　四四五
烟草(漢)　四四五
曼陀羅花、大麻子(漢)　四四六
茄(漢)　四四六
莨菪(漢)　四四七
菲沃斯　四四七
蜀羊泉(漢)　四四八
鴉上戶(日)　四四八
別刺敦那　四四八
酸漿(漢)　四四九
○玄參科　
林待路尼挨古塔(開亞司路拉)　四四九
婆婆納(漢)　四五〇
畦蕃椒(日)　四五〇

○夾竹桃科　四一四
夾竹桃(漢)　四一四
司脫雞芳足司(拉)　四一五
絡石(漢)　四一五
日日草(日)　四一六
○蘿摩科　四一六
牛皮消(漢)　四一六
伊豫葛(漢)　四一七
蘿摩(漢)　四一七
歐蔓(日)　四一八
球蘭(漢)　四一八
徐長卿　四一九
第五目筒花類
○旋花科

牽牛子(漢)　四一九
甘藷紅薯(漢)　四二〇
菟絲子(漢)　四二〇
旋花(漢)　四二一
約朮巴　四二一
蔦蘿(漢)　四二二
○花葱科　四二二
草夾竹桃(日)　四二二
○幌菊科　四二二
○紫草科　四二三
阿路坑那(拉)　四二三
大琉璃草　四二三
鷄腸草(漢)田平子(日)　四二四
紫草(漢)　四二四
○馬鞭草科　四二五
蒻(漢)　四二五
海州常山(漢)　四二五
馬鞭草(漢)　四二六
蘭菊(日)　四二六
起苦樹(英)　四二七
牡荊(漢)　四二七
防臭木　四二八
紫珠　四二八
○唇形科　四二九
香茶菜(漢)秋丁子桐壺(日)　四二九
鼠尾草(漢)　四三〇
石蘇蓼(漢)　四三〇
犬胡麻(日)　四三〇

盧比阿起男塞其(拉)　四六六
釣藤(漢)　四六六
河原松葉(日)　四六七
規那(漢)　四六七
砧草(日)　四六八
梔子、黃梔花(漢)　四六八
車葉草(日)　四六九
咖啡(漢)　四六九
西洋赤根(日)　四七〇
吐根　四七〇
猪殃殃(漢)八重葎(日)　四七一
○忍冬科
羅尼開拉格拉克里派司　四七一
莢蓮(漢)　四七二
肝木(日)　四七二
金銀木、瓢簟木(日)　四七三
珊瑚樹、木珊瑚(日)　四七三
忍冬(漢)　四七四
西洋接骨木　四七四
蒴藋(漢)　四七五
楊櫨(漢)　四七五
接骨木(漢)　四七六
錦帶花(漢)　四七六
蝴蝶樹(漢)　四七七
○連副草科
○敗醬科
男郎花　四七七
敗醬(漢)女郎花　四七八
綺草　四七八
○山蘿蔔科
敵潑撒苦司福而勞奴母(拉)　四七九
山蘿蔔(漢)　四七九
第八目鍾花類
○葫蘆科
絞股藍(漢)　四八〇
王瓜(漢)烏瓜(日)　四八〇
胡瓜(漢)黃瓜(中俗)　四八一
合子草(漢)　四八一
古魯睍篤草　四八二
西瓜(漢)水瓜　四八二
蕃南瓜(漢)唐茄(日)　四八三
苦瓜(漢)　四八三

柳穿魚(漢)　四五一
大婆婆納(日)　四五一
大山玄參　四五二
水苦賈(漢)　四五二
菊藻(日)　四五三
桐白桐泡桐(漢)　四五三
金魚草(日)　四五四
草木威靈仙(漢)　四五四
粉米草(日)　四五四
玄參(漢)　四五五
小鹽竈(日)　四五六
通泉草(漢)　四五六
地黃(漢)　四五七
監竈草　四五七
實芝答里斯(拉)　四五八
○紫葳科　四五八
淩霄花紫葳(漢)　四五八
梓(漢)木角豆(日)　四五九
○胡麻科　四五九
胡麻(漢)　四五九
○角胡麻科　四五九
○列當科　四六〇
保斯苦尼阿(疾阿孤拉不拉(拉))　四六〇
野菰(漢)　四六〇
○苦苣苔科　四六一
苦苣苔(漢)　四六一
○狸藻科　四六一
狸藻(日)　四六一
虫捕堇(日)　四六二
○爵牀科　四六二
司上落弼郎梯司加波你苦斯(拉)　四六二
爵牀(漢)　四六三
○濱沈丁科　四六三
第六月車前類　四六三
○車前科　四六三
車前(漢)蝌蚪葉(中俗)　四六三
第七目茜草類　四六四
○茜草科　四六四
茜草(漢)赤根(日)　四六四
阿仙藥　四六四
虎刺(漢)　四六五
浦敕依島皮克斯羅已祖已　四六五

斯可阿早奈拉（席則爾尼卡）（拉）　五〇三
泥胡菜（漢）　五〇四
錦鷄菊（日）　五〇四
荷蘭千日、千日菊（日）　五〇五
金盞草（漢）　五〇五
黃花蒿（漢）　五〇六
牛蒡（漢）　五〇六
馬蘭（漢）　五〇七
三七草（漢）　五〇七
紫菀（漢）　五〇八
茼蒿（漢）　五〇八
東風菜（漢）　五〇九
白花除虫菊（日）　五〇九
白娵菜　五一〇
西洋鋸草（日）　五一〇
攝綿支奈支奈　五一一
萬壽菊（漢）金錢菊（中俗）　五一一
大丁草（漢）　五一二
狼尾草（漢）　五一二
鱧腸（漢）　五一三
蒲公英（漢）　五一三
萵苣（漢）　五一四
父子草（日）　五一四
橐吾（漢）　五一五
天竺牡丹（日）　五一五
黃瓜菜（漢）苦菜（日）　五一六
苦艾（日）　五一六
蓍（漢）鋸草（日）　五一七
鼠麴草（漢）御形（日）　五一七
土拉高泡個恩波路里否里吳期（拉）　五一八
哥來握布席（司提痕苦土里阿）（拉）　五一八
向日葵（漢）日迴（日）　五一九
剪刀股（漢）　五一九
百日草（日）秋羅　五二〇
欵冬（漢）路冬　五二〇
蘭草（漢）藤袴（日）　五二一
紅花（漢）　五二一
唆里格勞恩唆奴司（拉）　五二二
鷄兒腸（漢）　五二二
艾（漢）　五二三
刺苦丟葛偪謨　五二三
羅馬加密兒列　五二四

冬瓜(漢) 四八四
蒲蘆匏(漢) 四八四
絲瓜(漢) 四八五
甜瓜(漢) 四八五
瓠壺盧(漢) 四八六
○桔梗科
桔梗(漢) 四八六
山梗菜(漢) 四八七
肥脫依馬加波你苦米(拉) 四八七
蘘荷(漢) 四八八
沙參(漢) 四八八
山小菜(漢) 四八九
魯別利亞 四八九
○山羊菜科
○菊科 四九〇
秋之費菜(日) 四九〇
山苦蕒(漢) 四九〇
秋鼠麴草(日) 四九一
油菊 四九一
亞爾尼加 四九二
愛里格羅里尼否里務斯(拉) 四九二
兎菊(日) 四九三
薄雪草(日) 四九三
翠菊(漢) 四九四
遠州鬼督郵(日) 四九四
延命菊雛菊(日) 四九五
旋覆花(漢)小車 四九五
蒼朮(漢) 四九六
牡高(漢) 四九六
菜耳(漢) 四九七
苦米皮司加波尼卡拉 四九七
高野帚(日) 四九八
毛連菜(漢) 四九八
麻苦羅苦利尼敵吳木羅巴司土母(拉) 四九九
卡塞恩草(日) 四九九
蟹蝙蝠 五〇〇
貝細工(日) 五〇〇
荻(漢) 五〇一
烟管頭草(日) 五〇一
加密克列 五〇二
阿寅斯利拉塔(拉)撲阿阿皮苦 五〇二
菊(漢) 五〇三



根之種類

一　蕪菁根
二　圓錐根
三　紡錘根
四　塊狀根

上昇莖之種類

一　攀緣莖
二　纏繞莖

矢車菊　五二四



單葉及複葉之種類

一　完全單葉
二　單身複葉
三　羽狀複葉　（一回奇數羽狀複葉）
四　掌狀複葉　（一回奇數掌狀複葉）



羽狀複葉及脈之種類

一　一回偶數羽狀複葉
二　二回奇數羽狀複葉
三　網脈
四　平行脈



地下莖之種類

一　球狀莖
二　塊狀莖
三　鱗狀莖
四　根狀莖

葉之排列種類

一　互生
二　對生
三　輪生
四　束生



十五　戟形
十六　漸尖頭
十七　銳頭
十八　鈍頭
十九　截頭
二十　凹頭
二十一　倒心臟頭
二十二　凸頭



葉緣種類

一　全邊　二　鋸齒狀
三　齒牙狀　四　鈍鋸齒狀
五　缺刻



葉形之種類

一 線形　二 披針形
三 楕圓形　四 卵形
五 倒卵形　六 倒披針形
七 匙形



八 楔形　九 心臟形
十 腎臟形　十一 楯形
十二 截形　十三 箭形
十四 耳形



花之種類

一　上生子房之完全花
二　下生子房之完全花
三　雄花　單性花
四　雌花



花冠之種類

一　蝶形花冠
二　唇形花冠
三　筒狀花冠
四　舌狀花冠



八



一

花序之種類

一　總狀花序　二　繖房花序
三　單繖形花序　四　複葉形花序
五　穗狀花序　六　頭狀花序

一　圖錐花序　二　聚繖花序
三　雁木狀花序　四　尾卷狀花序



乾果之種類

一　瘦果　閉果
二　蓇葖
三　莢　裂果
四　蒴



一　長角　裂果
二　堅果
三　翅果　閉果
四　毬果



胎座之種類

一、二　側膜胎座
三　中軸胎座
四　特立中央胎座

肉果之種類

一　核果
二、三　漿果
四　多花果

Beggiatoa Alba.

硫黃菌（裂殖植物）分生菌類

硫黃菌生於攝氏七十度溫水中之著名植物呈絲狀常羣生於含硫黃之溫泉及污水中以酸化所發生之硫化水素生硫黃粒及水而留硫黃粒於其體內故於人生雖無大關係亦一著名之細菌也



Bacillus vulgaris.

腐敗菌（裂殖植物）分生菌類

腐敗菌者寄生於動物之死骸呈桿狀分解有機物生安母尼亞

生於飲食物時則變蛋白質為有毒成分人畜食之必致病又於夏日發惡臭若生於土中廢棄物內則漸次分解變質為土壤自淨作用之主因也



Ulva Lactuca *Le Jol.*

石蓴科

石蓴(漢)

石蓴產於淺海之綠色藻類。其形如紙而扁平。附生於他物。如淺草海苔。可漉之為紙狀。以供食用。

Laminaria japonica *Aresch.*

昆布科

昆布(漢)　海帶(中俗)

昆布生於日本北部之海中。我國閩浙海中亦有之。為褐色之隱花植物。體呈帶狀。長達數十尺。下部有柄。附著於岩礁。帶狀部可供食用。入藥治水腫破積聚。

Enteromorpha compressa *Grev.*

Spirogyra arcta *Kuty.*

水綿（漢）

水綿者單細胞植物也生於淡水中呈絲狀以多數植物相連續而成有螺旋狀之葉綠體故為有名之藻類

接合藻類

乾苔（漢）石髮（日）海苔菜（日）石蓴科

乾苔者產於淺海之綠色藻類也形為細長之囊狀而著生於他物乾燥之供食用

Cystophyllum fusiforme *Harv.*



Undaria pinnatifida *Sur.*

裙帶菜(淸)　若布　和布(日)　昆布科

裙帶菜者。生於海中。褐色之隱花植物也。長三四尺。主部扁平為葉狀而又分裂成羽狀。中具肋狀之線條。以柄附著於岩礁。可供食用。

羊栖菜(漢)　鹿尾菜(日)　富苦司科

羊栖菜者。生於海水中之岩上。為褐色之隱花植物。高一尺餘。軸部細長。而生多數短棒狀之枝。此菜亦供食用。

Ecklonia bicyclis *Kjellm.*

黑菜（漢）荒布（日）　昆布科

黑菜。生於海中之褐色藻類。形為葉狀。有數裂片。以長柄著生於他物。葉狀裂片。具多數之皺紋。乾葉狀之裂片。可供食用。

Ecklonia cava *Kjellm.*

搗布（日）　昆布科

搗布。生於海中。呈褐色。大形藻類也。形為葉狀。分裂成羽狀。以長柄著生於他物。燒此植物。可以灰製沃度。乾其柄部。可為洋傘之柄或杖等。又葉狀部可供食用。

Penicillium crustaceum *L.*

Gelidium cartilagineum *Grev.*

石花菜（漢）心太草（日）石花菜科

石花菜生於海中砂石間紫紅色之隱花植物也狀類灌木高四五寸枝多而細稍粗者稱為雞脚菜

晒乾變為白色煮之則結凍成膠吾甯波人謂之凍瓊脂又製成細條謂之洋菜皆可供食又可製印刷版

麴菌科

青黴（日）

青黴生於飯餅糊及蜜柑等之腐敗物為纖維狀之菌本體白色有間隔由本體而生多數之枝各枝又分多數細枝頂端生數個珠狀之青色胞子胞子成熟被風吹落於他物上則又生芽成新青黴

此植物為變質分解飯糊果等物

Gracilaria confervoides *Grev.*



Porphyra tenera *Kjellm.*

紫菜（漢）　紅綿科（牛毛海苔科）

紫菜。產於淺海。為紫紅色之藻類。形扁平而長。著生於砂礫之上。濾為紙狀。可供食用。

江蘺（漢）　頭髮菜（日）　頭髮菜科

江蘺。多產於日本近海。暗紅色之海藻也。體為細圓柱狀。生多數之枝。繁殖器為半球形之突起。生於體之各處。取其灰汁煮綠色之物。以供食用。日本習慣食魚肉必加此植物。

Claviceps purpurea *Tul.*

麥角菌（ㄟ）　肉座菌科

麥角菌者。寄生於麥類及其他禾本科之植物。為隱花植物。由麥類等之子房。生黑紫色角狀之堅體。稱之為麥角云。

麥角為止血藥。又用於收縮子宮。然以其為劇藥。不可用之過量。

Exoascus Cerasi *Sadebeck.*

天狗巢菌（日）　外子囊菌科

天狗巢菌者。寄生於高等顯化植物之枝。能使其宿主植物之葉。變為繁茂小枝。遠望之如鳥巢然。植林家最所嫌惡。

Aspergillus Oryzae Wehm.

麴菌科

麴菌　糀菌（日）

麴菌自生於日本各地。為纖維狀植物。合多細胞而成。集生於枝之頂端。作球形為多數胞子。

此菌有變澱粉為葡萄糖之作用。生於蒸米者稱為米麴。加於飯造甘酒及蒸米與水則糖化其澱粉。由酵母菌作用。可釀造清酒。又此菌若生長於麥類。即為麥麴。生長於豆類。即為豆麴。



Saccharomyces

酵母菌科

釀母菌　酵母菌　酒母菌（日）

英名 Yeast

酵母菌自生於各地。單細胞植物也。由出芽法而繁殖。

此菌有分離糖類。為酒精及炭酸瓦斯之作用。麥酒則由麥酒酵母菌而釀成。清酒則由清酒酵母菌而釀成。葡萄酒則由葡萄酒酵母菌而釀成。

Cortinellus Shiitake *Henn.*

香蕈（漢）椎茸（日）　菌蕈科

香蕈者寄生於楢櫟槲等枯木之皮。為菌類體由纖維而成。上如笠。下具柄。以是為繁殖器。

鮮乾皆可供食。芳香味美。亦可以人工種之。

Cortinellus edodes *Henn.*

松蕈（漢）松茸（日）　菌蕈科

松蕈生於赤松樹下。為隱花植物。體由蜘蛛網狀之纖維而成。其繁殖器即笠狀之蕈及柄。大者徑四寸許。柄長三寸許。有特殊之芳香。笠下面具多數放射狀之襞。襞面生微細胞子。

亦稱松茸。可供食用。

Hirneola polytricha *Fr. Sclavoet.*

Hydnum olidum *Berk.*

茅蕈科

茅蕈（漢）

茅蕈生於山野樹下之地中。為纖維狀植物。由多數細胞而成。十分成長。則地上生笠及柄之繁殖器。色黑。笠畧似漏斗狀。下面有多數毛狀突起。內含胞子。其繁殖器乾之。可供食用。氣香味美。

木耳科

木耳（漢）

木耳。寄生於接骨木及桑樹等處。為隱花植物。大者二三寸。形如人耳。為膠質茶褐色之繁殖器。裡面極平滑。乾燥而貯藏之。可供食用。白色者稱銀耳。尤貴。

Cetraria islandica *Ach.*

乙斯蘭土苔依蘭苔(日)丕挨米立挨科
依蘭苔產於高山多年生之隱花植物也
體灰白而略帶綠色扁平分枝枝緣有多
數毛狀突起
為滋養藥又供食用



Umbilicaria esculenta *Mink.*

石茸(漢)　石茸科
石茸亦作石耳自生於深山岩石上多年
生之扁平隱花植物也體圓形或楕圓形
徑約一二寸面黑色具多數小突起由中
央短柄附著於岩石上面灰白色而平滑
乾時供食用



Formes japonicus *Fr.*

Rhizopogon rubescens *Tul.*

麥蕈（漢）松露（日）　麥蕈科

麥蕈自生於松林土中為菌類體成於纖維由纖維而生球形之繁殖器日本人稱為松露可供食用

紫芝（漢）靈芝（中俗）　多孔菌科

紫芝寄生於枯木之隱花植物體呈纖維狀繁殖器由笠及柄而成質堅而不朽腐笠畧如半圓形上面黑褐色有光澤下面白色或黃褐色具多數細孔人家採取之陳設於几上以供清賞

Pteris serrulata d.

Polytrichum commune L.

土馬騣科

土馬騣（漢）

土馬騣者自生於山地為常綠之隱花植物高四五寸莖細長直立密生披針狀之小葉子囊為方形有長柄生於莖之頂破子囊之笠密生長毛

羊齒科

井口邊草

井口邊草者產於到處之石壁間葉有無性及有性之別無性葉分裂為羽狀裂片有鋸齒有性葉則分裂雖相同而緣邊有子囊群

Marchantia polymorpha *L.*

Roccella tinctoria *DC.*

里篤麻斯苔（目）　里篤麻斯地衣科

里篤麻斯苔自生於卡那利衣島及其附近島嶼海岸之岩石上為隱花植物體細長而分歧且生突起之繁殖器

由其體製里篤麻斯液及里篤麻斯試驗紙

地錢（漢）　地錢科

地錢自生於陰濕地為綠色扁平之隱花植物以毛狀之根固著於地雌雄異株雄株具柄為盤狀體雌株作破傘形又扁平體上處處凹陷如杯內生綠色小芽為繁殖器形畧如錢故名



Polypodium vulgare *L.*
var. japonicum *Fr.et Sav.*

Polypodium tricuspe *Sw.*

水龍骨科

岩澤瀉（日）

岩澤瀉者自生於深山樹上多年生之隱花植物葉長四五寸形頗類慈姑子囊之各羣為圓形生於葉之裡面

栽之為觀賞用

水龍骨科

水龍骨（漢）

水龍骨者山地自生之多年生草蓝匍匐於地中葉常綠為羽狀下面生圓集之子囊群

栽之為觀賞用

Woodwardia radicanssin.
Var. orientalis Lürs.

Cyathea spinulosa *Wall.*

持子羊齒（日）　羊齒科

持子羊齒者。自生於山地。葉大。為羽狀複葉。質甚厚。羽片更深裂而為羽狀。下面生子囊群及胞子。又葉之上面出無性芽。能蕃殖。特別種類也。

桫欏（漢）　桫欏科

桫欏者。產於日本南部諸島。為木狀羊齒。於柱狀之幹頂。叢生大葉。葉畧似蕨。裡面生子囊。子囊各處之周圍。有盃狀之包被。幹可為床柱活筒。又栽之為觀賞用。

Aspidium decursive-pinnatum *Kze.*

水龍骨科

蚰蜒羊齒（日）

蚰蜒羊齒。自生於山野。多年生之隱花植物也。莖細。生於地下。葉長一尺餘。分裂為羽狀。有毛。子囊集為圓形。

Pteridium aquilinum *Kuhn.*

水龍骨科

蕨（漢）

蕨者。自生於山野。多年生之隱花植物也。莖匍匐於地中。幼葉捲曲如拳。後成重複葉。長三四尺。葉之下面緣邊生繁殖器子嚢。赤褐色。

幼葉可食。從地下莖採取澱粉。可作粔籹及糊料用。又搗其莖可作繩。

Pteris cretica L.

大葉井口邊草（日）　水龍骨科

大葉井口邊草。山野自生之多年生草。莖存於地中。葉大為羽狀複葉。有長柄。小葉細長而尖。長四五寸。子囊生於小葉下面之緣部。緣邊反捲。故為之被覆。

栽培之為觀賞用。

Adiantum pedatum L.

孔雀羊齒、孔雀草（日）　水龍骨科

孔雀草者。自生於山地。多年生之隱花植物。葉為複葉。由多數小葉而成。狀似孔雀之擴毛。葉柄黑色有光澤。

栽培之為觀賞用。

Davallia bullata *Wall.*

海州骨碎補（漢）　忍草（日）　水龍骨科

海州骨碎補多年生之隱花植物。莖細長。匍匐於樹上或石上。密生褐色鱗毛。葉為三回羽狀複葉。下面生多數子囊群。各子囊群稍具盃狀之被包。

供觀賞用。根入藥。補傷折有效。

Nephrolepis cordifolia *Presl.*

玉羊齒（日）　水龍骨科

玉羊齒者。自生於日本之暖地。多年生之隱花植物。莖細長而匍匐於地下。生塊狀莖。故有玉羊齒之名。葉為細長之羽狀複葉。叢生多數。長二尺餘。子囊集生為腎臟形。具同形之被包。

栽培之為觀賞用。

Asplenium japonicum *Thunb.*

阿斯浦來尼吳木加旁尼苔木(拉)　水龍骨科

此植物自生於山野之陰地。多年生之隱花植物也。由根狀莖出葉於地上。葉為羽狀複葉。有長柄。子囊群為直線狀。生於葉之下面。具膜質直線狀之被包。

Blechnum Spicant *Roth.*

獅子頭(日)　水龍骨科

獅子頭者。山地自生。常綠之隱花植物。數葉叢生。為櫛齒狀。生胞子之葉。尤呈細櫛齒狀。初綠。後變為褐色。有毒植物。祇供觀賞。

Lygodium japonicum *Sw.*

海金砂科

海金砂者自生於山野多年生之隱花植物有細莖纏繞於他物葉為複葉以分裂之小葉而成小葉裏面生子囊子囊一端有畧似帽狀之彈性環

栽培之為觀賞用

Osmunda regalis *L.*
var. japonica *Miqu.*

薇科

薇(漢)

薇者自生於山野為多年生之隱花植物高二三尺尖端卷曲如旋渦葉有二種一色綠為二回羽狀複葉由長卵形之小葉而成一為褐色由細長之小葉而成著多數子囊

嫩葉可食又取嫩葉所被之綿狀毛可為織物料

Nephrodium Filix-mas *Rich.*

Gleichenia longissima *Bl.*

水龍骨科

綿馬（日）

綿馬者自生於山地多年生之隱花植物也葉為羽狀複葉有鱗狀之毛長達三四尺多數叢生子囊生於葉之下面具圓腎臟形之被包

地下莖供藥用有驅除條蟲之效

裏白科

裏白（日）

裏白者自生於日本之暖地多年生草也莖匍匐於地中葉常綠頂端有芽年年生長高四五尺葉之枝為羽狀上面鮮綠色下面帶白色故名為裏白

葉用於歲首之飾葉柄可用編為箸籠等物

Equisetum arvense *L.*

Azolla pinnata, R. Br.
var. africana, Baker.

滿江紅　槐葉蘋科

滿江紅者水田池沼自生之小隱花植物。密生小葉及根狀葉。形態與槐葉蘋同。胞子之生成全同於槐葉蘋。秋末變綠紅色。故有此名。

觀賞用然繁茂於水田時。為稻之大害。

問荊（漢）杉菜（日）　木賊科

問荊者自生於山野。多年生之隱花植物。地下莖橫臥甚長。有綠色之莖分出於地上。成二種。一中空有節。每節有鞘狀小葉。枝條輪生。謂之稈莖。一頂端有筆頭狀之繁殖器。著生胞子。無枝葉。謂之實莖。故曰本又稱為筆頭菜。

筆頭菜可為蔬

Marsilia quadrifolia L.

蘋科

蘋（漢）

蘋者。自生於淺水。多年生之隱花植物。莖細長。匍匐於地中。葉為有柄之複葉。合四小葉而成。近根處有極堅之囊狀物。中生胞子。

Salvinia natans *Hoffm.*

槐葉蘋科

槐葉蘋（漢）

槐葉蘋。生於水田池沼等處之隱花植物。無根。有細長之莖。葉三個輪生。分為二種。一綠色。楕圓形。浮於水面。一為狀如根。下垂水中。出球形之囊狀體。中生子囊。

Lycopodium clavatum *L.*

Selaginella involvens *Spring.*

石松科

石松（漢）

石松者自生於山地。為多年生蔓狀之隱花植物也。莖匍匐於地上。長達數尺。葉細長而尖。密生於莖。繁殖器生於特別之直立枝。

供觀賞用。胞子與根莖並入藥。胞子稱石松子。可為丸藥之衣。又可撒布於人體之糜爛部。

卷柏科

卷柏（漢）

卷柏者自生於山地之岩石上。多年生之隱花植物也。莖高一尺餘。生多數之枝。葉為小形鱗狀。稍類於扁柏之葉。燥則枝向內方卷曲。濕則開展。枝端生子囊。其性耐久。亦名長生不死草。

Lycopodium serratum *Thunb.*

Equisetum hiemale *L.*

木賊科

木賊（漢）

木賊者自生於山野。為常綠灌木。多年生之隱花植物。高二尺餘。莖綠色。中空如管狀。每寸許有節。無枝。節間生退化葉。葉為鱗狀及鞘狀。莖頂生筆頭狀之繁殖器。莖粗糙。可用以磨木材及骨角等物。又栽培之為觀賞用。

石松科

岸芝（日）

岸芝者自生於山野。多年生之隱花植物。高一尺餘。葉細長而尖。有鋸齒。密生於莖。子囊畏呈腎臟形。每葉腋間生子囊一。栽培之為觀賞用。

Cycas revoluta *Thunb.*

鳳尾松（漢）蘇鐵（俗）鐵樹（俗）蘇鐵科

鳳尾松。一名鳳尾蕉。自生南部暖地。為常綠樹。高達丈餘。葉集生於莖頂。為大形羽狀複葉。以細長多數之小葉而成。花單性。雌雄異株。

栽培之為觀賞用。種子可食。又可從莖之中部。採取澱粉。葉可編為籃笠等。

Ginkgo biloba *L.*

公孫樹（漢）銀杏（漢）白果（中俗）公孫樹科

公孫樹。栽培於庭園。為落葉喬木。高達十丈餘。葉為扇形。通常二裂。至秋變為黃色脫落。花小。單性。雌雄異株。結實頗繁。霜後肉爛。取核為果。色白故稱白果。

材質堅重。製器不裂。仁可供食。

Selaginella caulescens *Spring*

Selaginella Kraussiana *A. Br.*

兗州卷柏（漢）　卷柏科

兗州卷柏者自生於兗州山地為多年生之隱花植物高七八寸地上莖細長而上部出數枝密生小形鱗狀之葉各枝悉為一平面

栽培之為觀賞用

地柏（漢）　卷柏科

地柏自生於山野多年生之隱花植物也莖細長匍匐於地上葉小狀如鱗葉面之下部有舌片子囊集生於特別之枝

栽培之為觀賞用

Podocarpus Nagein *H. Br.*

Torreya nucifera *S.et Z.*

榧（漢）　一位科

榧者自生於山地為常綠喬木高數丈葉線形而尖互生花單性雌雄異株實大如棗兩端皆尖為核果狀俗稱香榧子材為建築用又為碁盤及其他器具之料仁可食榨油可點燈

竹柏（漢）　一位科

竹柏生峩眉山中為常綠樹高數丈葉對生為楕圓形有平行脈花單性雌雄異株種子球形以其葉似竹葉類柏而亭直故名栽培之為觀賞用材可為器具及建築之料



Taxus cuspidata S. et Z.

一位（日）　一位科

一位者自生於深山。為常綠喬木。高約五丈。葉細長而尖。上面深綠色。下面色淡。花小單性。雌雄異株。雌花由一個胚珠而成。下有盃狀假種皮。種子狀如堅果。其一半被包於赤色肉質之假種皮。

材可為建築木板及器具之料。假種皮成熟時可供食用。昔時以其材作笏。用頗著名。

Cephalotaxus drupacea S. et Z.

粗榧（漢）　一位科

粗榧自生於山野。為常綠喬木。高約三丈。葉細長而尖。裏面有白色蠟質。花小單性。雌雄異株。種子狀如核果。

材供器具之用。種子榨油。可供燈火及其他之用。

Pinus Thunbergii, Parl.

黑松（漢）　松科

黑松皮皺似於赤松常綠喬木也芽灰白色樹皮黑褐色作鱗片狀以其葉較粗硬得區別於赤松

效用與赤松畧同惟作為燃料火力較強樹脂可製松香油

Thujopsis dolabrata S. et Z.

羅漢柏（漢）　松科

羅漢柏山地自生之常綠樹也高約十丈葉呈鱗狀頗類扁柏而大逾數倍實為球果由少數鱗片而成

材可供建築及器具之料樹皮可製火繩又栽培於庭園中足供觀賞

Pinus densiflora S. & Z.

Podocarpus chinensis *Wall.*

羅漢松（漢）槙　柏槙（日）一位科

羅漢松自生於山地。為常綠喬木。高數丈。葉細長互生。花單性。果分二部。下部為肉質。熟則呈赤色。上部為種子。綠色。材供建築及器具之料。又栽培之為觀賞用。或植之以抵蕃籬。

赤松（漢）雌松（日）及黑松（漢）雄松（日）松科

赤松為松之別種。山野自生之常綠喬木也。高十餘丈。樹皮及牙皆赤色。葉針狀。二針一莖。花單性。雄花生於幼枝基部。由多數雄蕊而成。雌花生於幼枝頂部。由多數鱗狀雌蕊而成。實為卵形之球果。成於多數鱗片。

材供建築器具及燃料用。樹枝可加於藥煉及膏藥。

Thuja japonica *Maxim.*

Cunninghamia sinensis *R. Br.*

此物自生於山地。為常綠喬木。高四丈餘。葉似羅漢柏而小。花單性。雌雄同株。實為小形球果。由少數之鱗片而成。

材供建築及器具之用。色淡黑。又可栽培之為觀賞用。

沙木（漢）廣葉杉（日）　松科

沙木。為我國南部原產之常綠樹。幹端直。大者高八九丈。樹皮酷似杉葉。互生。為線狀披針形。花單性。雌雄同株。結實與赤松之毬果畧相類。

其材堅挺。國人多取以製棺。謂之沙方。



Sciadopitys verticillata *S.et Z.*

Abies balsamea *Mill.*

金松（漢）　松科

金松者產於山地為常綠樹高數丈葉線形輪生花單性雌雄同株實為球果似松類之果實

材可為建築及器具之料樹皮稱為槙肌用於塞桶之漏口又可栽於庭園為觀賞用

卡那達巴魯撒姆樹（拉）　松科

北美原產之常綠樹高四五丈葉及花頗類於樅果實畧似圓柱形排出多量樹脂樹脂即稱卡那達巴魯撒姆主用於作顯微鏡標本又可栽培之為觀賞用

Chamaecyparis pisifera *S.et Z.*

Tsuga diversifolia *Maxim.*

米姆(日)　松科

米姆者山地自生之常綠喬木高及數丈葉為短線形末端有淺二裂實為卵形小球果有甚短之柄

材供建築器具薪及製紙之料樹皮為染料又栽培之為觀賞用

花柏(漢)　松科

花柏自生於山地或栽培之常綠樹也高數丈葉小為鱗狀而尖且層層伸展花單性雌雄同株實為毬果而圓

材為建築器具料特用於作桶類又栽培之為觀賞用



Pinus pentaphylla *Mayr.*

五鬚松（漢）　松科

五鬚松者山地自生之常綠喬木。高數丈。葉為針形。每五箇叢生。實毬果。為長楕圓形。由不彎曲之鱗片而成。

材為建築及器具之料。又可供觀賞。

Thuja orientalis *L.*

側柏（漢）　松科

側柏為我國北部原產之常綠灌木。高六七尺。葉鱗狀。矗立。畧似扁柏。花單性。雌雄同株。實為毬果。鱗片之端尖而卷曲。

庭園中多植之。又可栽培為蕃籬之用。

Pinus koraiensis S. et Z.

海松（漢名朝鮮松）　松科

海松產於寒地今關東及直隸等處多有之為常綠喬木高數丈葉長針狀每五箇叢生花單性雌雄同株實為毬果而大長六七寸子如巴豆有三稜栽培之為觀賞用又子可供食

Juniperus communis L.

杜松（日）　松科

杜松產於北半球之温帶中為常綠樹高約一丈五尺葉呈針狀每三箇輪生實為肉質之毬果此果入藥用於利尿劑及興奮劑又可釀酒或附香氣於肉類酒類



Tsuga Sieboldi *Carr.*

Cryptomeria japonica *Don.*

杉（漢）椙 日　松科

杉多生於山野。為常綠喬木。幹端直。高數丈。葉針狀而小。稍彎曲向上方。花單性。雌雄同株。實為毬果。大如指頭。材供建築及器具之用。枝葉作燃料。葉又可作線香。我國森林多栽此木。

栂（日）　松科

自生於山地。為常綠喬木。高達三四丈。葉為線形。末端二裂。花單性。雌雄同株。實為卵形之毬果。稍類於松毬。材供建築及器具之用。又可為薪料。

Larix leptolepis *Gord.*



Juniperus chinensis *L.*

檜　檜柏（漢）　松　科

檜亦稱檜柏自生於山地為常綠灌木高丈餘葉有二種一為針狀一為小鱗片狀花單性甚小果實毬形畧帶肉質

材供建築器具之料又栽培之為觀賞用

落葉松（漢）富士松（日）　松　科

落葉松者口外高寒之地多有之為山地自生之落葉喬木高數丈枝幹與赤松無異葉叢生亦針狀而細長惟經霜雪後則盡脫花單性雌雄同株實為卵形毬果

材供建築及器具料又其質甚堅根株歷久不朽沉埋水土中則更為石可供磨礪之需

Juniperus rigida S. et Z.

Chamaecyparis obtusa S. et Z.

杜松（漢）　松科

杜松者自生於山野。為常綠樹。高二三丈。葉細長而尖。略為針狀。花小單性。雌雄異株。果實肉質。形如圓球。熟則色黑。

材供建築器具之料。又栽培之為觀賞用。

扁柏（漢）檜（日）　松科

扁柏自生於山野。為常綠喬木。高者十餘丈。葉為鱗狀而小。密著於莖。全不舒放。花單性。雌雄同株。結實為毬形之果。

材可供建築。又以其質理緻密。可製家具。樹皮可作火繩。實為藥用。稱柏子仁。又栽培之為觀賞用。

Typha japonica *Miq.*

香蒲科

香蒲（漢）

香蒲自生於池沼為多年生草高五六尺葉細長而尖有平行脈花單性為圓柱狀花序雌花在下雄花在上花蕊如金粉謂之蒲黃

葉作席扇及裹物之蒲包等實可為墊褥之襯絮及引火之火絨莖葉之嫩者可食

Pandanus odoratissimus *L.*

榮蘭科

榮蘭（露兜樹）（日）

榮蘭者日本暖地自生之常綠樹生大氣根高二丈餘葉細長而尖有銳鋸齒具平行脈花為單性而小雌雄異株栽培之為觀賞用又葉可編籠及帽臺灣巴那馬帽即以此葉製之

Ephedra vulgaris *Rich.*
var. helvetica *H. et T.*

Abies firma *S. et Z.*

松科

樅（漢）**椵**（日）

樅都自生於山地。為常綠喬木。高數丈。葉互生。為線形。末端二裂。花單性。雌雄同株。實為長卵形之大毬果。熟則鱗片脫落。材供建築器具及製紙料。又栽培之為觀賞用。

麻黃科

麻黃（漢）

麻黃自生於地中海沿岸。我國中部各省亦產生之。為小灌木。形狀頗似木賊。莖有節甚顯。節間有小鱗狀葉並生。小枝。花單性。

含有毒成分。莖及根節俱入藥用。為收斂劑。治下痢盜汗等症。



Najas major All.

茨藻科

茨藻（日）

茨藻者自生於池沼等之水草也長一二尺葉細長有鋸齒對生或輪生花單性雌雄異株

Sagittaria sagittifolia L.
var. longiloba Turcz.

澤瀉科

澤瀉（漢）

澤瀉自生於池沼水田等處為多年生草葉似慈姑而甚細故俗稱野慈姑莖端結慈淡碧色形似如意閩人謂之如意菜花白色地下有毬狀莖

栽培之為觀賞用嫩苗可食毬莖可供藥用



Potamogeton crispus *L.*

Zostera marina *L.*

大葉藻（漢）　眼子菜科

大葉藻。生於淺海中。為多年生草。根狀莖匍匐於地。為肉質。葉細長。長達一尺至二三尺。花小。近於葉之基部。則隱存於鞘內。莖葉均可為肥料。乾葉可為椅墊及綿被之襯。絮葉之基部。有甘味。海邊兒童恒採食之。

眼子菜科

蝦藻（日）

沈於淡水中之多年生草。葉細長。鈍頭。緣邊有波狀縐縮。互生於細長之莖。花小。排列為穗狀花序。



Hydrocharis asiatica *Miq.*

Vallisneria spiralis *L.*

水鼈科

苦草（漢）

苦草生於水中為多年生草高一二尺葉叢生而細長有平行脈花單性雌花以長花梗而突出於水面受花粉後花梗為螺旋狀之卷縮而降於水中雄花成熟則脫落而浮於水面

水鼈科

水鼈（漢）

水鼈者水中自生之雜草也葉為圓心臟形有長柄浮於水面花單性辨色白

Hydrilla verticillata *Casp.*
var. Roxburghii *Casp.*

Sagittaria sagittifolia *L.*

澤瀉科

慈姑（漢）

慈姑一作茨菰多栽於水田為多年生草高三四尺地下有塊狀莖葉為箭形有長葉柄花白色排列為圓錐花序地下塊狀莖可供食用

水鼈科

黑藻（日）

黑藻者自生於日本之各地為多年生之水草有細長莖葉輪生為披針形有小鋸齒花小單性

Setaria viridis *Beauv.*

Oryza sativa *L.*

稻粳糯米（漢）　禾本科

稻為最重要之農作物。東南各省多植之於水田。亦一年生草也。高四五尺。莖中空。有節甚顯。葉細長而尖。有平行脈。互生。花小。雄蕊六。排列為圓錐花序。實為穎果。內外有二殼包之。其種甚多。約分粳糯兩類。實去殼者即謂之米。除供糧食外。其藁可製繩及草鞋等。又可為抄紙之原料。穀皮即糠。可供種種之用。

狗尾草（漢）　禾本科

狗尾草。山野自生一年生草。高一二尺。莖葉似粟而小。葉柄有鞘狀之苞圍莖。莖頂叢生細實。有綠色長芒。集合為穗。形似狗尾。故名。

Setaria italica *Kth.*
var. germanica *Kth.*

Panicum *L.*

粟（漢）　禾本科

粟為穀類植物。一年生草。即粱也。高四五尺。葉類於玉蜀黍。惟長而且狹。花小密集為圓錐花序。穗有芒。實為小粒。色白而黃。俗呼為小米。

小米為北方糧食之大宗。其莖葉可供牛馬類之食料。

䅟阿俺奴阿（拉）　禾本科

此植物自生於原野。為雜草。高二三寸至八九寸。葉細長而互生。花小而綠色。排列為圓錐花序。早春開花。

為家畜之飼料。



Eragrostis ferruginea *Beauv.*

Trisetum cernuum *Trin.*

知風草（浙）香香草（甲仙）　禾本科

知風草者。原野自生之雜草。高二尺餘。葉細長而夾。有平行脉。葉柄作鞘狀。圍莖。花密集為長卵形之小穗狀花序。集多數小穗狀花序。又為圓錐花序。此花雖微風亦善搖動。清一統志。謂為廣東出。土人視其節以占一歲風候。每一節則一風。無節則無風。

釣蟹草（日）　禾本科

釣蟹草。山野自生之雜草。高二三尺。葉細長而夾。有平行脉。葉柄為鞘狀。包莖。花通常每三個集為小穗狀。各花之外殼有芒。

Andropogon Nardus *L.*
var. Goeringii *Hack.*

旋刈萱（日）　禾本科

旋刈萱者山野自生之雜草。高三四尺。葉細長而尖。莖上部生枝。著多數下垂之小穗狀花序。

錫蘭島人蒸餾之。採取其揮發油為香水。

Hordeum sativum *Jess.*

大麥（漢）　禾本科

大麥為農作物之重要者。多產於北方。一年生或越年生草也。高三四尺。莖中空有節。葉細長而尖。脈平行。下有鞘狀之苞以圍莖。花排列為穗狀。各花下部有細長之穎二。穀之上端有長芒。

種子可為飯。或炒為麥焦。及麥湯。其萌芽可為麥酒之原料。又混於米飯及他澱粉質。可製飴。莖可編帽製扇及玩具等。

Cynodon Dactylon *Pers.*

Panicum miliaceum *L.*

禾本科

稷（漢）

稷者高粱也。江淮以北多種之。為一年生草。苗有紅白二種。紅者尤多。高四五尺。葉細長而尖。有平行脈。具粗毛。花有三雄蕊。花序為小穗狀。由一花而成。形成則下垂為圓錐花序。

穀類中種之最早。古稱為百穀之長。故農官及穀神皆名稷。種子含富有粘力性之物。可為餅而食之。

禾本科

行儀芝（日）

行儀芝。原野自生。多年生草。高約尺許。葉細長而尖。有平行脈。畧似於結縷草。花序成於三至五排列呈掌狀之枝。各枝有多數無柄之小穗狀花序。而各小穗狀花序由一花而成。

根莖入藥。用為清血劑。

Avena sativa *L.*

烏麥（日）　禾本科

烏麥栽培者多一年生草高二尺餘葉細長而尖有平行脈具鞘狀葉梢花每二個集為小穗狀花序其中一花有芒他花則無芒小穗狀花序又排列為圓錐花序果實供食用又此植物為牧草

Miscanthus tinctorius *Hack.*

青茅（漢）刈安（日）　禾本科

青茅產山地自生多年生草高三尺餘葉細長而尖類於芒葉花雖與芒花相似但花穗數少故能區別於芒花

取其莖葉而乾之可為黃色染料

Saccharum officinarum *L.*

Triticum sativum *Lam.* var. vulgare *Hack.*

小麥（漢）　禾本科

小麥栽培者多越年生草或一年生草高三四尺莖中空有節葉細長端尖有平行脈花小排列為複穗狀花序其兩側有舟狀之穎果芒甚短

子多粉可為切麵麵包饅飩餅餌及種種點心類之料或釀造甜醬醬油莖可編作草帽

甘蔗（漢）砂糖黍（日）　禾本科

甘蔗為熱帶植物閩廣多栽植之多年生草高丈許葉狹而尖長二三尺莖之外形與竹相似而中不空花單性雄花生於莖梢雌花生於葉腋有巨苞包之

莖可製砂糖亦可生食

Briza maxima *L.*

小判草（日）俵麥（日）　禾本科

小判草者歐洲南部原產之一年生草高約尺許葉細長而尖有平行脈花集為扁平小判狀之花序以長柄而下垂栽培之為觀賞用

Arthraxon ciliare *Beauv.*

蓋草（漢）　禾本科

蓋草山野自生越年生草高一二尺葉為廣披針形或長卵形而尖有平行脈花紫褐色為長穗狀花而花序又數個叢生其汁可為黃色染料日本八丈島人多用之染黃八丈絹故有八丈刈安之名

Alopecurus fulvus *L.*

Miscanthus sinensis *Anders*

芒（漢）薄（合）　禾本科

芒者山野自生多年生草高五六尺葉細長而起有平行脈質堅傷人如鋒刃花集生為長穗狀花序數花序又簇生於莖之上部

莖葉可編為草履又足供觀賞用日本以此植物為秋七草之一

看麥娘（漢）雀鐵砲（日）　禾本科

看麥娘多生於麥田之中為多年生或一年生草莖稍傾斜於地上葉細長而起有平行脈花小為圓柱狀穗以其簇生且隨風顫動能驅雀故名

Coix agrestis *Lour.*

Zoysia pungens *Willd.*

結縷草（漢）芝草（日）　禾本科

結縷草山野自生多年生之小草莖細長而匍匐於地隨處生細根如線相結故名葉細長而尖長二寸餘花小為穗狀花序植於庭園隄防等處

川穀（漢）數珠玉（日）　禾本科

川穀者東印度原產之一年生草高四五尺葉類於麥花單性雄花為穗狀花序生於雌花之上實為卵形之穎果有琺瑯質狀之堅殼實可為念珠及食用

Pennisetum japonicum *Trin.*

Imperata arundinacea *Cyr.*

白茅（漢）　禾本科

白茅者自生於山野。為多年生草。高一二尺。苗如鐵。俗稱茅鐵。葉細長而尖。有平行脈。花集生於莖之上部。果實密生白毛。長二寸許。

實之白毛。可為引火之火絨。葉可作簾。根味甜。入藥。

狼尾草（漢）　禾本科

狼尾草。生於道旁。為多年生之雜草。高二三尺。葉細長而尖。有平行脈。花集生於莖之上部。為穗狀花序。畧似狼尾。花包之殼及生於殼上之長毛。皆黑褐色。

古時用以覆屋。荒年亦可採食。

Paspalum Thunbergii *Kth.*

雀稗（日）　禾本科

雀稗都自生於園圃。越年生草。高一二尺。葉細長而尖。有平行脈。花莖生數枝。各枝著多數小花。成穗狀花序。為家畜之飼料。

Zea Mays *L.*

玉蜀黍（漢）　棒子（俗）　禾本科

玉蜀黍都產於蜀地。北方亦多有之。一年生草。高七八尺。葉為大披針形。花單性。雌雄同株。雌花排列為穗狀花序。以巨苞裹之。出長毛狀之花柱。果實為釀酒料及食用。

Phyllostachys puberula *Munro.*

淡竹多生於暖地多年生之常綠植物高二三丈地上莖由地下莖而生中空節甚顯有二條環狀突起葉為披針形有平行脈籜無斑點

地上莖供建築及器具用籜為笠及草履等原料筍供食用又栽培之為觀賞用

Coix lacryma *L.*

薏苡(漢)　鳩麥(日)　禾本科

薏苡者栽培於園圃一年生草高四五尺葉狹長有平行脈花生於葉腋酷似川穀然果實則呈楕圓形皮無琺瑯狀之堅質以此為別

仁色白可雜米中作粥飯及磨麵俗稱為米仁並入藥

Panicum Crus Galli *L.*

Eleusine indica *Gaertn.*

力草（漢）　禾本科

力草。原野自生之雜草。高一尺餘。葉細長而尖。有平行脈。叢生。花序為長穗狀。集生於莖之頂端。

為家畜飼料用。

稗（漢）　禾本科

稗。粟類。原野自生之一年生草。高一二尺至三四尺。葉細長而尖。有平行脈。花小。殼具芒。排列為圓錐花序。

為家畜飼料。亦可煮粥磨麵為食。

Zizania aquatica *L.*

菰者自生於淺水為多年生草高五六尺葉細長而尖如蒲葦有平行脈花單性排列成大圓錐花序雌雄並生於同一花序葉可製席中心生白薹曰菰菜俗謂之茭白可供蔬食結實如米色白而滑膩謂之菰米儉歲可以為飯

Lolium temulentum *L.*

毒麥（目）　禾本科

毒麥者歐州原產之一年生草高三尺餘葉類於麥花集生而為小穗狀花序各花序下部出長穎性有毒近年始輸入於日本

Panicum frumentaceum *Roxb.*

Phyllostachys mitis *Riv.*

穇（漢）　禾本科

穇。粟類。山東河南多種之。為一年生草。高三四尺。葉細長而尖。有平行脉。花小。排列為圓錐花序。花序之上部畧彎曲。實如粟粒而細。赤色。

種子可煮粥磨麵。味畧澀。雜糧之一種也。

江南竹（漢）孟宗竹（日）　禾本科

江南竹。多生於我國暖地。為多年生之常綠植物。高三丈餘。地上莖中空有節。節間具一條環狀突起。葉為披針形。脉平行。籜有斑點。

地上莖供建築器具用。籜為笠及草履等原料。筍供食用。又栽培之為觀賞用。

Themeda Forskali *Hack.*
var. japonica *Hack.*

刈萱者山野自生。多年生草。高二三尺。葉細長而尖。有平行脈。花排列為小穗狀花序。有長芒之殼。集數小穗狀花序。更為圓錐花序。

根强靭。可製刷子及束藁等用。

Carex dispalathn *Boott.*

笠莎（日）　莎草科

笠莎者山野自生。多年生草。高三四尺。葉細長而尖。幅三四分。花單性。雌雄皆為穗狀花序。雄花序位於雌花序之上。

幹葉可編笠。

Phragmites communis *Trin.*

Bambusa Veitchii *Carr.*

箬竹（漢）山白竹（漢）　禾本科

箬竹山野自生常綠多年生之植物高三四尺莖中空而細長有明瞭之節葉大為廣披針形具平行脈緣邊帶白色莖製籠及其他筍為食用籜可裹糍製笠需用甚繁

蘆（漢）葦（漢）　禾本科

蘆自生於濕地或淺水中多年生草高丈許莖中空葉細長而尖有平行脈花有黑色之穀排列為大圓錐花序莖可作簾葦屋或用為薪萌芽可食畧如竹筍俗稱蘆筍又植於隄防以防隄之崩壞

Cyperus tegetiformis *Roxb.*

Scirpus lacustris *L.*
var. Tabernaemontani *Trautv.*

莊芏（漢）七島藺（日）　莎草科

莊芏。植於水田。為多年生草。高四五尺。莖三稜形。狀類於蚊屋吊草。而形較大。花開於莖端。綠褐色。

莖為織蓆原料。日本人稱之為琉球表。

大藺（漢）莞（漢）　莎草科

莞者。自生於池澤。多年生草。高五六尺。莖色綠而細長。斷面圓形。上部小葉如鱗片狀。花黃綠色而小。排列成穗狀花序。集生於莖之頂端。

莖可織席。

Heleocharis plantaginea *R. Br.*

Cyperus amuricus *Maxim.*
var. j ponica *Maxim.*

蚊屋吊草（日）　莎草科

蚊屋吊草。平原自生之雜草。高一二尺。莖色綠。呈三角柱狀。上部生長葉而數少。由葉叢中央出數枝。著多數小花。

烏芋（漢）勃薺（中俗）　莎草科

烏芋者。水中自生。多年生草。高三四尺。生塊狀莖於地下。莖綠色。管狀。外形畧類於荸薺。花穗為筆頭狀。生於莖之頂端。塊狀莖供食用。

Sagus Rumphii *Willd.*

Trachycarpus excelsa *Wendl.*

撒𤔲啞椰子（日）　椶櫚科

撒𤔲啞椰子。東印度及馬來隅原產之常綠樹。高約五丈。葉大。為羽狀複葉。叢生於莖之頂端。

莖內有白色之柔部。取出澱粉。稱撒𤔲啞。可供食用。

椶櫚（漢）棕梠（日）　椶櫚科

椶櫚。暖地自生之常綠樹。莖圓柱形。不生枝。高三四丈。有雌株雄株之別。葉大。分裂成掌狀。有長柄。叢生於莖頂。花小。淡黃色。集生於多數枝之花軸。有巨苞包之。

材為床柱及器具料。葉之基部包莖之毛。可製繩帚雨具箱簟之屬。又栽培之為觀賞用。

Phytelephas macrocarpa *Ruiz.*

Oreodoxa oleracea *Mart.*

恰白玆耶子（日）　棕櫚科

恰白玆耶子西印度產之常綠樹葉為一回羽狀複葉由多數細長小葉而成果實長橢圓形幼葉可供食

象牙椰子（日）　棕櫚科

象牙椰子熱帶亞美利加原產之常綠植物莖極短叢生多數羽狀複葉果實直徑尺餘含多數種子子大如雞卵子之白胚乳甚堅以此稱為植物之象牙用作扣鈕及杖之裝飾品

Phoenix dactylifera *L.*

Livistonia chinensis *Br.*

椶櫚科

戰捷木（E）

戰捷木者產於亞非利加北部及亞細亞西南為常綠樹高五丈餘葉為羽狀複葉長達五尺花單性雌雄異株實為核果類似於棗果實供食用幼葉亦足食浸莖而出其汁液可製砂糖或釀酒材供建築生長充分則葉可編籠葉等於日桂枝束為花環狀用於表戰捷及慶祝之時

椶櫚科

蒲葵（漢）

蒲葵者吾國原產之常綠喬木酷似椶櫚葉分裂為掌狀其異於椶櫚之點即葉之裂片形大基部連接不分椶櫚則否以此為別

材供種種之用葉作笠及製團扇俗稱為芭蕉扇行銷甚廣

Calamus rotang *L.*

省籐（漢）　椶櫚科

省籐多產於熱帶地方為常綠木莖細而多刺且甚長依他木而上昇長數十丈葉丈為羽狀複葉由多數小葉而成莖編椅子籃等及他用



Acorus gramineus *Ait.*

光椰子（漢）　椶櫚科

光椰子自生於暖地酷似椰子為木本高約四丈葉為羽狀複葉由多數細長小葉而成花小單性雌雄同株取其肉穗花序之汁液可製砂糖幹之髓部可採澱粉葉柄之纖維可作繩

Carludovica palmata *R. et P.*

巴那嗎草科

巴那嗎草(日)　巴那嗎草科

巴那嗎草產於美洲熱帶地方為大形之草本植物叢生如椰櫚葉大為掌狀分裂於甚短之莖長約三尺幼葉細裂之入於熱湯次加酸水終入冷清水乃取出乾燥之則呈白色以之編帽子稱巴那嗎帽又編為盛卷烟草之器具

虎掌(漢)　浦島草(日)　舞鶴天南星(日)　天南星科

虎掌山地自生多年生草高二三尺葉分裂為掌狀有長葉柄花雖類於天南星而托之上部伸長為鈕狀性有毒味苛烈然日本之八丈島土人多取其地下莖而食之

Arisaema Thunbergii *Bl.*

Areca Catechu L.

檳榔子（漢）　棕櫚科

檳榔子。產於熱帶地。常綠喬木。高三丈餘。葉為羽狀複葉。小葉之上端呈齒嚙狀。五年始結實。實成房。簇生數百。形長而尖。剝其皮。狀如肉荳蔻。

馬來隅半島土人。細切其果。包以胡椒類葉而嚙之。以為有健胃利尿強齒之效。



Cocos nucifera L.

椰子（漢）

椰子。生於熱帶各地。為常綠樹。高約五丈。葉甚大。為羽狀複葉。叢生幹頂。花單性。雌雄同株。實有三稜。長尺許。徑四五寸。

椰子稱為植物之王。材堅緻而美麗。供建築用。葉含多量砂糖。可釀酒。果皮外圍纖維。強靭。適於網具。內層堅牢。可為杯。又富含堅胚乳。乾之為哥甸拉。具多量油。為燭及石鹼原料。並供藥用。此堅胚乳更有乳狀液。謂之椰子乳。熱帶土人視為重要食物。

Colocasia antiquorum *Schott.*



Acorus Calamus *L.*

白菖（漢）　菖蒲（俗名）　天南星科

白菖自生於池澤多年生草。根狀莖甚長。全部具特殊香氣。葉劍狀。有平行脈。長三四尺。花小。淡黃色。花序為肉穗狀。栽培之為觀賞用。俗於端午節剪其葉作劍以懸門上。根莖可入藥。為健胃劑。以一寸九節者良。

青芋（漢）　天南星科

青芋者。東印度及馬來半島原產之多年生草。今南方水田亦多植之。高四五尺。地下莖多肉。葉畧似荷而長。一端有大缺刻。柄肥大。花單性。排列成肉穗花序。雄花集生於上。雌花集生於下。花序下部具大苞。地下莖及幹葉柄俱可食。

Zantedeschia aethiopica *Spr.*

Prinsllia tuberifera *Ten.*

野芋（漢）　天南星科

野芋非洲原產之多年生草。葉畧作箭形。脈似芭蕉。有長柄。花莖由地下莖而生。長一尺餘。花單性。排列為肉穗花序。形大。有白色苞圍之。雌花在下部。雄花在上部。栽培之為觀賞用。地下莖含有毒之成分。

半夏（漢）　天南星科

半夏自生於平地。為多年生草。高七八寸。葉為複葉。由三小葉而成。葉柄生肉芽。花單性。為肉穗花序。雌花位於下。雄花位於上。花序有大苞包之。花軸上部伸長為線狀。突出於苞外。

地下[illegible]



Spirodela polyrhiza *Schleid.*

Arisaema japonicum *Bl.*

天南星科

天南星（漢）

天南星自生於山野為多年生草高三四尺葉為複葉有長柄由數個廣披針形之小葉而成花單性排列為肉穗花序覆以佛燄狀之苞乃鈍形之花軸也地下莖似芋而圓扁

入藥。性有毒。然地下莖含多量澱粉。日本人尚以為食。

浮萍科

水萍（漢）浮萍（中俗）

水萍浮於水田池沼之水面小植物也體扁平為倒卵形兩面綠者具一根上面綠下面紫赤色者根多根為無枝纖維叢生於植物體下面又俗稱為藻。

Arenga saccarifera *Labill.*

Hydrosme Rivieri *Engl.*

蒟蒻（漢）　天南星科

蒟蒻多產於蜀中。為多年生草。高二尺餘。葉掌狀複葉。由羽狀之片而成。有長葉柄。花單性。為長肉質之穗狀花序。花苞頗巨。地下肥大之球狀部。可製褐色之麪。供食用。又採取球狀部之粉末。可為輕氣球及空氣枕之塗料。以防空氣之漏洩。

石菖（漢）　石菖蒲（漢）　細葉菖蒲（宇俗）　天南星科

石菖者。自生於水邊。多年生草。有匍匐之莖。葉作細劍狀。長尺餘。亦有僅三四寸者。無中肋。花小。淡黃色。排列為肉穗花序。栽培之。置諸案頭。以供玩賞。莖可為強壯劑及明目之藥。

Aneilema Keisak *Hassk.*

鴨跖草科

水竹葉（漢）

水竹葉自生於水田池沼等處之雜草長二三尺葉披針形有平行脈互生花著於莖或枝之上端集生二三朵有綠色之萼及淡紅紫色之花瓣

Commelina communis *L.*

鴨跖草科

鴨跖草（漢）

鴨跖草自生於山野為越年生草高一尺餘葉為廣披針形有平行脈葉柄有鞘狀之苞圍於莖花藍色不整齊具編笠狀之萼

由花被搾取藍色之液浸於紙稱藍紙用為繪具



Eriocaulon nipponicum, Maxim.

穀精草科

穀精草(漢)

穀精草生於水田池沼等處由根生數線狀葉秋日抽出數莖莖頂著數個小單性花花序為頭狀在周圍者為雌花在中心者為雄花

栽培之為觀賞用

Ananas sativus *Lindl.*

鳳梨科

鳳梨(漢)阿那那斯(拉)

鳳梨自生於熱帶亞美利加及他熱帶之各地栽培者多常綠草本葉濶大而尖緣邊有大銳鋸齒花多數密集果實呈松球狀大者長五六寸頂上叢生數葉

果實甘酸芳美含有如百弗聖成分能消化蛋白質可供食用由葉取纖維作織物及紙等原料

Luzula campestris *DC.*
var. capitata *Miq*

燈心草科

雀稗（巨）

雀稗者。山野自生。多年生草。高六七尺。葉叢生。細長而尖。粗生長毛。花莖抽出於葉叢中。間密生小花。成頭狀。

Stemona sessilifolia *Miq*

百部科

百部（漢）

百部者。栽培於園圃。多年生草。高二尺餘。葉為卵形。有平行脈。每四葉或三葉輪生。花淡綠色。生於葉腋。根為塊狀莖。數十相聯綴。似天門冬。

根供藥用。有鎮咳驅蟲之効。其煎汁能殺蝨及他蟲類。以產於廣東廉州者為最佳。

Juncus effusus *L.* var. decipiens *F. Buch.*

燈心草科

燈心草(漢)

燈心草植於水田為多年生草高一二尺至四五尺莖綠色細線狀外觀如葉葉生於莖之基部及花部為鱗狀花小黃綠色有三雄蕊

莖供織席及籃等之料莖中白髓稱燈心為點燈及其他之用

Juncus prismatocarpus *R. Br.* var. Leschenaultii *F. Buch.*

燈心草科

笄石菖(日)

笄石菖者自生於濕地之雜草高一尺餘葉細長而尖花色綠小形如

Tulipa edulis *Bak.*

Polygonatum officinale *All.*

萎蕤（漢）　百合科

萎蕤亦作葳蕤。一名玉竹。山野自生之多年生草。莖柱狀而高一二尺。有肉質之根狀莖。葉長卵形。脈平行。花生於葉腋。色白微綠。下部連合作筒狀。形細小如鈴。

根莖製澱粉。及製跌打損傷藥。

山慈姑（漢）　百合科

山慈姑。山野自生之多年生草。高約五寸。葉細長。由地下莖而生。花莖生於地下莖之中央。頂端著生一花。花為白色稍紫。

莖可供食用。

Allium Ledebourianum *Schult.*

Veratrum Maximowiczii *Bak.*

青藜蘆

青藜蘆者山野自生之多年生草高二三尺葉為披針形脉平行長一二尺花色淡綠排列為圓錐花序此植物以有毒著名

百合科

麥葱（漢）絲葱（漢）

麥葱者各地栽培之多年生草也高尺許葉細長而稍扁平地下部為鱗狀莖類似薤白鱗莖及葉供食用味稍類葱而臭氣少

百合科

Trillium Smallii *Maxim.*

Lilium cordifolium *Thunb.*

蕎麥葉貝母（漢）　百合科

山地自生。多年生草。高四五尺。葉心臟形。有長葉柄。花大。白而微帶綠色。由地下鱗狀莖採取澱粉。幼葉可食。

延齡草（日）　百合科

延齡草自生於深山。多年生草。高約尺許。地上莖之上部。輪生三葉。卵圓形而尖。花梗生於葉叢中央。著一花。有三瓣及三萼片。花瓣紫色。有鈍頭。較萼片為短。實為球形漿果。

取地下莖煎汁。為治腸胃病用。

Tofieldia japonica *Miq.*

脫肥路的阿加波尼卡(拉)百合科
山地自生多年生草高一尺餘葉細長而尖類於石菖蒲花莖自葉叢中抽出著白色花為總狀序莖之上部出粘性液以捕獲蟲類及防禦害蟲
栽培之供觀賞用

Tulipa Gesneriana *L.*

鬱金香(漢)　百合科
鬱金香小亞細亞原產之多年生草高一尺餘葉為廣披針形色白花美麗而大單生於花莖之頂端香聞數十步
栽培之供觀賞用花可入藥與鬱金用根者不同

Asparagus officinalis *L.*

Chlorophytum comosum *Bak.*

石刀柏（漢）　百合科

石刀柏者。歐洲原產之多年生草。高三四尺。葉小如鱗片狀。但不甚明瞭。葉腋生細長之枝甚多。狀如綠色葉。花細小。淡綠白色。有長梗。

幼葉可食。亦稱蘆筍。

苦勞羅肥土謨卡麻司謨（拉）百合科

多年生之常綠草。生多數長匍匐枝。頂端叢生多葉。並抽出數個氣根。其葉細長而尖。并有白色線條。花小而白。有雄蕊六。

栽培之供觀賞用。

Rhodea japonica *Roth.*

Lilium tigrinum *Gawl.*

萬年青(漢)　百合科

萬年青者自生於日本南部今我國園圃處處有之多年生之常綠草也葉披針形有平行脈自地下莖而生花莖抽於葉叢中央長四五寸花淡綠帶白色排列為穗狀花序果實為球形赤色或黃色著名之觀賞植物人家宜之

卷丹(漢)　百合科

卷丹山野自生多年生草高四五尺葉披針形互生無柄葉腋生珠芽花被大色黃而赤反捲有暗紫色小點供觀賞用地下鱗狀莖為食用

Lilium speciosum *Thunb.*

鹿子百合。栽培而生。多年生草。有鱗狀莖。入於地下。葉為廣披針形。脉平行。莖高二三尺。上部著大形之數花。花被六。淡紅色。別有深紅色之突起。向外反捲。鱗狀莖有強苦味。不適食用。但供觀賞。

Reineckia carnea *Kth.*

吉祥草（漢）　百合科

吉祥草。濕地自生之多年生草。莖匍匐於地上及地下。處處叢生葉。葉叢下部生多數之根。葉細長而尖。有平行脉。長一尺餘。形狀酷似麥門冬。花莖生於葉叢中央。著多數之花。淡紫色。有六裂之花被。分根種陰崖處即活。亦可登盆。足供觀賞。

Scilla maritima *L.*

Erythronium dens-canis *L.*

百合科

海葱（漢）

海葱者自生於地中海沿岸。多年生草。高三尺餘。有鱗狀莖。似玉葱。葉為披針形。具平行脈。花莖生於葉叢中央。上部著白色小花。花序為總狀。鱗莖入藥。為利尿劑。

車前葉山葱姑（漢）　片栗（同）　百合科

山地自生。多年生草。由地下部生兩葉。中央抽花莖。葉為長卵形。有平行脈。具赤褐色斑紋。花單性。生於花莖之頂端。花被紅紫。稍類於百合花。

根莖多肉。採取之為澱粉。幼葉可食。又可為觀賞用。

Asparagus lucidus *Lindl.*

天門冬。原產於奉高今山東泰安縣山谷。今處處有之。多年生之蔓草也。以莖卷絡於他物。葉為鱗片狀。葉腋生綠色曲針狀之枝。人或往往誤枝為葉。花小。淡黃白色。每二三朵叢生。

塊狀根入藥。為強壯劑。並可製砂糖漬。供食用。

Dianella odorata *Bl.*

百合科

桔梗蘭（白）

桔梗蘭自生於暖地。多年生草。高約二尺。葉細長而尖。有平行脈。長八九寸。花生於花莖之上部。花序為圓錐形。花被六片。呈桔梗色。長三四分。實為青紫色橢圓形之漿果。大如指頭。

供觀賞用。

Hosta coerulea *Tratt.*

Convallaria majalis *L.*

紫萼（漢）紫玉簪（俗）　百合科

紫萼者。山野自生。多年生草。高二尺餘。葉為卵形。全邊。有平行脈。具長葉柄。由地下叢生。花莖出於葉叢之間。著數花於其上部。花序為總狀。花紫色或白色。花被六裂。供觀賞用。幼葉可食。

君影草（日）　百合科

君影草者。自生於亞細亞及歐羅巴之山地。多年生草。高尺許。葉皆自地下部生。為長橢圓形。全邊。有平行脈。長四五寸。花莖無葉。著花於其上部。排列為總狀花序。花白色鐘狀。有下向之花被。

供觀賞用。[illegible]

Lilium Maximowiczii *Rgl.*

小卷丹自生於山地多年生草高三四尺葉互生為披針形花由六片花被而成赤黃色又具暗色小點且反捲此植物雖酷似於卷丹而無珠芽蓋即與卷丹相異之點也

供觀賞用鱗狀莖可食

Colchicum autumnale *L.*

古爾矢屈謨（拉）　百合科

古爾矢屈謨者歐羅巴及地中海沿岸自生之多年生草高四五寸葉細長有平行脈花單生於莖頂有淡紅色之花被果實為乾果而裂開

種子稱古爾矢屈謨用於治痛風及僂麻質斯有效

Lilium avenaceum *Fisch.*

車百合（日）　百合科

車百合者山地自生多年生草地下生鱗狀莖莖出地面高二三尺葉為披針形花黃而赤有暗色斑點供觀賞用

Fritillaria camtschatensis *Gaud.*

黑百合（日）　百合科

黑百合自生於高山為多年生草高約一尺地下有鱗狀莖葉為長卵形或長橢圓形輪生花有暗紫色之花被栽培之為觀賞用又鱗狀莖可供食用

Smilax herbacea *L.* var. nipponica *Maxim.*

Smilax China *L.*

菝葜者自生於山野。為木質性之多年生植物。高二三尺至六七尺。有刺。葉互生。為卵形或楕圓形。托葉為捲鬚。以卷絡於他物。花黃綠色。集為繖形。地下部為藥用。其効用同於撒爾沙根。

百合科

牛尾菜（漢）

牛尾菜。山野自生。多年生之蔓草也。葉為卵形。互生。有托葉。而托葉又變成捲鬚。花小。黃綠色。排列為繖形花序。幼莖葉俱供食用。

Lilium japonicum *Thunb.*



Smilax medica *Schlecht.et Cham.*

百合（漢）　百合科

百合者山地自生。多年生草。高二三尺。葉短而濶。為披針形。互生。花大而白。或淡紅色。花被無斑點。

供觀賞用。鱗狀莖可食。並入藥為補肺之劑。

撒兒沙（日）　百合科

撒兒沙者中央亞美利加原產之植物。形狀類於菝葜。葉互生。畧帶心臟形。托葉細長。變化成捲鬚。

根稱撒兒沙根。用為治黴毒之藥。

Veratrum nigrum *L.*

藜蘆者。自生於山地。多年生草。莖青紫。高二三尺。葉狹長。為披針形。有平行脈。花小。紫黑色。排列為圓錐花序。根莖皆有毛。

根入藥。性有毒。

Hosta Sieboldiana *Engl.*

玉簪（漢）白鶴花（甲俗）　百合科

玉簪者。栽培於庭園。為多年生草。高四五尺。葉叢生。為卵形。有長葉柄。葉面具蠟質之白粉。花色白。排列為總狀花序。

栽培之為觀賞用。

Veratrum stamineum *Maxim.*

小梅形（日）　百合科

小梅形山地自生。多年生草。高二尺餘。葉大。互生。為廣披針形。有平行脈。花色白。較梅形草之花小。而生雌花雄花及兩性花於同株。

著名之毒草也。

Ophiopogon japonicus *Ker.*

沿階草（漢）　龍鬚（日）　百合科

沿階草。山野自生之多年生草。葉細長叢生。長一尺餘。花莖生於葉叢之中央。著小形淡紫色花。為總狀花序。果實青紫色。為球形果。

栽培於庭園花壇等處之外圍。

Disporum smilacinum *A. Gr.*

Lilium longiflorum *Thunb.*

百合科

為朝百合栽培於園圃中多年生草高二三尺葉互生為披針形有平行脈花色白而大畧呈喇叭狀常自傾斜為觀賞用植物

雅兒百合（百）　百合科

雅兒百合者山地自生為雜草高一尺餘葉互生為卵形而尖有平行脈花生莖頂有白色花被六

Heloniopsis brevicapsa *Maxim*

Allium Cepa *L.*

玉葱廣東葱洋葱(中俗)百合科

玉葱栽培而生多年生草高二三尺地下鱗狀莖畧扁而圓葉細長中空花莖圓柱形亦中空較葉為長頂著多數花花序為繖形花小白色混珠茅

歐美諸國亦栽培之近年有輸入日本者地下鱗狀莖及幼葉俱可食

海羅你握浦塞司不來唯卡捕撒(拉)百合科

山地自生多年生草高一尺餘葉叢生為倒披針形或長倒卵形有平行脈花莖生於葉叢中央上端生十餘花呈總狀花紫紅色頗美麗

Allium Scorodoprasum L.

葫大蒜也故俗稱蒜自生於歐羅巴我國得其種處處栽之為多年生草高二尺餘地下有鱗莖葉細長而扁花白色微帶紫排列為繖形花序花間混珠芽

莖葉皆可食臭氣甚烈為蔬類植物

Allium fistulosum L.

蔥(漢)胡蔥(俗)　百合科

蔥者西比利亞原產之多年生草傳入中國後徧地植之高二尺餘葉為管狀而尖中空有平行脈花白色多數集生為球形幼時以囊狀苞蔽之

四時皆可采食葉之下部色白俗謂之蔥白日本人稱為白根

Ruscus aculeatus L.

魯斯苦斯阿苦來阿土司(拉)百合科

歐洲原產常綠之小灌木高約一尺。葉小。呈鱗狀。葉腋生卵形之扁平綠枝。其外觀酷似尋常之葉。花小白色。生於葉狀枝之中央。

為觀賞用。

Allium odorum L.

韭(漢)　百合科

韭。菜名。處處栽之。為蔬類植物。多年生草。高一尺餘。葉細長而扁平。花小色白。集生於莖之頂端。為繖形花序。

莖名韭白。根名韭黃。味美可食。

Tricyrtis hirta *Hook.*



Phormium tenax *Forst.*

此植物為牛塞郎島原產。常綠草。葉長而簇生。畧似溪蓀花赤褐色。排列為繖房花序。

自其葉採取纖維。可為繩織物等料。又供觀賞用。

油點草（漢）　百合科

油點草都山野自生。多年生草。高二尺餘。莖葉皆有毛。葉互生。長卵形而尖。基部抱莖。花生於葉腋。花被淡紫色。具濃紫色之小點。

栽培之為觀賞用。

Aspidistra elatior *Bl.*

Allium nipponicum *Fr. et Sav.*

山蒜（漢）　百合科

山蒜自生於山野多年生草高一二尺地下生鱗狀莖葉細長而尖有平行脈花白色有長莖排列為繖形混珠花可供食用

蜘蛛抱蛋（漢）一葉（漢）葉蘭（日）百合科

一葉者產於暖地常綠之多年生草葉大為長橢圓形兩端尖有平行脈具長葉柄花有暗紫色之花被單生於短花莖頂供觀賞用

Aloe vera L.

蘆薈者栽培於地中海沿岸及熱帶地方常綠植物也葉大而夫為肉質緣邊有銳鋸齒花生於長莖上部呈穗狀其葉分泌汁液色黑有光

葉汁入藥用為瀉下劑及健胃劑

Lilium auratum *Lindl.*

山百合（日）

百合科

山百合自生於山地為多年生草高四五尺葉互生為披針形花大生於莖之上部有白色之花被內面具暗紅色之斑點

栽培之為觀賞用又地下之鱗莖可供食用

Hyacinthus orientalis L.

嘿阿聖篤(拉)　百合科

嘿阿聖篤產於地中海沿岸為多年生草從地下鱗狀莖叢生細長之葉花莖生於葉之中間花青色排列為總狀花序變種甚多有花被為八重者有呈種種色彩者栽培之為觀賞用

Allium Bakeri *Regl.*

薤(漢)　百合科

薤栽培於園圃多年生草亦蔬類植物也高一尺餘葉細長有平行脈花色紫排列為繖形有鱗狀莖如小蒜謂之薤白薤白可供食亦為藥用

Zephyranthes candida *Herb.*

Narcissus Tazetta *L.*
var. chinensis *Roem.*

水仙。日本暖地海邊自生。吾國亦多栽培之。為多年生草。高約一尺。葉叢生而細長。有平行脈。花莖生於葉叢中間。著數花。為繖形花被六。色白。具黃色杯狀之副冠。供觀賞用。地下莖有毒。然可治癰腫。

玉簾（白）　石蒜科

玉簾。栽培於庭園之多年生草。高約一尺。葉細長。叢生。花莖生於葉叢中間。頂著一花。花被白。微帶紫色。供觀賞用。

Lycoris sanguinea *Maxim.*

Narcissus Jonquilla *L.*

長壽花（漢）　石蒜科

長壽花。為歐洲原產之多年生草。高約二尺。葉甚細長。畧為半圓筒形。花二朵或五朵集生於莖之頂端。排列為繖形。花被黃色六裂。香氣甚强。口緣具小杯狀之部分。栽培之為觀賞用。

狐剃刀（日）　石蒜科

狐剃刀。山地自生。多年生草。高一尺餘。葉細長。叢生於地下之鱗狀莖。至夏季則枯死。秋季發生花莖。開花於頂端。排列為繖形。黃赤色。有六裂之花被。雄蕊比花被同長或稍短。

生有毒。然多供觀賞用。

Dioscorea japonica *Thunb.*

薯蕷　自生於山野多年生之蔓草也莖細長卷絡於他物葉為長心臟形而尖有長葉柄花小單性實為裂果有三翅生於葉腋之零餘子及多肉之根可供食用根莖並入藥產於河南之舊懷慶府者尤佳稱懷山藥

Iris sibirica *L.* var. orientalis *Thunb.*

鳶尾科

溪蓀（漢）

溪蓀山野自生之多年生草也高約二三尺葉劍狀而長生於長根狀之莖花莖自葉叢中央抽出著生二三花花多青紫色外圍大形花被基部有網狀之斑紋栽培之供觀賞用

Agave americana *L.*

Lycoris radiata *Herb.*

石蒜科　石蒜（漢）

石蒜者。山野自生。多年生草。高一尺餘。葉細長。有平行脈。葉枯後。花莖乃生。頂端著數花。為纖形花序。六瓣。色紅。雄蕊甚長。突出於花外。有毒。惟地下莖。可取澱粉。供食用。

石蒜科　龍舌蘭（日）

龍舌蘭者。墨西哥原產之大形草。生數年後。始開花。結實則枯死。葉多肉。長而尖。有針狀鋸齒。花莖生於葉腋之中央。著多數之花。

從其葉取纖維。可供織物造紙等用。葉汁可釀酒。又煮音之為觀賞用。

Iris japonica *Thunb.*

Crocus sativus *L.*

蕃紅花（漢）泡夫蘭（日）鳶尾科

蕃紅花者小亞細亞原產之多年生草栽培於諸國高四五寸於地下莖呈球狀與水仙之莖相似由莖部生細長葉葉叢間著青紫色花有香氣

乾其花柱及柱頭稱咱夫蘭為建胃鎮痙通經等藥又為黃色染料可染果子及他食品

蝴蝶花（漢）　鳶尾科

蝴蝶花自生於陰地多年生之長綠草高二尺餘葉呈劍狀有平行脈且光澤花莖分枝著數花花被色白而帶紫色之暈中心色黃上面有毛狀突起緣邊具鋸齒

栽培之為觀賞用

Iris tectorum *Maxim.*

Iris laevigata *Fisch.*

鳶尾（漢）　鳶尾科

鳶尾。栽於庭園之中。為多年生草。高一二尺。葉劍狀。淡綠色。相抱擁而互生。花軸生於葉間。上端通常著三花。花六瓣而大。呈淡紫青色。又有紫色小點。散在花被之上。而上面基本部。又具毛狀突起。

供觀賞用。根莖入藥。為吐劑及下劑用。

燕子花（漢）　鳶尾科

燕子花。自生於池沼濕地。多年生草。有長根狀莖。葉為劍狀。長二三尺。花莖生於葉叢中央。頂端著大形花。花通常為青紫色或白色。有二層花被。外層大而下垂。內層狹小而尖長。且向上。

栽培之為觀賞用。

Musa Basjoo *Sieb.*

芭蕉、栽培於庭園為多年生草高八九尺。莖軟。重皮相裹。外青裡白。葉大。為長橢圓形。中肋之兩側。有平行脈。花不整齊。色淡黃。簇生大形之苞。腋果實為肉質而長。供觀賞用。

Musa sapientum *L.*

甘蕉（漢）　芭蕉科

甘蕉、產於熱帶地。今粵省多植之。高二丈餘。多年生之大形植物也。全形類芭蕉。頂上叢生八至十之大葉。葉之中央抽出大形花叢。開多數淡黃花。果實長四五寸。直徑約一寸。初青後黃。為菜果肉。

果肉芳香而甘。富於營養料。熱帶土人以此為主要食物也。

Iris laevigata *Fisch.*
var. *Kaempferi Sieb.*

花菖蒲（日）　鳶尾科

花菖蒲栽培於庭園多年生草高二三尺葉劍狀有平行脈花六瓣有濃紫淡紫及青白色之斑紋外層三瓣大而下垂內層三瓣形小頭鈍而向上方供觀賞用

Belamcanda punctata *Moench.*

射干（漢）　檜扇（日）　鳶尾科

射干者山野自生多年生草高二三尺葉為廣劍狀而尖有平行脈排列成二行花紅黃色有六片花被上著紫色細點結實成房種子色黑栽培之為觀賞用根可入藥



Alpinia chinensis *Roscoe.*

熊竹蘭都日本原產之多年生草。形狀頗似薑荷。高三四尺。葉長楕圓形。有多數平行脈。在中肋之兩側。花不整齊。色白。有紅斑點及黃暈。排列為圓錐花序。

栽培之為觀賞用。乾之可作繩。

Zingiber officinale *Rosc.*

生薑（漢）薑（中俗）　薑荷科

生薑者。為熱帶亞細亞原產之多年生草。高二三尺。葉為披針形。有平行脈。花有不整齊之瓣。形類於薑荷花。

根狀莖為香味料。或沙糖漬。又供藥用。

Ravenala madagascariensis *Sonn.*

Curcuma longa *L.* var. macrophylla *Miq.*

拉愛那拉（拉）　芭蕉科

拉愛那拉者嗎達蛤斯卡路原產之木本植物。莖高約七尺。葉畧類於芭蕉而長大。排列成二行。觀之如開扇狀。葉鞘內常貯清水。故又有水木及旅人木之名。熱帶地方多栽培之。為觀賞用。嗎達蛤斯卡路土人。以其種子為食物。

鬱金（漢）　蘘荷科

鬱金產於蜀地及西戎。今廣西江西等處亦有之。為多年生草。高二三尺。葉為長橢圓形。類於曇華。畧似蘘荷而大。花黃。有鱗狀之苞。每苞開三四朵。每朵又各有小苞。地下莖可為黃色染料。又供啞而開利之試藥用。古以之浸酒。祭祀用之。謂之鬱鬯。

Cypripedilum niacranthum *Sc.*
var. ventricosum *Rchb. f.*

Canna indica *L.*

曇華。栽培於庭園。為多年生草。高四五尺。葉為長卵形。而尖。有平行脈。約長一尺。花色紅。不整齊而美麗。觀賞用之植物。

敦盛草（白）　蘭科

敦盛草者。深山自生之多年生草也。高約尺許。葉長卵形。互生。花大。淡紅色。有幌狀之片。栽培於庭園。供觀賞用。

Zingiber Mioga *Rosc.*

Elettaria cardamomum *White et Maton.*

小豆蔻（旦）　薑荷科

小豆蔻。產於前印度之海岸。多年生草。高丈許。葉類似於薑荷。花生於莖之上部。其構造似薑荷花。果實稱小豆蔻。為芳香性之健胃劑。

薑荷（漢）茗荷（旦）　薑荷科

薑荷。亦山野自生。多年生草。高二三尺。葉長橢圓形而尖。酷似生薑葉。花序生於地下之莖。由多數花而成。花黃色。不整齊。幼莖及花序。可供食用。

Epipactis erecta Thunb.

Cypripedilum japonicum Thunb.

銀蘭　蘭科

銀蘭者山野自生。多年生草。高通常不越七八寸。葉長卵形或廣披針形。全邊有平行脈。花白色。花被六片。其一片有短距。

熊谷草　布袋草（日）　蘭科

熊谷草。山地自生。多年生草。莖高一尺餘。上部生二大葉。葉畧圓。有多數平行脈。花大。單生於莖之頂端。色紫。有母衣狀之旗瓣。（母衣日本武人用之）栽培之為觀賞用。

Epipactis falcata *Thunb.*

Calanthe discolor *Lindl.*

海老根、蝦根（日）　蘭科

海老根者、山野自生、多年生草、高一二尺、葉大、為長楕圓形、有多數平行脉、花莖生於葉叢中央、著數花、花紫白色、甚美麗、旗瓣三裂、中央之裂片、為淺二裂、觀賞用、

金蘭（日）　蘭科

金蘭者、山野自生、多年生草、高一二尺、葉呈廣披針形、全邊、有平行脉、花雖酷似銀蘭花、而色黃、

Bletilla hyacinthina *Rchb. f.*

Orchis militaris *L.*

沙列布。產於歐洲之多年生草。高三尺。餘。葉為廣披針形。花呈穗狀。有帶紅色而不整齊之花被。多肉之根。稱沙列布根。為藥用。治胃腸加答兒。

白及（漢紫蘭）　蘭科

白及。栽培於庭園。多年生草。高一二尺。葉為廣披針形。闊寸許。有平行脈。花紅紫或白。為不整齊之花被。根可入藥。並可為糊料。

Arethusa japonica *A. Gr.*

Habenaria radiata. *Thunb.*

鷲毛玉鳳花(漢)鷺草(日)　蘭　科

鷺草者生於山野濕地多年生草高約尺許葉細長而夾花色白有長距花被最大具細裂之緣邊

栽培之為觀賞用

澤蘭(漢)　蘭　科

澤蘭都生於山中濕地多年生草每莖生一葉為披針形花莖無枝頂端著一花花呈紫紅色與白及花相似

栽培之為觀賞用並入藥地下莖名地筍可食

Vanilla planifolia *Andrews.*

Cymbidium virens *Lindl.*

春蘭春山野自生常綠之多年生草高七八寸葉細長而尖有平行脈花莖生於葉叢中間頂著一花淡黃綠色為不整齊之花被

栽培之供觀賞用又花入於熱湯中為鹽漬

瓦尼拉（拉）　蘭科

瓦尼拉為自生於墨西哥栽培之於熱帶地為常綠蔓生植物莖呈長卵形肉質而厚花黃綠色有黃斑果實細長約尺許有強香氣

此果稱為瓦尼拉加於果子及阿衣司苔里衣姆或著可來脫則凝聚香氣

Dendrobium moniliforme *Sw.*

Cymbidium ensifolium *Sw.*

建蘭（漢）駿河蘭（日）　蘭科

建蘭產於福建故名多年生之常綠草高二三尺葉細長而尖有平行脈叢生花莖生於葉叢之間上部開不整齊之花色淡黃帶紫香極幽雅栽培之為觀賞用

石斛（漢）　蘭科

石斛者附著於高山之岩石或古樹上多年生草高六七寸莖有明瞭之節畧似木賊而中實每節生一葉為披針形而厚有平行脈花白或淡紅為不整齊之花被生於莖之上部

Piper cubeba *L.*

華澄茄。產於東印度及爪蛙等處。蔓生植物。葉長卵形而尖。甚平滑。實為漿果。大如豌豆。呈黑褐色。

果實半熟時。摘取而乾燥之。可為治淋疾之藥。

Chloranthus brachystachys *Bl.*

草珊瑚（漢）千兩（日）　金粟蘭科

草珊瑚。自生於暖地之常綠灌木。高三四尺。葉對生。卵形。有鋸齒。花小。淡黃綠色。無花被。實為球形之果。紅色或白色。

栽培之為觀賞用。

Houttuynia cordata. *Thunb.*

三白草科

蕺草（漢）十約（日）

蕺草都山野自生。多年生草。高七八寸。莖細長。匍匐於地上及地下。葉卵形。互生。花小。淡綠色。無花被。排列成穗狀花序。花序下有白花瓣狀之苞四片。

莖葉皆有臭氣。亦稱魚腥草。可食並藥用



Piper nigrum *L.*

胡椒科

胡椒（漢）

胡椒。為東印度原產之蔓生植物。長丈餘。葉長心臟形。互生。花小。為長穗果。實球形。初綠色。熟則變為紅色。

乾其果實。皮皺色黑。稱黑胡椒。除去黑皮者。稱白胡椒。味辣而香。研粉供食料

Chloranthus serratus *R. et S.*

及已自生於山野為多年生草高尺餘莖有節葉對生有鋸齒呈橢圓形而尖花缺花被由黃色之短雄蕊及綠色之雌蕊而成花序通常著生為二排列成穗狀

Salix babylonica *L.*

柳（漢）枝垂柳（日）　楊柳科

栽培於庭園及路傍河沿等處為落葉喬木高三四丈枝質弱恆細長而下垂葉披針形有鋸齒花單性排列穗狀花序雌雄異株實熟則絮飛散如雪材可編什器及為薪料又可為觀賞用

Chloranthus japonicus *Sieb.*

Chloranthus inconspicuus *Sie.*

金粟蘭科

金粟蘭(漢)

金粟蘭一名珠蘭。亦稱珍珠蘭。栽於庭園。為常綠植物。莖高二三尺。有節。葉對生。楕圓形而厚。略類茶葉。花小。黃綠色。無花被。排列為穗狀花序。香氣濃郁。觀賞用之植物也。

金粟蘭科

銀線草(漢)眉掃草

銀線草。自生於山野。為多年生草。高七八寸。莖有節。上部輪生四葉。葉為楕圓形而尖。有鋸齒。花小。無花被。由細長白色之雄蕊及綠色之雌蕊而成。排列為穗狀花序。

Juglans Sieboldiana *Maxim.*

山胡桃（漢）

山胡桃多生於山地為落葉喬木通常高二三丈生奇數羽狀複葉而葉有短柔毛花係單性雌雄同株實為核果內含種子一枚

種子供食品又以之榨油及其他之用材可為建築及器具持通於鳥銃等之柄木樹皮又可為染料

Pterocarya rhoifolia *S.et Z.*

胡桃科

澤胡桃（日）

澤胡桃者山地自生之落葉樹也高三四丈葉形大為羽狀複葉花單性雌雄各自為穗而生於同株果實有二翅材可為自來火木幹及日本人之木履等內皮或稱為壽光皮可製器與

Populus balsamifera *L.*
var. suaveolens *Loud.*

楊柳科

泥樹、綿樹（日）

泥樹自生於寒地、為落葉喬木、高數十尺、葉互生、呈卵形或長楕圓形而尖、有鈍鋸齒、花單性、雌雄異株、排列穗狀花序、實係裂果、種子具綿狀白毛、材供自來火木幹及草帽辮、種毛可用為綿絮、

Myrica rubra *S. et Z.*

楊梅科

楊梅（漢）

楊梅產於暖地、為常綠樹、高約二丈、葉互生、為長楕圓形、花小而單性、雌雄異株、結球形之核果、有多數乳頭狀突起、果實供食用、樹皮可為褐色之染料、材則車類細工及薪炭多取給之、

Corylus heterophylla *Fisch.*.

Corylus rostrata *Ait.*
var. Sieboldiana *Maxim.*

角榛。山野間之落葉灌木。高六七尺。葉互生。為卵形。有重鋸齒。花作小形。單性。雌雄同株。實係堅果。位於角狀之殼內。種子可充食用。材可為薪料。

榛（漢）　樺木科

榛多生於山野。為落葉喬木。高二三丈。葉互生。為圓心臟形。而尖。有重鋸齒。春日開花。如長穗形。小性單。雌雄同株。實係堅果。外包葉狀片之殼。非每包一實。味略似胡桃。種子供食用。

Carpinus japonica *Bl.*

卡阿皮奴司加跑尼卡（拉）　樺木科

此物產生於山地為落葉喬木高數十尺葉互生作長卵形而尖有鋸齒花單性排列為穗狀花序雌雄同株果實小而堅外有鱗片狀之小苞

材為薪炭及器具之用

Betula alba *L.* var. vulgaris *DC.*

白樺（日）　樺木科

白樺為落葉喬木產遼東及西北諸地嫩江混同江間尤多高三四丈皮白易剝脫葉作卵形而末端甚尖柄長且互生花單性雌雄同株為穗狀花序

材可為器具樹皮為染料又可以裹弓

Quercus variabilis Bl.

Quercus acuta Thunb.

血櫧山地自生之常綠樹高約四丈葉橢圓形而尖全邊者多幼葉有褐色之毛生長充足者平滑花單性雌雄同株實為橢圓形之乾果基部有椀狀之殼斗其材堅牢可為車下馱之蓋及船具農具等用又供薪炭之料

考盧苦櫟（拉）　殼斗科

考盧苦櫟者山地自生之落葉樹高約六丈樹皮有厚木栓層葉雖似櫟而裡面密生灰白色之毛花及果實類於櫟取其樹皮之木栓層供瓶類之栓及他用材為薪炭料

Alnus firma S. et Z.

Alnus japonica S. et Z.

赤楊（漢）　樺木科

赤楊生於山野為落葉喬木高數十尺葉互生卵形而尖有鋸齒花小形單性排列成穗狀雌雄同株果實似松毬狀材為建築器具之料又供薪炭用果實樹皮皆可為染料

阿魯奴司肥魯麻（拉）　樺木科

此物生於山野為落葉喬木高達丈餘葉互生卵形而尖有鋸齒花小形單性雌雄同株實像乾果為橢圓形外形畧似松毬材為造車細工及薪炭之料果實供染料可為五倍子之代用品

Quercus dentata *Thunb.*



Quercus serrata *Thunb.*

樹者多生於山野。為落葉樹。高及二三丈。葉大而長。為倒卵形。有波狀鋸齒。以短葉柄而互生。花單性。雌雄同株。實為堅果。有椀狀之殼斗。

材供薪炭用。樹皮充染料及鞣皮料。種子可作糊。味雖劣。而歲荒人亦食之。

櫟（漢）　殼斗科

櫟生於山野。北方產者尤多。為落葉樹。高二三丈。葉披針形。有鋸齒。類似於栗。花黃褐色。單性。雌雄同株。實為堅果。圓而端尖。有殼斗如椀。謂之橡實。

材料理最適用於薪炭。樹皮及殼斗可為染料。而樹皮又為鞣皮之用。附皮之材可培植香蕈。種子可食。葉可飼野蠶。

Fagus japonica *Maxim.*

山毛欅（漢）　殼斗科

山毛欅者山野自生之落葉樹高七八丈樹皮平滑淡灰色葉為長卵形而尖背有長毛花小單性淡綠色雌雄同株實為堅果半被包於殼斗殼斗下之柄比櫟畧長材可為農具家具及他器具之料又可為薪炭

Quercus phyllireoides *A.Gr.*

柞芽櫧（日）　殼斗科

柞芽櫧自生於暖地為常綠樹高約五丈葉倒卵形或稍圓形長一寸三四分緣邊上部有鋸齒花小單形雌雄同株實為堅果有椀狀之殼斗材可為木版艦艤等之料又可燒為木炭此炭

Pasania cuspidata *Oerst.*

柯樹多生於暖地。為落葉喬木。高三四丈。葉為長橢圓形而厚。背面灰褐色。花單性。雌雄同株。實為橢圓形之堅果。殼斗如囊狀。熟則裂開實出。

材可建屋製器及為薪炭。樹皮為染料。種子可食。又栽培之為觀賞用。

Quercus glauca *Thunb.*

殼斗科

櫧(漢)白櫧(日)

櫧產於暖地。為常綠喬木。高二三丈。樹皮色白。葉為廣披針形。或長橢圓形而尖。有鋸齒。面青背白。花單性。黃褐色。排列成穗狀花序。雌雄同株。實為堅果。有椀狀之殼斗。如菩提子大。

材堅實。可為器具。又栽培之為觀賞用。子可食。

Castanea vulgaris *Lam.* var. japonica *DC.*

Quercus glandulifera *Bl.*

栗（漢）　殼斗科

栗自生於山地。為落葉喬木。高四五丈。葉披針形。有鋸齒。互生。酷似於櫟。花小。單性。雄花排列為長穗狀花序。雌花每三個集生。外包殼斗。實為堅果。位於囊狀殼斗之內。殼斗外面有刺如蝟毛。熟則裂開。

仁淡黃色可食。材可製器及建築薪炭。葉可飼野蠶。樹皮為染料及鞣皮用。

柂（漢）櫧（日）　殼斗科

柂者。自生於山野。為落葉樹。高二三丈。葉為倒卵形而尖。有鋸齒。背面白色。有軟毛甚密。花單性。雌雄同株。雄花黃白色。排列為長穗狀花序。雌花具杯狀之總苞。實為堅果。有杯狀之殼斗。

材供薪炭及器具之料。樹皮為染料。種子供食用。

Ulmus parvifolia *Jacq.*



Ulmus montana *Sm.*
var. typica *Maxim.*

榔榆者。山野自生之落葉樹也。高約三丈。葉稍圓形。有鋸齒。長一寸二三分。花開於秋季。形小而色淡綠。果實倫圓。周圍有翅。材可為車軸。其皮堅靭。剝之長數尺。古以為絙索。

厚子。阿足示。(日)　榆科

厚子者。產於北部之落葉樹也。高達丈餘。葉為倒卵形。有不整齊之鋸齒。花小。色黃綠。

日本北海道土人。用此植物之內皮纖維。為造織物。又其材可供器具及薪炭之料。

Fagus sylvatica *L.*
var. Sieboldi *Maxim.*

Quercus sutor *L.*

櫟（漢）　殼斗科

櫟自生於山地。落葉喬木。高數丈。葉互生。卵形。有少數之毛。花小。單性。雌雄同株。實為堅果。位於有刺毛之殼斗內。熟則綻裂。現出果實。

材堅緻。有脂而香。古人破為臼。或供薪炭之料。子可食。或榨油為燃燈之用。

木栓樹（日）　殼斗科

木栓樹或作木塞櫟。地中海沿岸自生之常綠樹也。高二丈餘。葉長稍圓形而厚。緣邊有齒牙。背具軟毛。花單性。雌雄同株。雄花排列為長穗狀花序。雌花具杯狀之總苞。實為堅果。有杯狀之殼斗。

Ficus Wightiana Wall.



Ulmus campestris sm.

榆為各地自生之落葉喬木。高八九丈。葉互生。橢圓形。有鋸齒。長約二寸。花後始出。花小球形。以多數鱗片狀葉保護之。一端呈紅褐色。實為翅果。如小扇狀。舊稱榆莢。以其形扁圓。垂垂成串。又謂之榆錢。

材堅。褐色。可製器具及車軸。并為薪炭之料。嫩葉及榆錢。可供食用。

桑科

榕樹（漢）

榕樹。產於閩廣熱地。為常綠喬木。高四五丈。葉橢圓形。平滑。柄長。花淡紅色。果實構造類無花果。為球形而小。其樹因幹生枝。枝復生根。下垂至地。又復為幹。故其蔭極廣。

材為挽物細工。及他器具之料。

Celtis sinensis *Pers.*

朴樹（漢稷曰）　榆科

朴樹自生於山野。為落葉喬木。高五六丈。葉橢圓形而尖。緣邊上部有鋸齒。花黃而小。單性。亦有兩性者。實為小球形之肉果。黃赤色。

材供器具及薪炭用。果實味甘可食。庭園多栽植之。

Zelkowa acuminata *Pl.*

櫸（漢）　榆科

櫸者生於山野之落葉喬木。高數丈。葉互生。為廣披針形或長卵形而尖。有鋸齒。花小。單性。有淡黃綠色之花。被雌雄同株。

材質固。木理美麗。可作箱匳几案之用。價值貴重。

Broussonetia Kasinoki *Sieb.*

Ficus erecta *Thunb.*

天仙果。自生於暖地。為落葉灌木。高丈餘。葉橢圓形。互生。花單性。隱於圓形之總花托內。實球形。纍纍如櫻桃。構造等於無花果。秋熟。味至甘。

樹皮纖維。為製紙原料。實可供食。又栽培之可為觀賞用。

桑科

楮（漢）

楮。自生於山野。為落葉亞喬木。高丈餘。葉酷似於桑。而粗糙。花單性。雌雄異株。雌雄花雖同類於構。而以其形小。可區別之。

樹皮有斑紋。為製紙原料。實如楊梅。密漬可食。亦可入藥。

Ficus carica *L.*

Cannabis sativa *L.*

大麻（漢）　桑　科

大麻。多栽於園圃。一年生草。高八九尺。葉為掌狀複葉。由五小葉或七小葉而成。花單性。雌雄異株。雄花色淡綠。多花粉。雌花甚小。色綠。皮部纖維柔韌。可織夏布。及綢織物等之料用。其粗硬不潔白者。喪服用之。莖去皮則可供種種之料。實可榨取香料及油。又產生於印度者。可作麻醉及鎮痙藥。

無花果（漢）　桑　科

無花果。出揚州及雲南。今吳楚閩越人家處處栽之。為落葉樹。高丈餘。葉大而粗糙。三裂或五裂。花單性。隱於倒卵形囊狀之總花托內。實為倒卵形之肉果。其外圍為總花托之發育物。內部為多數花之發育物。生青熟紫。味如柿而無核。實具消化蛋白質之成分。食之可助消化作用。葉為治痔聖藥。

Hnmulus japonicus *S.et Z.*

Morus alba *L.*

葎草自生於山野為多年生之蔓草以莖纏繞於他物。莖及葉柄俱有刺向下。葉分裂為掌狀。多細齒。以長葉柄而互生。花單性。無花冠。雌雄異株。雄花為圓錐形花序。有黃綠色之萼片。及雄蕊各五。雌花每數箇集生。實似松毬。

果實入藥。為健胃劑。

桑（漢）　桑科

桑有魯桑湖桑之別。為落葉喬木。以每歲刈取。故枝幹低亞。葉卵形。有鋸齒。或分裂呈種種之形。花小。單性。有淡黃綠色之萼。列為穗狀花序。雌雄異株。實為長橢圓形。畧似懸鉤子類之果。此樹變種甚多。

葉飼蠶。材可製器。肉皮為紙及絲料。實謂之葚。熟則紫黑。味美可食。或為釀酒用。

Broussonetia papyrifera *Vent.*

Ficus retusa *L.* var. nitida *Miq.*

構（漢）穀樹（中俗）　桑科

構即俗所稱之穀樹。山野自生。為落葉亞喬木。高二三丈。幼莖密生剛毛。葉卵形。五裂或三裂。有毛而粗糙。葉身畧作楯狀。著於葉柄。花單性。雌雄異株。雄花列為穗狀。如桑。雌花作球形。實熟色紅。樹皮灰白色。為製紙原料。

鴿祖麻路（琉球語）　桑科

鴿祖麻路。生於琉球及他暖地。為常綠樹。葉楕圓形。平滑而厚。有光澤。花類無花果。生於囊狀球形之總花托內。但無花柄。栽培之為觀賞用。材可為器具之料。



Galactodendron utile *H. B.*

Ficus elastica *L.*

東印度原產之常綠樹。高二丈餘。葉互生。長橢圓形。全邊。質厚有光澤。花小。單性。隱於囊狀之總花托內。與無花果相似。實亦類於無花果。為長卵形。綠黃色。長四五分。傷其幹。採白色乳狀液。可製彈性護謨。

乳樹（曰）

乳樹。為南亞美利加原產之常綠樹。高約五丈。葉互生。為廣披針形。有全邊。花單性或兩性。實為球形之果。而畧帶肉質性。傷其莖。取流出之乳樣濃液。可供食用。

桑科

Fatoua pilosa *Gaud.*
var. subcordata *Rupr.*

Humulus Lupulus *L.*
var. cordifolius *Maxim.*

唐花草(日)　桑科

唐花草。自生於日本山地。多年生之蔓草也。莖及葉柄俱有刺。葉為心臟形。端尖。有鋸齒。多三裂。花單性。似葎草之花。實雖類於葎草。而其形較大。果實為忽布之代用。製麥酒。則宜附以苦味及香氣。又為健胃劑。

桑草(日)　桑科

桑草。自生於原野之雜草。高一二尺。葉卵形。端尖。有長柄。形狀酷似於桑。花單性。甚細小。有綠黃色之萼。雌雄同株。

Humulus Lupulus *L.*

Ficus religiosa *L.*

菩提樹多產於粵東常綠亞喬木高二丈餘葉卵形端甚尖長具有長柄花隱於托中實似天仙果而實堅不朽。

西域記云昔佛坐其下成等正覺因謂之菩提樹。今奉此樹如神聖寺院中多栽培之瓊山縣人稱其實為金剛子可作念珠又乳狀液可製彈性護謨與列入田麻科者名同實異。

忽布（日）　桑科

忽布者產於歐美及亞洲西部之蔓草長約一丈五尺葉卵形有不分裂者亦有三裂或五裂者花單性雌雄異株實之外觀畧似於松類之球果。

實有苦味質及揮發油用於麥酒故附有苦味與芳香又可用為健胃劑。

Artocarpus integrifolia *Forst.*

波羅蜜樹　曩伽結樹（漢）　桑　科

波羅蜜樹。產於嶺南及東印度等處。為常綠喬木。高約三丈。葉倒卵形。不分裂。花小。多數集生成長橢圓形。果實亦橢圓而長大。如冬瓜。肉層疊似橘瓣。其果酷似麵包樹。而味劣。然東印度及附近土人多食之。又以其黃色之心材。染僧侶法衣。

Artocarpus incisa *Forst.*

麵包樹（日）　桑　科

麵包樹。栽培於熱帶地。為常綠喬木。高二三丈。葉大。分裂成羽狀。雌花集生為球形。雄花集生為長花叢。果實徑六七寸。有白色麵包質之肉。燒而食之。味亦略似麵包。熱帶土人以此為重要食物。材可建屋。樹皮纖維。為被服原料。樹液富於粘質。可作膠糊之用。

Urtica Thunbergiana *Sieb Z.*

蕁麻科

蕁麻都山野間之多年生草也高二三尺莖葉俱有刺葉呈卵形而尖由長葉柄而對生花小形為單性色白雌雄同株由莖之表皮採取纖維供絲織物等之用

Nanocnide japonica *Bl.*

菱葉垣通菱葉積雪草（日）蕁麻科

菱葉垣通都自生於山野之雜草有方莖高一尺餘葉酷似垣通之葉而其基部為楔形且以其為互生而異之花小而無花冠

Ulmus montana, Sm. Var. typica, Maxim

山榆（漢）　蕁麻科

山榆。自生於北地之山中。為落葉喬木。高丈餘。葉倒卵形。或楕圓形。緣邊有不整齊之鋸齒。葉端通常三尖。葉柄甚短。花細小簇生。淡黃綠色。果實小而扁平。幹皮柔靭。可用以織布。

Boehmeria japonica *Miq.* var. tricuspis *Hee*

赤苧（日）　蕁麻科

赤苧者。山野自生之多年生草也。高二三尺。莖及葉柄色赤。葉為卵形。有不整齊之鋸齒。尖端呈龜尾狀。花單性。雌雄同株。以其莖之皮部製纖維。效用畧同於麻絲。

Buckleya Quadriala *B. et H.*

羽子和自生於山地為半寄生之灌木高五六尺葉為長卵形而淡綠色花單性色與葉同雌雄異株果實為羽子狀（鍵子）其實供食用

Santalum album *L.*

檀香科

檀香、白檀（漢）

檀香都祥檀之一種產於東印度及馬來隅丰島廣東雲南等處亦俱有之為常綠樹葉對生呈長卵形花無瓣而具四裂之萼實為核果

其木有強香氣為薰物之料或供藥用或製為扇柄小匣等物

Boehmeria nivea *Bl.*

Thesium chinense *Turcz.*

蕁麻科

苧麻（漢）

苧麻者山野自生。多年生草。莖稍具木質性。高三四尺。葉卵形而尖。有鋸齒。裡面密生白毛。由長葉柄而互生。花單性無花冠。雌雄同株。栽養之。由莖皮部取纖維。為絲織物等之料。歐洲稱此物為支那草。於南洋稱之為 Ramie.

檀香科

卡尼叱克草（日）

卡尼叱克草多生於原野。為半寄生植物。附著於他生活植物之根。莖細高約一尺。餘葉細長而尖。互生。其花生於葉腋。為小形。無花冠。萼為綠白色而四裂。

Aristolochia Kaempferi Willd.

大葉馬兜鈴　馬兜鈴科

大葉馬兜鈴者自生於山地多年生之纏繞植物莖之下部為木質葉畧似薯蕷葉花類於馬兜鈴之花以帶黃色及大形而區別之。

其地下部之乾者效用與馬兜鈴同。

Asarum Blumei *Duch.*

杜衡（漢）　馬兜鈴科

杜衡常生山中陰地為多年生草有根狀莖葉為心臟形葉脚凹隘頗深有長柄花色暗紫具三裂之筒狀花被。

栽培之為觀賞用又根莖可入藥用於芳香劑。

Viscum album *L.*

惟衣斯苦母阿魯巴母(拉)槲寄生科

此物寄生於朴樹及他樹木為常綠植物莖為木質性幼部呈綠色葉長楕圓形而對生花單性雌雄異株實帶白色球形之漿果也

為有害宿主植物



Aristolochia debilis *Sol Z.*

馬兜鈴(漢)　馬兜鈴科

馬兜鈴都山野自生多年生之蔓草也葉畧似薯蕷葉而厚大端鈍花單性生於葉腋有不整齊筒狀之紫綠色萼

乾地下部為清血藥及通經藥然內用過多則消化器及泌尿器受强刺激往

Polygonum cuspidatum S. et Z.

Polygonum perfoliatum L.

杠板歸　自生於山野之蔓草也莖及葉柄生剛刺葉身稍呈三角形為楯狀而著於葉柄鞘狀托葉之緣部為葉狀花形小帶白色有八枚之雄蕊果實為小球形其堅如石

虎杖（漢）　蓼科

虎杖者自生於山野為多年生草高一二尺至四五尺葉為卵形而尖草身之基部往往成截形花序生於葉腋著多數之白色小花果實帶白色

幼莖供食用稍帶酸味虎杖之一種生淡紅色花及帶紅色之果實者稱明月草

Asarum caulescens *Maxim.*

雙葉細辛（漢）二葉葵（日）　馬兜鈴科

雙葉細辛都自生於山地多年生草也莖匍匐於地上每節生直立之短枝枝頂通常有二葉故有二葉葵之名葉全邊為心臟形花梗生於短枝頂著紫紅色之花鐘狀向下花柱結合為柱狀萼內面平滑

Polygonum tinctorium *Lour.*

藍（漢）　蓼　科

藍為我國原產之一年生草栽培者多莖高二三尺葉呈橢圓形及廣卵形或狹卵形等而互生筒狀之托葉包莖花小形成穗有帶紅色之萼

葉可供染料即靛青也

Polygonum orientale *L.*
var. pilosum *Meisn.*



Polygonum nodosum *Pers.*

大馬蓼。為山野自生之雜草。高三四尺。葉呈披針形而互生。托葉變形為鞘狀。緣邊無毛。花形小。密生多數成穗狀。萼白色或帶紅色而四裂。

紅草（漢）紅蓼（本俗）　蓼　科

紅草。或曰紅蓼。東印度原產之一年生草。高五六尺。莖葉密生淡紅色之毛。葉大而尖。呈卵形。具長柄。秋日開紅花。成穗狀。栽培之為觀賞用。煎其乾莖葉。亦可以治疝氣。

Zanthoxylum schinifolium *Sie Z.*

馬蓼(漢)　蓼　科

馬蓼都自生於原野。為一年生之雜草。高一二尺。葉為長楕圓形而尖。鞘狀托葉之緣部有長剛毛。初夏開花。為淡紅色。密生於花軸之上部。成穗狀。

Polygonum Bistorta *L.*

拳參(漢)　蓼　科

拳參。乃山地自生。多年生草。高一二尺。葉為廣披針形。下部之葉有長葉柄。花形小。淡紅白色。多數集生為穗狀。

根莖可為收斂藥。幼葉及莖供食用。又栽培之為觀賞用。

Rumex acetosa *L.*

酸模　酸模者自生於山野多年生草高達二尺餘莖葉帶赤色有酸味葉為長卵形而尖基部稍為箭形花形小淡綠色而畧帶赤幼莖葉可供食用

Fagopyrum esculentum *Moench.*

蕎麥　蕎麥者為中央亞細亞及東印度原產之一年生草我國北方產生尤多高二三尺葉互生為三角狀之心臟形有長柄花小而白排列成圓錐花序實為三稜形乾果其子可磨麵作餅北人以之供常食幼時莖葉亦供食用

蓼科

Rumex japonicus *Meisn.*

羊蹄(漢)雞脚大黃　蓼科

羊蹄都產於山野濕地。為越年生之雜草。高三四尺。葉互生。為長楕圓形或廣披針形。托葉成鞘狀。花小淡綠色。叢生於長花軸。內實花被之成長者。包小形之堅果。其下面中央生粒狀突起。根搗汁。可治疥癬腫毒等症。

Polygonum japonicum *Meisn.*

蠶繭草(漢)　蓼科

蠶繭草都自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉互生。為長披針形。有鞘狀之托葉。花色白或帶紅色。稍為穗狀。其花為蓼類中之最大而美麗者。

Polygonum virginianum L.

金線草者山野自生之多年生草高二尺餘葉呈大橢圓形或卵形而互生具鞘狀托葉花小形淡紅色或白色排列為長穗狀花序

栽培之為觀賞用

Chenopodium album L.

藜(漢)灰菜(俗)　藜科

藜者平地自生之一年生草也高達五六尺葉心色亦呈卵形有缺刻及鋸齒葉面具粉狀之小體花形小黃綠色

葉嫩時可供食用莖老可作杖古讀書燃藜又以其光最明可傳火徹夜

Rheum officinale *Baill.*

大黃（漢）　蓼　科

大黃為我國原產之多年生草高四五尺葉互生為大形淺裂呈掌狀有長柄花淡黃色而形小排列成大形之花序根入藥為瀉洩及健胃之劑以四川所產紫地錦紋者為最良每歲輸出歐洲各國頗多

Polygonum Thunbergii *S. et Z.*

溝蕎麥（日）　蓼　科

溝蕎麥自生於淺水或濕地為雜草高達二三尺葉互生為戟形有鞘狀之托葉花白色通常帶紅色簇生數個

Beta vulgaris L.

Spinacea oleracea *Mill.*

恭菜一名若達為歐洲南部原產之越年生草我國園圃多栽植之高三尺餘葉互生厚而有光為長卵形色青白花小黃綠色排列成穗狀花序葉可為蔬供食用

菠薐菜（漢）　藜科

菠薐菜亦曰菠菜多栽培而生為一年生草或越年生草原係西域頗陵國產唐時其種始入中國高約二尺葉互生為三角狀之卵形而尖基部又旁出兩尖花小而黃綠色單性也雌雄異株根色赤味甜葉供食用嫩時以之為常蔬

Beta vulgaris L.
var. Rapa Dumt.

Salsola Soda L.

撒而索拉曹達(拉)　藜科

撒而索拉曹達者乃自生於海邊之一年生草高達一尺餘葉細長為肉質而夾互生花小形有淡黃綠色之萼幼莖及葉可供食用昔時以其灰製曹達

砂糖大根(日)　藜科

砂糖大根者俗謂之糖蘿蔔地中海沿岸原產之越年生草高二三尺葉為卵形而平滑花形小黃綠色集生於穗狀花序有地下莖如蘿蔔為肉質之紡錘形根具甜液可製砂糖

Celosia cristata *L.*

Achyranthes bidentata *Bl.* var. japonica *Miq.*

牛膝都自生於原野為多年生雜草高達三四尺莖方形而有膨大之節葉長卵形或楕圓形全邊而光對生如花綠色形小生於莖之上部為穗狀花序實有小刺常黏著人衣

根入藥為收斂及利尿用之劑

雞冠（漢）　莧科

雞冠都東印度原產之一年生草今隨處生之高二三尺莖赤葉互生為廣披針形花小有紅黃白數種花序如雞冠狀故名子黑細光滑

栽培之為觀賞用又幼葉可供食用

Kochia scoparia *Schrad.*

地膚（漢）帚木（日）掃帚（中俗）藜　科

地膚者栽培於園圃為一年生草高四五尺葉互生為狹披針形或線形而尖花小帶綠色生於葉腋子甚繁嫩苗及幼果實可供食用果入藥稱地膚子又乾其莖枝可作帚

Amaranthus Blitum *L.*

莧　科

犬莧（日）

犬莧者自生於田園之一年生草高約一尺葉為卵形而互生葉端往往成凹形花綠色單性形甚小雌雄同株幼葉可供食用

Mirabilis Jalapa L.

紫茉莉都西印度原產之多年生草莖高二三尺有節葉卵形或心臟形而尖全邊有網狀脈以長葉柄而對生花為漏斗狀有五個白色紅色或黃色等之美麗萼無花冠種子有白粉狀之胚乳

栽培之為觀賞用

Phytolacca acinosa *Roxb.*
var. esculenta *Maxim.*

商陸科

商陸(漢)山牛蒡(日)

商陸都自生於山野為多年生草莖高四五尺葉互生如卵形而大花小而色白夏月始開排列成總狀花序實為赤黑色之肉果

葉嫩時可食根可作藥性有毒

Amarantus gangeticus *L.*

Gomphrena globosa *L.*

千日紅(漢)千日草(日)　莧　科

千日紅者為東印度原產之一年生草高一二尺莖似海棠葉對生為長橢圓形秋初開花色紅紫或白排列為球形之頭狀花序頗美麗經久不凋故有此名栽培之為觀賞用

雁來紅(漢)葉雞頭(日)　莧　科

雁來紅俗名老少年一年生之草本植物庭園多栽植之高二尺餘葉為長橢圓形兩端尖以長葉柄而互生生長亢足呈美色類於雞冠有黃紅等色之斑並有全紅全紫者花小單性集生於葉腋

Portulaca grandiflora *Hook.*

松葉牡丹。為南亞美利加原產之一年生草。高四五寸。莖葉俱為肉質。葉互生。呈線形而厚。其基部有毛。花有紫紅黃白色等之瓣。甚美麗。

栽培之為觀賞用。

Dianthus barbatus *L.*

亞美利加瞿麥(日)　石竹科

亞美利加瞿麥。原產於歐洲之多年生草也。多栽培於北美。日本之庭園。亦栽植之。葉為廣披針形。而對生。花酷似石竹。而形小。多數集生。花冠有淡紅深紅或白色數種。

觀賞用之植物也。



Tetragonia expansa *Ait.*

Portulaca oleracea *L.*

蕃杏科

蕃杏(漢)

蕃杏者自生於海濱又栽培於園圃草本莖蔓延於地上葉互生為三角狀之卵形花小而色黃生於葉腋葉及幼莖可供食用

馬齒莧科

馬齒莧(漢)漿板草(俗)　馬齒莧科

馬齒莧自生於園圃為多汁肉質之一年生草莖帶赤色平卧於地上葉為倒卵形具質厚而柔軟花形小有黃色之五花瓣莖葉嫩時可煮曝為蔬

Dianthus chinensis L.

石竹　石竹科

石竹產於我國之多年生草高一二尺葉細長而尖對生花有深紅淡紅白色單瓣重瓣等數種形狀與瞿麥花相似惟花瓣上部有淺分裂而異之又花下之苞比瞿麥更長而尖

栽培之為觀賞用

Lychnis coronata Thunb.

剪夏羅（漢）　石竹科

剪夏羅栽培於庭園為多年生草高二三尺葉卵形或廣披針形而對生花生於莖之頂端及葉腋形大而美麗花瓣五色黃赤或白緣邊有鋸齒

栽培之為觀賞用

Stellaria aquatica *Scop.*

牛繁縷（曰）　石竹科

牛繁縷自生於山野。為雜草。莖高一二尺。葉卵形。下部有葉柄。上部則無。花形小。而有白色之五花瓣及五花柱。效用畧同於繁縷。

Dianthus superbus *L.*

瞿麥（漢）　石竹科

瞿麥。亦作蘧麥。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉細長而尖。對生。花通常每二朵集生。萼筒狀。下苞如鱗片。花瓣五。色淡紅或白。上部深裂為絲狀。栽培之為觀賞用。穗及葉可作藥。

Stellaria media *Vill.*

Sagina Linnaei *Presl.*
var. maxima *Maxim.*

漆姑草　山野自生之雜草莖高二三寸有節葉對生為狹披針形花小而白每朵有楕圓形之五花瓣具長花梗

繁縷鷰腸（漢）　石竹科

繁縷都山野自生之一年生草或越年生草蔓延於地上莖細長有向下之毛列於節間葉呈卵形而對生花為小形白色有深二裂之五花瓣具三花柱

此植物為有名之春草莖葉為小鳥之飼料

Vaccaria vulgaris *Host.*

Saponaria officinalis *L.*

石鹼草（日）　石竹科

石鹼草者歐洲原產之多年生草高約二尺葉卵形或披針形有三或五條之大脈花瓣有淡紅或白色之爪形狀畧似蟲捕撫子之花

栽培之為觀賞用浸出其莖及葉之汁液類似石鹼水故有此名

王不留行（漢道灌草（日）　石竹科

王不留行者歐洲原產之一年生草或越年生草高一二尺葉對生為披針形淡綠色花瓣五淡紅色萼具五稜排列為聚繖花序結實如豆大內包細子如菘

栽培之為觀賞用苗子可入藥

Nuphar japonicum DC.



Euriale ferox *Salisb.*

芡實為水草亦果類植物也花莖及葉有刺葉大而圓浮於水面面青背紫莖伸出於水上頂端開花結實如栗毬種子及根可供食用

睡蓮科

萍蓮草（漢）

萍蓮草自生於池沼河流等處為多年生草葉分二種生於水中者形大而薄伸出於水上者為箭形而厚花莖挺生水上頂著一花黃色栽培之為觀賞用

Silene Armeria L.

蟲捕撫子（曰）　石竹科

蟲捕撫子。歐洲原產之一年生草。高二三尺。莖有節。節下分泌粘液。防止小蟲昇於花部。葉對生。為長卵形。淡綠色。而平滑。花小而有紅紫或白色之瓣。排列成聚繖花序。

栽培之為觀賞用



Victoria regia *Lindl*

大鬼蓮（曰）　睡蓮科

大鬼蓮。都產於南美阿瑪曾河。為水草。全部有刺。畧類於芡實。葉圓形。直徑達二尺以上。緣邊向上方圈曲。畧作盆狀而浮於水面。花酷似芡實之花。

此植物以形態之珍奇。各地植物園多



Nymphaea tetragona *Georg.* var. angustata *Casp.*

睡蓮都生於水中為多年生草葉貼水面為楕圓狀之心臟形花白色具多數之瓣開於午後二時即未時之頃故有未草之名

栽培之為觀賞用

Ceratophyllum demersum *L.*

金魚藻科

金魚藻（日）

金魚藻產於淡水中為多年生草有輪生葉葉分裂為二或三之叉狀其裂片細長而尖有小鋸齒花小單性生於葉腋

飼養金魚之器中多安置此草



Nelumbo nucifera *Gaertn.*

Brasenia purpurea *Casp.*

睡蓮科

蓴（漢）

蓴生於池沼。為多年生草。江浙湖澤中恒產生之。幼時莖葉皆有粘液被之。葉為楯圓形。楯狀。有長柄。花生於葉腕。紫紅色。幼葉可為羹。味甚美。

睡蓮科

蓮（漢）荷花（中俗）

蓮都熱帶亞細亞原產之。多年生草。生淺水中。地下莖肥大而長。有節。差多數縱行管狀之空隙。葉圓下面中央著長柄。花大而美麗。有紅白二色。果實分房排列於倒圓錐形之大花托內。



Anemone nikoensis *Maxim.*

Thalictrum minus *L.* var. elatum *Lecoy.*

毛茛科

此植物山野自生之多年生草也葉為複葉由多數小葉而成八九月時開花有小形之萼片多數之黃綠色長雄蕊及數个之無柄子房

栽培之為觀賞植物

毛茛科

一輪草（日）

一輪草者山野自生之多年生草也高六七寸莖間輪生細裂之三葉由中央部挺出花梗著生一花花色白而畧帶紅其上有五花被

栽培之供觀賞用

Trochodendron aralioides *S. et Z.*

Cercidiphyllum japonicum *S.et Z.*

開阿塞敵肥路姆加波尼苦姆(拉)　雲葉科

此植物自生於山地。為落葉之喬木。高四丈餘。分雌株及雄株。葉為心臟形或楕圓形。有鈍鋸齒。花開於出葉之先。形小而色紅。果裂即散為種子。

木淡褐色而柔軟。易施工作。故建築及器具多取用之。

山車(日)　雲葉科

山車者自生於山地。為常綠樹。高十尺餘。葉楕圓而尖。有鋸齒。具長柄。花小而帶綠色。排列成總狀花序。結實為乾果。

樹皮製鳥黐及彈性護謨。

Ranunculus pensylvanicus *L. f.* var japonicus *Maxim.*

Clematis patens *Morr. et Done.*

轉子蓮　都栽植於庭園多年生之蔓生植物莖之下部為木質葉對生為複葉由三小葉而成其柄能卷絡他物花大而美麗有六个以上長楕圓形青或白之萼有毒僅足供觀賞用

回回蒜（漢）　毛茛科

回回蒜生於水邊及道旁濕地為有毛之越年生草高二三尺葉為複葉由三小葉而成春開黃花五瓣至秋始謝花瓣內根部有小鱗片實為多數小乾果有毒植物其汁液苛烈有強刺激性

Caltha palustris *L.*var. sibirica *Rgl.*

猿猴草(日)　毛茛科

猿猴草自生於山中之濕地多年生草也葉呈短心臟形有長柄簇生數枚花軸多伏卧於地上端生二三朵花花黃色栽培之為觀賞用

Anemone cernua *Thunb.*

白頭翁(漢)　毛茛科

白頭翁者山野自生多年生草全部密生白毛高約尺許葉為羽狀複葉簇生於地下莖由其中部伸出花莖頂上著花內面呈紫黑色之美麗萼片有刺激性毒分用之過量則致死用之



Trollius patulus *Salisb.*

產於山地。為多年生草。高二三尺。葉深裂為五。呈掌狀而厚。且有光澤。緣邊有細齒。秋花單生於莖及枝之頂端。色黃。有五乃至七之萼片。花瓣數多。細長而小。短於雄蕊。

栽培之為觀賞用。

Clematis hencleifolia *DC.*

毛茛科

草牡丹（日）

草牡丹。春。山地自生。多年生草。高二三尺。葉為複葉。成於三小葉對生。花具青長萼。萼片上部向外反卷。雌蕊數多而密生毛。實為長鞭狀嘴之小乾果。果熟則毛易為風吹散。

有毒植物。

Thalictrum aquilegifolium *L.*

唐松草（日）　毛茛科

唐松草自生於山野為多年生草高四五尺葉為複葉由多數之小葉而成花白色有多數雄蕊為頂平花序實為乾果有柄及三稜

有毒性栽培之供觀賞用

Ranunculus acer *L.*
var. japonicus *Maxim.*

毛茛（漢）　毛茛科

毛茛者自生於山野低濕之地為有毛之多年生草高二三尺葉為單葉分裂成掌狀春暮開花黃色五瓣甚光艷實由多數小乾果而成

為有毒植物有苛烈刺激性之汁液

Cimicifuga foetida *L.* var. simplex *Huth.*

Paeonia albiflora *Pall.*

芍藥（拉）　毛茛科

芍藥都栽培於庭園為多年生草高三四尺葉為複葉小葉往往有極深三裂初夏開花大而美麗有紅白紫數種之色根亦有赤白二色

觀賞及藥用治腹痛腰痛等症有效

克米克夫吳格肥題達塞木波來苦司（拉）　毛茛科

此物自生於山地為多年生草高三四尺葉為重複葉而小葉有鋸齒花白色有多數雌蕊排列為總狀花序

有毒之植物也只可栽培之為觀賞用

Anemone japonica *S.et Z.*

Coptis quinquefolia *Miq.*

五加葉黃蓮。梅花黃蓮（日）毛茛科

此植物自生於山地。多年生之小草。莖甫
高於地中。葉為掌狀複葉。有五小葉。形似
五加葉。故有五加葉黃蓮之名。由葉叢間
出花軸。著花。花有白色瓣五。形稍似於梅
花。故又名為梅花黃蓮。
採其根狀莖。供於藥用。

秋牡丹（漢）　毛茛科

秋牡丹。自生於山野。多年生草。高二三
尺。葉為複葉。由三小葉而成。花淡紅色。有
多數之細花被。外形類似於菊。
栽培之為觀賞用。

Clematis paniculata *Thunb.*

大夢者。自生於山野。多年生木質性之蔓生植物。葉對生。為羽狀複葉。由卵形或心臟形之小葉而成。以葉柄卷絡於他物。花有四被。白色。排列為聚繖花序。

有毒之植物

Ranunculus sceleratus *L.*

石龍芮（漢）　毛茛科

石龍芮。自生於水邊或淺水。一年生或越年生草。莖二三尺。綠色多肉。中空。葉互生。下部分裂呈掌狀。有光澤。花小。直徑三四分。五瓣。色黃。雄蕊離生。雌蕊密生於膨大花托上。實為多數之小乾果。狀類初生桑椹。入藥有毒。可為觀賞用。

Anemone Hepatica L.

獐耳細辛(漢)　毛茛科

獐耳細辛都自生於山地。多年生草。高三四寸。葉三裂為掌狀。有長葉柄而叢生。花莖生於葉叢之間。頂著一花。下有萼狀之總苞。花有紅紫白等色之美麗花被。栽培之為觀賞用。

Eranthis pinnatifida maiim.

菟葵(漢)　毛茛科

菟葵都生於山地。多年生草。莖高二寸餘。色紫。葉深裂為掌狀。有長葉柄。花白。單生於莖頂。結三四个之骨葵。

按骨葵為植物學名詞。離生雌蕊發育而成之果實也。狀畧如葵。熟則一邊縱

Adonis davurica *Ledeb.*

Glaucidium palmatum *S. et Z.*

白根葵。有產於深山中。多年生草。高二尺餘。葉互生。分裂成掌狀。花大。具青紫色四萼片。美麗可觀。莖有刺。為觀賞用。

側金盞花(漢)福壽草。元日草(日)毛茛科側金盞花。有山地自生。多年生草。莖高尺餘。葉為複葉。畧似水芹之葉。花大而黃。有多數花瓣。為觀賞用。

Clematis florida *Thunb.*

鐵線蓮（漢）　毛茛科

鐵線蓮者栽培於庭園多年生之蔓生植物以葉柄卷絡於他物葉為複葉通常由九小葉而成花大其花被有青紫色或白色之異有毒觀賞用

Aconitum Fischeri *Reich.*

烏頭附子（漢）　毛茛科

烏頭者自生於山野多年生草高二三尺地下有多肉之根葉互生分裂為掌狀有光澤花青紫或白色有兜狀不整齊之萼栽培之為觀賞用入藥有猛毒可用為麻醉劑

Aquilegia flabellata *S. et Z.*

耬斗菜自生於深山多年生草高七八寸葉互生為複葉由三小葉而成小葉分裂成掌狀花青紫或白各瓣有向內方曲之長距觀賞用

Coptis japonica *Makino.*

黃連（漢）　毛茛科

黃連者自生於山地多年生草我國四川雅州產者最良高自三四寸至一尺餘葉為複葉由少數或多數之小葉而成由多數小葉而成者畧似水芹葉花小而白生於莖之上部結實子色黃根為藥用有健胃之效又可為黃染料

Anemone flaccida *Fr. Schm.*

Paeonia Montan *Ait.*

牡丹(漢)富貴花(中俗)　毛茛科

牡丹都為我國原產之落葉灌木高二三尺葉互生為重複葉分裂甚深花大徑三四寸有重瓣單瓣之別色有紅白紫等數種最美麗雌蕊周圍具囊狀盤觀賞用根可入藥花瓣供食用

二輪草(日)　毛茛科

二輪草自生於山野多年生草高四五寸葉深裂為掌狀有長葉柄花莖生於葉叢之間通常著二花花具白萼片有長梗有毒植物

Stauntonia hexaphylla *Dene.*

Akebia lobata *Dene.*

三葉通草。山野自生。蔓生植物。類於通草。惟三小葉為異。各小葉之緣邊有鈍鋸齒。花軸通常著數雄花及一雌花。雌雄花雖皆有暗紫色花被。然雌花之花被最大。果實為長楕圓形。有厚皮。熟則裂開。現白瓤。

效用與通草同。

野木瓜（漢）　木通科

野木瓜者。自生於山野。蔓狀木質之常綠植物也。葉由三或五或七之小葉而成。故有七五三蔓之稱。小葉為楕圓形。質厚有光。花單性。雌雄同株。雄花雌花同形同大。色白。具三片大萼及白色細長之三花瓣。果實卵形。暗紫色。果實供食用。其味甜。

Akebia quinata Dene.

Clematis apiifolia DC.

木通科　通草（漢）

通草自生於山野為蔓狀木質植物葉互生由五六小葉而成各呈橢圓形雄花雌花同生於一軸雄花有淡紫色之花被雌花比雄花畧大有暗紫色之花被果實長三四寸熟則一方縱裂現白瓤

毛茛科　牡丹蔓（日）

牡丹蔓都山野自生多年生之蔓莖葉細長以葉柄而卷絡由三小葉而成為複葉長柄對生花有白萼無瓣實為閉果密生長毛

有毒之植物也

Hydrastis canadensis *L.*

Nandina domestica *Thunb.*

南天竹者產於日本南部我國庭園亦多植之常綠灌木幹葉互生為羽狀複葉花軸生於幹之上部花五瓣小而色白實呈球形赤而美麗變種甚多有紅花白果或黃果及小葉彎曲圓形或掌狀等

莖葉甚雅秋冬緩赤果尤美為觀賞用幹之大者可作床柱及小器具

小蘗科

黑德拉斯題斯（拉）

北美原產之多年生草高約一尺葉為掌狀五裂乃至七裂花無瓣有綠萼片三實呈紅色似懸鉤子之果根狀莖及根之越幾斯為胃及子宮之止血藥

Diphyllein Grayi Fr. & Sav.

Epimedium macranthum
Morr. et Decne.

淫羊藿（漢）　小蘗科

淫羊藿都自生於山野。多年生草。高達一二尺。葉為二回掌狀複葉。由九小葉而成。小葉為長心臟形。中肋之左右不等形也。花紫色或白色。狀如鈴。栽培之供觀賞用。昔時為強壯劑。

山荷葉（漢）　小蘗科

山荷葉都深山自生。多年生草。高二三尺。一株著二葉。葉大而扁圓。二裂。花白色。數朵集生。果實為小橢圓形黑果也。

Berberis Thunbergii *DC.*

小蘗都山野自生落葉灌木高五六尺葉小數個叢生葉緣無凸凹各葉叢下具由葉變成之一針花軸從新葉間而生垂黃花雌花觸他物則起運動果實赤色為橢圓形

陰乾枝葉而煎之為洗眼藥故有日本之名又山民對其枝為黃色之染料

Cocculus Thunbergii *DC.*

木防己（漢）　防己科

木防己自生於山野為纏繞植物莖色綠而細小葉呈心臟形而互生花色淡綠形小單性雌雄異株根外白內黃出漢中者內有黑紋如車輻解

莖可造籃及葛籠等子可入藥

Berberis nepalensis *Spreng.*

十大功勞（漢）　小蘗科

十大功勞者多栽植於園圃為常綠灌木高四五尺葉為奇數羽狀複葉革質無柄緣邊有針狀鋸齒幹頂葉叢間生數花軸著黃花結小果為卵形長三分許熟則呈紫黑色供觀賞用子可入藥

Podophyllum peltatum *L.*

剝度比爾謨（拉）　小蘗科

北美自生多年生草根莖長葉稍呈傘狀有七至九裂葉柄如楯狀而長花瓣白色實為漿果由根莖取樹脂即剝度比爾謨脂用於瀉下藥

Magnolia Kobus *DC.*

辛夷自生於山野為落葉喬木高二三丈葉互生為倒卵形而尖花初出時銳如筆故又謂之木筆及既開則形大如蓮色白通常具六花瓣

材供器具及建築之用又栽培之為觀賞植物

Kadsura japonica *Dun.*

南五味子（漢）美男葛（日）木蘭科

南五味子自生於山野為木質常綠之蔓生植物含多量粘液葉為長卵形而厚有光澤花帶白色生於葉腋果實由小球集合而成

栽培之為觀賞用又莖之粘液足供製紙之糊料或以之塗髮

Jatrorrhiza palmata *Miers.*

古倫僕（日）　防己科

古倫僕者產於非洲東部多年生之蔓草以細莖纏繞於他物葉分裂呈掌狀互生花為小形單性雌雄異株根稱古倫僕根入藥則用為健胃劑及止瀉劑

Michelia compressa *Maxim.*

廣心樹黃心樹（漢）　木蘭科

廣心樹者暖地自生為常綠樹高六十尺葉呈長楕圓形全邊而厚花白而畧帶紅色似木蘭花而形較小栽培之為觀賞用材可供建築及器具用

Magnolia conspicua *Salisb.*

玉蘭即我國原產之落葉樹。高二丈餘。惟不易成長。葉與花瓣為倒卵形。葉全邊而互生。花九瓣大而厚。色白有香氣。未開時裹以厚苞。密生細毛。花落後始生嫩葉。觀賞用。又可為藥料。

Magnolia hypoleuca *S. et Z.*

厚朴（漢）　木蘭科

厚朴者。山地自生。落葉喬木。高四五丈。葉互生而大。為長倒卵形。初夏開花甚大。色淡黃。氣芬烈。皮厚色紫。

材製印版器具。作炭者可用於磨物。皮與花皆入藥。

Magnolia obovata *Thunb.*

Illicium anisatum *L.*

莽草（漢）櫟　木蘭科

莽草者暖地自生。為常綠樹。高丈餘。葉呈楕圓形。有透明之細點。互生。花開於葉腋。有黃白色及細長花瓣。實為乾果。相集而成輪狀。

枝用於佛前。乾葉製抹香材。為東類之細工料。果含猛毒。

木蘭木蓮（漢）　木蘭科

木蘭者。栽培於庭園。為落葉樹。高丈餘。葉大。互生。呈倒卵形。有三道縱文。花大且長。內白外紫。開於出葉之先。為觀賞用。又可入藥。

Myristica fragrans *Houtt.*

肉豆蔻毛拉卡原產之常綠樹東西印度孛拉日魯好望角等處皆栽此物嶺南人家亦種之高三尺葉橢圓形而尖花單性實為肉果果內有紅假種皮及堅種殼殼內有仁假種皮及仁有香味供食用又為消化及驅風藥

Lindera praecox *Bl.*

林待拉潑來考苦(拉)　樟科

此植物山野自生之落葉樹也畧似鈎樟而有香氣高約二丈葉全邊為卵形或橢圓形而尖花小而黃於末生葉時先開果實為球形帶黃色

材供器具及薪料果實榨出之油可供燃燈之用

Calycanthus praecox *L.*

臘梅科

臘梅（漢）

臘梅栽培於庭園為落葉灌木高丈餘葉對生為卵形而尖全邊也花有香氣其花被成於多數之片內層帶紫色而短外圍呈黃色有毒為觀賞用

Anona squamosa *L.*

蕃荔枝科

蕃荔枝（漢）

蕃荔枝產於南美之常綠樹今閩粵亦多有之高二丈餘葉平滑為披針形有多數之透明小點果實由多數雌蕊集合體而生色白味甘多汁果品中之最珍貴者

Lindera sericea *Bl.*

鉤樟　產山地自生落葉灌木皮外有黑斑絞高約一丈葉互生為長橢圓形緣邊有毛花小色黃集為繖形

Cinnamomum Cassia *Bl.*

桂皮　桂（漢）　樟科

桂皮產於我國嶺南及東印度為常綠喬木有芳香高約四五丈葉為廣披針形有三條大脈花小色黃樹名曰桂其樹皮即稱為桂皮

桂皮用為健胃藥矯臭藥及矯味藥

Cinnamomum Camphora *Nees.*

Machilus Thunbergii *Sol Z.*

大樟（日）　樟科

大樟者自生於暖地。為常綠樹高約四丈。葉為長橢圓形而厚。其裡面有細網脈。花黃綠色。果實球形。紫黑色。材為器具木版等料。樹皮為褐色染料。種子可榨油。又庭園栽此物。亦足供觀賞。

樟（漢）　樟科

樟產於黔蜀閩廣等處。為常綠喬木。高五六丈。大者十圍。葉互生。卵形而尖。有葉脈三條。花小。黃白色。果實黑球形。大如豌豆。全部有樟腦香氣。其材聲直。肌理甚細。以之製樟腦。可為防腐興奮之劑。材供

Cinnamomum Loureirii *Nees.*

Litsea glauca *Blob.*

此物生於日本暖地。為常綠樹。高約四丈。葉為長卵形而尖。下面密生白色細毛。花為小形。黃白色。集生於葉腋。果實色赤。球形也。

材為器具及薪炭之料。果實榨油。可供燃燈之用。

樟科

肉桂（漢）

肉桂都古稱牡桂。亦名菌桂。產於廣西及安南等處。為常綠喬木。高達數丈。葉互生。長橢圓形而尖。質厚有光。花小。淡黃色。排列為聚繖花序。皮多腦氣。味辛烈。根及皮供藥用。為強壯劑及矯臭矯味之藥。

Sassafras officinale *Nees.*



Laurus nobilis *L.*

月桂樹　老利兒（日）　樟科

月桂樹者歐洲南部原產之常綠樹有芳香高一丈五尺葉廣披針形或長橢圓形質厚而互生花小色黃集生於短花軸上實為黑褐球形之核果大於豌豆種子葉稱老利兒為矯臭藥果實外用於婁麻質斯腫物及疥癬等栽之為觀賞用

薩沙富拉斯（拉）　樟科

薩沙富拉斯為北美原產之落葉樹高二三尺葉為卵形或倒卵形往往三列花色淡黃雄花有九雄蕊雌花有不完全之雄蕊六及雌蕊一根稱為薩沙富拉斯木用為發汗藥及

Macleya cordata *R. Br.*

Dicentra pusilla *S.et Z.*

駒草生於高山為多年生草高三四寸葉細裂為複葉有長柄花莖生於葉叢中央莖之頂端開一朵或少數之花花色紫紅具巾著狀花冠(巾著者日人盛錢之囊也)供觀賞用

博落迴(漢)　罌粟科

博落迴都自生於山野為多年生草含黃色汁液高五六尺葉大卵形有缺刻長柄互生花小而白排列為圓錐花序有毒莖葉煎汁可驅除害蟲又與竹同煮能變竹為柔軟性

Chelidonium Majus *L.*

白屈菜（漢）　罌粟科

白屈菜生於山野。為多年生草。高二三尺。有黃色之汁液。葉為羽狀複葉。互生。花排列為繖形花序。有黃色之四花瓣。果實為角狀乾果而裂開。有毒植物。地下部可用為胃癌之藥。

Papaver somniferum *L.*

罌子粟（漢）　罌粟科

罌子粟為歐洲南部原產之越年生草。高達四五尺。葉為長楕圓形或長卵形。有缺刻或鋸齒。平滑無葉柄。花大而甚美麗。有二萼片四花瓣。及多數之雄蕊與壺狀之雌蕊。實即壺狀之乾果也。

Brassica campestris *L.*

Crataeva religiosa *Forst.*

魚木產於琉球諸島之灌木也葉合三小葉而成為複葉有光澤花白果實稍圓形而尖

栽於日本內地為觀賞用琉球以此果實為釣魚之餌魚木之名所由起也

蕓薹（漢）油菜（甲俗）　十字花科

蕓薹蔬菜植物隨處有之亦二年生雜草也莖多肉高三四尺葉大濃綠色無柄葉脚圍莖花色黃為總狀花序萼片及花瓣各四雄蕊六四長二短果實為長角狀熟則綻裂子出

嫩葉供食用子可榨油謂之菜油可食並燃燈及工業用又油粕可肥田

Corydalis incisa *Pers.*

Papaver Rhoeas *L.*

麗春花（漢）　罌粟科

麗春花。歐洲原產之一年生或越年生草。今江浙俱有之。金陵更佳。高一二尺。莖葉有毛。葉互生為羽狀。花開時有脫落之萼。及紅紫白色等美麗花瓣。果實為壺狀之裂果。

草花中之妙品。最適於觀賞用。

紫堇（漢）　罌粟科

紫堇者。自生於山野。為雜草。高一二尺。葉互生。為重複葉。裏似水芹葉。故一名為旱芹。花排列為總狀花序。有紫紅色不整齊之花瓣。內一瓣生有距。

堇葉味苦。瀹之則甘而滑。可充蔬食。

Nasturtium officinale *R. Br*

水石龍芮都歐洲原產之多年生草生於淺水高一二尺葉平滑為奇數羽狀複葉由卵形或楕圓形長楕圓形之小葉而成花白生線形之長角

幼葉及莖有辛味可供食用

Brassica campestris. *L.*

蕪菁（漢）　十字花科

蕪菁蔬菜植物亦一年生草或越年生草也根多肉有偏圓者有長形者俗名大頭菜葉大畧成匙狀無大缺刻花黃為總狀花序絕類薹薹花果實成長角

根及嫩葉供食用

Draba nemorosa *L.*
var. hebecarpa *Lcleb.*

Nasturtium montanum *Wall.*

蔊菜（漢）　十字花科

蔊菜多生於田野庭園等處為雜草高二三寸或一二尺葉為長橢圓形具不整齊之缺刻及鋸齒花黃而小有四花瓣與四強雄蕊果實為細長之乾果熟則裂開莖葉有辛味可供食用

葶藶（漢）　十字花科

葶藶者原野自生二年生草高七八寸葉及莖有細毛葉為長卵形無柄互生花微黃而小排列為總狀花序實橢圓為乾果子扁小如黍粒熟則裂開可供藥用

Cochlearia armoracia *L.*

西洋山葵為多年生草。栽培於諸國。葉長橢圓形而大。根圓柱狀。長入於地中。花為小形。具白花瓣。

根有一種芳香及辛味。可供香辛料。英國以之為藥用。內用則有利尿興奮等效。外用則有引赤發泡之效也。

Nasturtium palustre *DC.*

那司土魯題吳木。耙魯司脫來。(拉)

十字花科

田野自生之雜草。高七八寸。葉互生。往往分裂成羽狀。花小而有四黃瓣。排列為總狀花序。果實為長橢圓形之乾果。

Brassica cernua (*Thunb.*)

芥（漢）芥菜（中俗）　十字花科

芥多栽培於田野及園圃。一年生或越年生草。實蔬類植物也。高三四尺。葉似蕓薹而有銳缺。莖葉面常皺縮粗糙。花小而黃。為總狀花序。結實成莢。

莖葉可食。並宜作蘿蔔研粉。即芥末。味辛烈。可佐饌。并為藥用。

Thlaspi arvense *L.*

遏藍菜（漢）　十字花科

遏藍菜。自生於平野。為一年生草。高一尺餘。葉長楕圓形。或披針形。上部之葉無柄。花小色白。排列為總狀花序。果實類於團扇之形。

Capsella Bursa pastoris *Moench.*

Cardamine hirsuta *L.*
var. silvatica *Link.*

碎米薺者。自生於濕地或淺水。一年生草。或越年生草。高六七寸。葉互生。為羽狀複葉。成於多數之小葉。花形小。色白。排列為總狀花序。果實為細長裂果。

蔬類植物。可供食用。

薺（漢）　十字花科

薺自生於各地。為一年生草。或越年生草。高尺餘。下部葉分裂為羽狀。上部葉有缺刻或鋸齒。花小。四瓣白色。排列為總狀花序。果實扁平。為三角狀之裂果。

葉供食用。春七草之一也。

Isatis tinctoria L.



Raphanus sativus L.

蘿蔔菜脯(漢)大根(日)白菜脯　十字花科

蘿蔔多栽培於沙土。一年生草。或越年生草。實蔬菜植物也。高一二尺。葉分裂為羽狀。花有淡紫色。或白色之四花瓣排列總狀花序。果實為細長之閉果。根長色白多肉。別有紅蘿蔔。根圓皮紅。肉白。又間有皮帶青色者。根及葉供食用。子可入藥。

大青　菘藍(漢)　十字花科

大青。歐洲原產之一年生草。或越年生草。高二三尺。下部葉為倒卵形。有葉柄。上部葉為披針形。無柄。開四瓣黃色之花。排列為總狀花序。果實偏平。類於翹果。

葉葉可製藍。為染料。

Sarracenia purpurea L.

Raphanus sp.

野蘿蔔者各地自生之一年生草也性好陰莖高二尺餘而多肉葉互生呈尖卵形有鋸齒無葉柄葉脚抱莖花為總狀花序上部特呈繖房形花四瓣與萼俱離生為十字形色淡紫上部畧帶綠色嫩葉可食救荒之植物也

瓶子草科

瓶子草(目)

瓶子草原生於北美東部之池沼為草本地上叢生數葉各葉呈瓶子狀內貯雨水瓶子口緣分泌蜜汁內面生向下之細毛小蟲舐食其蜜則轉落於瓶子內而溺死故得吸收小蟲之腐敗物以為養分花生於長花軸頂暗紫色直徑一寸五分

Alliaria Wasabi *Prantl.*

Brassica oleracea *L.*

甘藍（漢）葉牡丹（日）　十字花科

甘藍原產於歐羅巴之海邊。今隴西人多種之。為越年生草。實蔬類植物也。高二尺餘。葉平滑而厚。色微白。幼時層層包裹成球狀。花淡黃色。四瓣排列為總狀花序。嫩葉可作蔬。變種甚多。

山葵菜（漢）　十字花科

山葵菜自生於山間濕地。為多年生草。高一尺餘。有特殊香味。葉圓心臟形。有長柄。花白色。具四花瓣排列為總狀花序。根莖為香味料。葉可食。

Drosera rotundifolia *L.*

Dionaea muscipula *L.*

捕蠅草。產於北美卡羅里那之沼地。多年生草。葉由小形之葉身及扁平之葉柄而成。緣邊有剛毛。上面畧少。此毛具銳敏之感覺力。小蟲觸之。則葉身兩側直閉合。而捕食為養料。

此亦食蟲植物之著名者。植物園中俱栽培之。

毛氈苔（日）　茅膏菜科

毛氈苔。自生於濕地。多年生草。高七八寸。葉叢生。由圓身及長柄而成。葉身上面有多數之毛。狀突起。分泌粘液。花莖生於葉叢中間。上著小花。為總狀花序。白色或淡紅色。

此植物之能以葉捕小蟲者。



猪籠草（漢）　猪籠草科

猪籠草為婆羅洲原產之食蟲草高二尺餘葉大而基部扁平中呈紐狀為卷絡之用末端則變形成瓶狀為捕蟲器蟲入籠中即被消化吸收形態奇特植物園中多栽培之

茅膏菜（漢）　茅膏菜科

茅膏菜生於山野之濕地為食蟲草高尺許葉畧如新月形有長柄緣邊突起多數腺毛花小而白或帶赤色

此草為著名之食蟲植物腺毛突起處分泌粘液捕獲小蟲吸收而消化之



Sedum purpureum *Link.*

Sedum kamtschaticum *Fisch.*

貴菜。山地自生。為多年生草。高尺許。葉互生。為倒卵形而長。質厚而畧似匙。緣邊有鋸齒。花排列於莖之頂端。為繖形小而色黃。

栽培之於庭園。為觀賞用。

景天科

景天（漢）

景天。栽培於庭園。為多年生草。高二尺許。葉互生。為楕圓形。肉質而無柄。緣邊有粗鋸齒。秋月開花。色白而畧帶紫紅。集生於莖之頂部。為繖形花序。供觀賞用。

Sedum lineare *Thunb.*



Aldrovanda vesiculosa *L.*

茅膏菜科

貉藻（日）

貉藻生於淡水中草本植物葉輪生葉身為圓形受刺激則直閉合花單生於葉腋具五花瓣

著名之食蟲草蟲觸葉身上面則葉合閉而捕之

景天科

塞獨姆利你亞來（拉）

山野自生肉質多汁之多年生草高六七寸葉細長多肉而尖呈淡綠色花形小而色黃

栽培之為觀賞用



Astilbe chinensis *Maxim.* var. japonica *Maxim.*

Hydrangea Thunbergii *Sieb.*

土常山野自生又栽培於庭園落葉灌木也葉長三四寸為廣披針形對生花開成叢稍類繖形外具大萼片四約五六分內形小止二三分花初綠後紅又有白色或白而帶紫斑都子蠻蠻如黃粟米

新葉蒸揉之去綠汁晒乾後加入湯內可作飲料

落新婦（日）　虎耳草科

落新婦都日本中部自生之多年生草也高約二尺葉為重複葉質剛而有光澤花通常為白色形小以多數集為圓堆花序栽培於庭園中供觀賞用

Sedum Sieboldi *Sweet.*

塞獨母。喜保嘗抵。(拉)　景天科

由栽培而生。為多年生草。係肉質性。莖下垂。葉畧圓。每三葉輪生。花小。淡紅色。叢生於莖之頂端。

為觀賞植物。多栽之於庭園。

Hydrangea hortensia *DC.* var. Azisai *A. Gr.*

八仙花(漢)紫陽花(日)　虎耳草科

八仙花。落葉灌木也。高約四五尺。葉橢圓形。平滑。對生。花大而美麗。為次第變色之萼。多數叢集。為圓狀花序。故又稱聚八仙。

俗謂之洋繡球。

栽培於庭園。供觀賞用。花芭共藥用。



Parnassia palustris *L.*

梅鉢草。自生於山地。為多年生草。高六七寸。下部葉為心臟形而尖。有長柄。上部葉同而無柄。花單生於莖之頂端。有五白花瓣。五雄蕊及五掌狀片。為互生。各片具黃小球（蜜腺）於末端數枝。

栽培之為觀賞用

Deinanthe bifida *Maxim.*

待囊待比肥達（拉）　虎耳草科

此物自生於山地。為多年生草。高一二尺。葉對生。為倒卵形。頭部二裂。花集生於莖之頂端。色白。

栽培之為觀賞用。又其粘液可供製紙之糊料。

Schizophragma hydrangeoides *Sieb. Z.*

岩綉（日）　虎耳草科

岩綉都山地自生。為蔓生之木質性植物。長二丈餘。葉對生。呈卵形而尖。有銳鋸齒。花序似八仙花。外圍有不整齊之萼。萼之一片甚大。呈白團扇狀。中部小萼俱整齊。栽培之供觀賞用。



Deutzia scabra *Thunb.*

溲疏（漢）　虎耳草科

溲疏自生於山野。為落葉灌木。高約一丈五尺。葉為長橢圓形而尖。有細鋸齒。葉面甚粗糙。花排列為圓錐花序。花冠色白。材供木釘及他用。又栽培於庭園。

Hydrangea involucrata Sieb

Saxifraga cortusaefolia S. et Z.

大文字草。自生於山地。為多年生草。高一尺餘。葉為肉質。淺裂成掌狀。具粗毛及長柄。花有白色不整之五花瓣。簇生於花莖之上部。

栽培之為觀賞用。

玉紫陽花（日）　虎耳草科

玉紫陽花。自生於山地。為落葉灌木。高四五尺。葉對生。長橢圓形。有多數之細鋸齒。花小。青紫色。排列為聚繖花序。花序外圍有大形萼片。以其花芽為球形。故有玉紫陽花之名。

栽培之為觀賞用。

Cardiandra alternifolia *S.et Z.*

Ribes Grossularia *L.*

「古司白里」Goose berry. 鵞漿果(英)　虎耳草科

鵞漿果者歐洲原產之落葉灌木有刺高三四尺葉淺裂為掌狀互生花黃綠色梗短每一朵單生或每二三朵叢生果實為球形綠黃而畧帶赤色果可供食用

草紫陽花(日)　虎耳草科

草紫陽花山地自生多年生草高二尺餘葉為廣披針形或長楕圓形有鋸齒花紫赤色叢生而畧似八仙花栽培之供觀賞用

Saxifraga sarmentosa *L.*

虎耳草。產於濕地。為常綠之多年生草。高五六寸。生絲狀匐枝。卧地延長。隨處著苗。葉為圓心臟形。有剛毛。背赤。花莖抽於葉叢之間。開不整齊之五花瓣。三小二大。色白。

人家多栽之於石上。為觀賞用。葉可食。

Pittosporum Tobira *Ait.*

海桐花（漢）　海桐花科

海桐花。生於南海及雷州。近海州郡亦有之。為長綠樹。高丈餘。葉倒卵形。長二寸許。質厚有光。花白如丁香。惟臭味不甚美。實大如指。秋時熟則三裂。子赤。

材可作艪臍。皮可作繩。入水不爛。又可作藥用。

Hydrangea paniculata *Sieb.*

糊空木　糊木(日)　虎耳草科

糊木者山野自生之落葉樹高一丈餘葉對生長卵形或長楕圓形端尖有鋸齒花白色排列為圓錐花序其下部有大萼片樹皮富有粘液採取之為製紙糊料材可製木釘或吸煙嘴

Astilbe chinensis *Maxim.* var. japonica *Maxim.*

阿斯題盧彼起乃思席斯加保尼蛤(拉)　千竹草(日)　虎耳草科

山野自生多年生草高二三尺莖葉皆有毛葉為三回羽狀複葉由多數小葉而成花具淡紫色或白色之細長五花瓣栽培之為觀賞用

Liquidambar orientalis *Mill.*

蘇合香　小亞細亞自生之落葉喬木葉分裂為掌狀以長葉柄而互生花形小為單性多數集生而成頭狀花序雌雄同株由樹皮採取樹脂稱為蘇合香可治疥癬

Liquidambar formosanum *Hance.*

楓（漢）　金縷梅科

楓一名香楓多生於江南及關陝為落葉喬木高二三丈葉掌狀三裂有細鋸齒至秋而紅春開黃褐色花叢集為頭狀有總苞結球果

栽培之為觀賞用皮下樹脂可代用為蘇合香（恩孫來路氏之說）本草楓香脂亦入藥

Distylium racemosum *Sel Z.*



Pittosporum undulatum *Vent.*

海桐花科

唐冬青（日）

唐冬青常綠灌木生於日本小笠原島高丈餘葉倒披針形為波狀緣邊花白有芳香果實似海桐熟則裂開而現赤色種子栽於盆內為觀賞用然性畏寒冬季宜置於暖室中

金縷梅科

蚊母樹（漢）

蚊母樹自生於暖地常綠喬木也高二丈餘葉長橢圓形全邊互生小蟲常聚於囊狀之膨大部蟲去則成空殼故有蚊母之稱花小無冠僅具綠萼及赤色雄蕊與有毛之雌蕊

材可供建築灰可製陶器庭園栽之可

Prunus Mume *S.et Z.*

Prunus armeniaca *L.*
Var. Ansu *Maxim.*

杏者蒙古原產之落葉樹也高丈餘我國栽培者多葉及花酷似梅實為核果成熟則肉與核分離味甘而不酸

果實供食用種子和水蒸溜即杏仁水藥用功效與苦扁桃水同其材可供器具之料

梅（漢）　薔薇科

梅我國多栽培之為落葉樹高二三丈早春開花香氣最強花瓣五出有一重與八重二種色有白或紅之別白者初時微帶綠色亦謂之綠萼梅葉後花而生卵形而端尖有鋸齒果實為核果熟於梅雨之頃花供觀賞用果實供食用材可為器具

Prunus amygdalus *Stokes.*

Hamamelis japonica *S. et Z.*

金縷梅科

金縷梅（漢）

金縷梅山地自生。為落葉樹。高丈餘。葉互生。為楕圓形。或倒卵形。花開於早春。有細長之黃花瓣。栽培之為觀賞用。

薔薇科

扁桃（日）

扁桃都中央亞西亞原產之落葉樹。高約一丈五尺。葉為披針形。類似桃葉。花無梗。每二朵聚生。果實雖似桃。而不多汁。成熟則皮乾裂開出核。

扁桃有甜苦二種。甜者供食。苦者入藥。我國謂

Pirus spectabilis *Ait.*

海棠多栽培於庭園為落葉樹高丈餘葉長卵形或長橢圓形而尖有鋸齒花萼赤而畧帶黑色花瓣為淡紅色

種類甚多曰貼梗海棠曰垂絲海棠曰西府海棠貼梗垂絲俱花而不實高尺餘專供觀賞惟西府結實可食名海紅即俗所謂海棠果

Rosa indica *L.*

月季花　長春花（漢）　薔薇科

月季花為常綠灌木高五六尺莖蔓生有刺葉為羽狀複葉由三或五之光滑小葉而成並有托葉甚狹花重瓣而紅有壺狀花托每月開放故有此種俗呼為月月紅

Fragaria virginiana *Ehrh.*

Potentilla Kleiniana *Wet A.*

泡台題爾拉苦來尼亞那(拉)薔薇科

此植物為原野自生之雜草莖伏卧地上葉為掌狀複葉有鋸齒下部由五小葉而成葉柄長花黃色集多數之雄蕊及雌蕊排列為有限花序

荷蘭莓　西洋莓(日)　薔薇科

荷蘭莓為北美原產之多年生草有匍匐之長莖每葉由三小葉而成小葉形大而平滑質硬花色白有宿萼果實赤色而肥大有肉質之花托

果實供食用

Potentilla chinensis *Ser.*

委陵菜　自生於原野為雜草莖伏臥於地上葉為大形羽狀複葉由多數小葉而成小葉為長形分裂為羽狀下面具白毛花五瓣色黃類於泡台恩題爾拉若拉依尼阿那（拉）之花

Rubus palmatus *Thunb.*

懸鉤子（漢）　薔薇科

懸鉤子　自生於山野為落葉灌木莖及葉有刺高三四尺葉分裂為掌狀以葉柄而互生花大近於棣棠花之花有白色五花瓣果實為黃色之肉果由多數之小核果而成

果實供食用花供觀賞用

Rubus trifidus *Thunb.*

Photinia glabra *Thunb.*

薔薇科

構莓（日）

構莓自生於日本之暖地為落葉灌木高五六尺葉大而有光澤類於械樹之葉互生花五瓣色白果實為黃色之肉果栽培之供觀賞用果實可食

薔薇科

赤茅（日）

赤茅自生於暖地為常綠樹高丈餘葉橢圓形或卵形端尖質厚而有鋸齒花為小形白色排列為圓錐花序果實赤色為球形之小肉果材作艦艤車軸扇軸等用

Cydonia japonica *Pers.* var. pygmaea *Maxim.*

Hagenia abyssinica *Willd.*

樝子者。山野自生。為落葉小灌木。高一二尺。葉倒卵形。有托葉。花黃色。類於 Cydonia japonica 之花。果實為圓形。有強酸味。

供觀賞用。實可食。搾取汁液。為酢之代用。或以之釀酒。

苦蘇（日）　薔薇科

苦蘇者。產於亞非利加洲「阿比西尼亞」地方之喬木。葉互生。羽狀複葉。花小。淡紅色。排列為圓錐花序。雌雄異株。

取其雌花而乾之。即苦蘇花。用為除絛蟲藥。

Agrimonia pilosa *Ledeb.*

龍芽草（漢）　薔薇科

龍芽草。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉為羽狀複葉。由大小不整之小葉而成。花小形。色黃。排列為總狀花序。果實有多數刺毛。能附著於他物。

Pourthiaea villosa *Dene.*

鎌柄（日）殺牛（日）　薔薇科

殺牛都山野自生。為落葉樹。高二三十尺。葉倒卵形而尖。有細鋸齒。花小色白。花序為繖房狀。果實赤色。小楕圓形之肉果。供觀賞用。材可用於鎌鍬等之柄。或牛鼻木。

Spiraea Thunbergii *Sieb.*

珍珠花。山地自生。為灌木。叢生多數花莖。高四五尺。葉互生。為小披針形。花小色白。叢生於莖之上部。

栽培之。觀賞用。

Spiraea cantoniensis *Lour.*

麻葉繡毬（漢）　薔薇科

麻葉繡毬。栽培於庭園。為灌木。高三四尺。葉互生。為廣披針形。或長楕圓形。花小色白。排列為繖房花序。

栽培之。供觀賞用。

Cydonia sinensis *Thouin.*

木瓜（漢）　薔薇科

木瓜處處有之。以產於宣城者為佳。落葉灌木也。高六七尺。樹皮剝離之跡為鱗狀。葉互生。為卵形而尖。花有紅色離瓣花冠。果實橢圓形。黃色。類於甜瓜。花供觀賞用。材供床柱之用。果實有強澁味。不適於生食。蒸而蜜漬之。乃可食。

Potentilla fragarioides *L.*

雉席（日）　薔薇科

雉席自生於山野。多年生草。叢生帶微毛。之羽狀複葉。小葉二或三。花莖生於葉叢中央。開數花於頂上。有黃色花瓣五。雄蕊及雌蕊甚多。

Mespilus cuneata *Matsum.*

山楂。予栽培於庭園。為落葉灌木。高五六尺。莖生針狀之枝。葉楔形。有鋸齒。花白色。數朵集生。略似林檎花。果實赤色或黃色。徑六七分。其構造亦類似於林檎之果實。供觀賞用。加果實於魚類而煮之。能使其骨變為軟忸。

Spiraea prunifolia *S. et Z.*

笑靨花（漢）　薔薇科

笑靨花者。栽培於庭園。落葉灌木。高四五尺。葉卵形。具細鋸齒。花細如豆。白色重瓣不結實。根株叢生。茂者數十條。劈株分種易活。一條千花。望之若堆雪。可供觀賞用。

Potentilla fruticosa *L.*

爬藤題拉夫魯題考撒(拉)　薔薇科

此植物自生於亞細亞歐羅巴及北亞美利加之山地。為小灌木。高三四尺。葉為羽狀複葉。以三或五或七之廣披針形小葉而成。花黃。

栽培之為觀賞用。

Prunus Pseudo-Cerasus *Lindi.*

櫻(日)櫻桃(漢)　薔薇科

櫻多產於日本。落葉喬木也。高二三丈。葉卵形。端尖。有鋸齒。互生。花美麗。五瓣。淡紅色。亦有重瓣者。實為核果。紫赤色。

日本以櫻為名花。花時觀賞者甚衆。又以其材供器具等用。樹皮貼用於小器具。為飾物。花為鹽漬。中湯作飲料。戒國專取果實為食品。

Amelanchier asiatica *C. Koch.*

自生於山地為落葉樹高二三丈葉橢圓形有鋸齒幼時具白毛花瓣細長色白花供觀賞用材供器具及薪炭之料用

Rhaphiolepis japonica *S. et Z.*

濱木斛(日)車輪梅(日)　薔薇科

濱木斛自生於海濱之暖地為灌木高三四尺葉互生橢圓形質厚花色白排列為圖錐花序與梅花相似花為觀賞用樹皮為染料

Spiraea japonica *L. f.*

繡線菊（漢）　薔薇科

繡線菊者自生於山地為落葉灌木高四五尺葉互生為長卵形而尖有鋸齒花小有紅色或白色之花瓣多數集生栽培之為觀賞用

Stephanandri flexuosa *S.et Z.*

粉米空樹（日）　薔薇科

粉米空樹山野自生落葉灌木高五六尺葉互生卵形而尖有缺刻及鋸齒花小色白雄蕊叢生向內彎曲供觀賞用

Pirus malus L.

Rosa centifolia L.

西洋薔薇者歐洲原產之落葉灌木高約三尺有不曲之刺葉為羽狀複葉由五至七卵形小葉而成花重瓣大形色紫紅或白萼及花梗具發香氣之腺

栽培之為觀賞用蒸餾其花取揮發油以製香水或為矯臭藥及矯味藥之料

西洋林檎（日）　薔薇科

西洋林檎者為歐洲原產之落葉樹高三丈餘葉互生為卵形有鋸齒花色白有花瓣五萼帶紅色稍集為繖形實乃大形之漿果也

栽培於各地果實可食又為釀酒之料

Prunus communis *Huds.*

Rhodotypos kerrioides *S. et Z.*

李（漢）　薔薇科

李為栽培之落葉樹。高丈餘。葉互生。為長卵形。或廣披針形。有鋸齒。花每朵五瓣。色白。有長梗。通常皆三朵集生。為一顆實。為球形核果。小時色青。熟則赤色者居多。果實供食用。今桐鄉縣所產槜李品味絕佳。

白山吹（日）　薔薇科

白山吹栽培於庭園。為落葉灌木。高四五尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。花白色四瓣。形狀畧似棣棠之花。供觀賞用。

Pirus sinensis *Lindl.*

梨多栽培於我國及日本。為落葉樹高三丈餘。葉卵形而尖。長柄互生。花五瓣色白。具黑褐色之藥。實為漿果。大而圓。頂微凹。外具小斑點。

果實供食用。材為建築及器具之料。

Prunus japonica *Thunb.*

薔薇科

郁李（漢）

郁李。即常棣。多生於山谷邱陵之間。為灌木。高四五尺。葉為廣披針形。有鋸齒。花淡紅色。五瓣。具多數雄蕊。實為核果。色紫赤。味酸。

栽培之為觀賞用。又材可為器具。仁可入藥。

Pirus communis *L.*

Geum japonicum *Thunb.*

水楊梅（漢）　薔薇科

水楊梅。山野自生。多年生草。高二三丈。下部葉為不整齊之羽狀複葉。狀與萊菔葉相似。花五瓣。黃色。果實上端為鉤狀。小乾果之聚合者也。

地下莖為藥用。治瘡腫有效。又幼時莖葉可食。

西洋梨（日）　薔薇科

西洋梨。為歐洲原產之落葉喬木。高五六丈。葉互生。卵形。有長柄。初時生有軟毛。花五瓣。色白。中具紫紅色之藥。實為倒卵形漿果。

果實供食用。

Eriobotrya japonica *Lindl.*

Duchesnea indica *Focke.*

枇杷（漢）　薔薇科

枇杷栽培於庭園為常綠樹高二丈餘葉大而互生為長橢圓形有鋸齒背密附褐色之毛花小色白數朵集生實漿果形圓色黃內含二三大種子

果實供食用及釀酒類

蛇莓（漢）　薔薇科

蛇莓者山野自生多年生草莖匍伏於地葉互生為複葉以三小葉合成有長柄花生於葉腋每葉腋間只著一花五瓣色黃下具萼狀總苞實細色赤畧似荷蘭苺之果有毒植物果不可啖

Rosa multiflora *Thunb.*

Rosa rugosa *Thunb.*

野薔薇（漢）　薔薇科

野薔薇都自生於山野。為落葉灌木。莖有刺。高四五尺。葉為奇數羽狀複葉。由橢圓形之小葉而成。花五瓣。色白。吐氣甚香。間有帶紅色之花瓣者。

玫瑰（漢）　薔薇科

玫瑰自生於海邊。為灌木。高二三尺。莖多刺。葉為奇數羽狀複葉。由多數橢圓形小葉而成。花具紅色或白色之瓣。甚美麗。花托如壺。外面密生刺。內部藏多數雌蕊。根皮為黃褐色之染料。花共觀賞及製

Prunus Persica *S. et Z.*
var. vulgaris *Maxim.*

桃　各國多栽培之為落葉亞喬木高丈餘葉互生呈披針形花有紅紫白等色之瓣及向內彎曲之多數雄蕊花梗甚短實為核果外附毛

果實為食用花供觀賞

Prunus laurocerasus *L.*

拉吳羅塞拉斯司（拉）　薔薇科

原產於地中海沿岸為常綠灌木高約一丈二尺葉厚有光澤緣邊有鋸齒花集生而小為總狀花序

葉蒸餾之可製拉吳羅塞拉斯司水供藥用

Rosa Wichuraiana *Crep.*

Cydonia vulgaris *Pers.*

薔薇科

榲桲（漢）

榲桲者歐洲南部原產之落葉樹今關陝生者最多高七八尺葉互生卵形或橢圓形背有毛花淡紅色五瓣形狀畧似林檎實為黃色漿果面凹凸有細毛氣甚芳香味澀果實供食用兼可入藥能下氣消食

薔薇科

照葉野薔薇（日）

照葉野薔薇自生於海邊之灌木莖有刺蔓延於地上葉為羽狀複葉以有光澤之小葉相合而成花五瓣色白能發異香栽培之為觀賞用又花可製香水

Prunus cerasus *L.*

Quillaja Saponaria *Mol.*

石鹼樹原產於南美為常綠亞喬木高丈餘葉互生卵形花單性形小綠色雌雄同株實為裂果

樹皮為石鹼之代用

薔薇科

實櫻（日）

實櫻都小亞細亞原產之落葉喬木高二丈餘葉橢圓形而尖有重鋸齒花瓣白色實為核果略呈圓形

果實供食用

Kerria japonica *DC.*

棣棠花（漢）山吹（日）　薔薇科

棣棠花都山野自生。落葉灌木高四五尺。莖綠色中有白瓤如通草。葉互生長卵形。端尖有鋸齒春暮開花。為金黃色單瓣者。結實重瓣則否。

栽培之為觀賞用

Prunus tomentosa *Thunb.*

山櫻桃、梅桃（漢）　薔薇科

山櫻桃都栽培於園圃。為落葉灌木。幼莖密生毛。葉卵形或長楕圓形。有鋸齒。互生。花五瓣色白。雌雄異。與梅花相似。實為核果。小球形。熟時色赤。

果實供食用

Lathyrus Davidii *Hov.*

Acacia senegal *Willd.*

產於亞非利加之北部為常綠樹高約二丈有下向之巨刺葉為二回羽狀複葉花軸生於葉腋花色黃有多數雄蕊實為莢果含種子數枚氣候乾燥時於莖之皮部裂孔溢出樹脂可為丸藥之粘料或刺激緩和藥等用又加於印刷用之繪具或為糊料用

荳科

莊芒決明（漢）

自生於山野為蔓草以卷鬚上昇葉為羽狀複葉又有大托葉花開如蝶形深黃色實類碗豆之莢長寸許子扁色褐嫩莖葉及莢皆可食救荒本草謂之山扁豆即此也

Phaseolus Mungo *L.* var. subtrilobata (*Fr. et Sav.*) *Matsum.*

Acacia catechu *Willd.*

阿仙藥（日）　莖　科

阿仙藥原產於前印度及東部亞非利加。常綠喬木。高約丈餘。葉為二回羽狀複葉。合多數小葉而成。花黃色。具多數雄蕊。實為莢果。含種子數枚。

材晒乾煎汁。得褐色塊。即阿仙藥。有收斂性。為止瀉劑。又加於苦魯謨或銅。可為褐色或黑色之染料。

赤小豆（漢）　莖　科

赤小豆者。栽培於農地之一年生草本。高二尺餘。葉以三小葉合成。小葉有淺裂三。花黃。冠似蝶形。瓣包雌雄蕊。為龍骨瓣。呈螺旋狀。果實為細長之莢。含赤色種子。子可供食。入藥能療腳氣。

Cytisus scoparius *Link.*

Medicago denticulata *Willd.*

苜蓿自生於原野。為二年生草。莖平卧於地上。葉為三小葉合成。小葉倒卵形。頂端凹陷。葉腋出花軸。著三至五朵之花。花小色黃。成蝶形。果實為螺旋形之莢。有刺。為牧草。馬嗜食之。又為蔬菜用。

金雀枝　荳科

金雀枝為歐羅巴原產之灌木。高四五尺。幼莖平滑。色綠。有縱行數列稜。葉為複葉。合三小葉而成。花每一朵或每二朵由葉腋生。花冠為蝶形。呈黃金色。栽培之為觀賞用。

Cladrastis amurensis *Bat H.*
var. floribunda *Maxim.*

Phaseolus vulgaris *L.*

槐槐（漢）　荳科

槐槐自生於山地。為落葉喬木。高約五丈。葉為羽狀複葉。密生細毛。花黃白色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實為長莢。材供輿人之細工用。及其他器具料。樹皮為染料。又栽培於庭園。足供觀賞。

菜豆（漢）　荳科

菜豆者。為一年生之蔓草。亦曰穀類植物。栽培者甚多。莖有卷鬚。葉互生。合三小葉而成為複葉。花軸生於葉腋。著數花。花冠為蝶形。白色或紫。龍骨瓣卷回成螺旋狀。果實長莢。子如腎臟形。色白或紅黑。



Vicia tetrasperma *Moench.*

Pisum sativum *L.*

豌豆原產於地中海沿岸今田圃多栽培之蔓生之越年生草長五六尺葉為羽狀複葉末端有卷鬚基部具大形托葉花如小蝶形白或略帶紫色結實成莢長寸許苗及子俱可食莖葉又可為肥料及家畜飼料

卡斯麻草（日）

卡斯麻草原野自生一年生草葉為羽狀複葉通常有五對小葉頂端具卷鬚卷絡於他物花每二朵同生於一軸形小淡紫色果實為平滑之莢通常含種子四枚為牧草適於家畜之飼料

荳科

Sophora japonica *L.*

Vicia venosa *Maxim.* var. cuspidata *Maxim*

槐（漢）　荳科

槐產於亞洲東部庭園間多栽植之為落葉喬木高二三丈葉為羽狀複葉互生花如蝶形黃白色排列為大圓錐形花序果實為長莢各種子間縮細如連珠材供建築及器具用實可入藥

箙藤（日）　荳科

箙藤自生於山地為雜草高二三尺葉為偶數羽狀複葉頂端有短突起小葉為廣披針形花排列為總狀花序有青紫色之蝶形花冠



Pterocarpus Marsupium *Roxb.*

Glycyrrhiza glabra *L.*

甘草。多產於我國川陝等省及歐洲之南部。多年生草也。葉為羽狀複葉。通常有十數個之長卵形小葉。花淡紅色。具蝶形花冠。簇聚成穗。

地下莖及根。供緩和藥。有特殊甘味。

荳科

吉納(日)

吉納產東印度原產之常綠樹。高四丈餘。葉為羽狀複葉。小葉頂端具凹形。花及果實俱類紫檀。

樹幹滲出之汁液。乾燥之即吉納。為收斂藥。

Cassia mimosoides *L.*

山扁豆（漢）　荳　科

山扁豆自生於原野一年生草高一二尺葉為羽狀複葉形細小由多數之小葉合成花生於葉腋黃色五瓣結實成莢長寸許含種子數枚

採其莖葉可為茶之代用品

Physostgma venenosum *Balf.*

加剌拔兒豆（日）　荳　科

加剌拔兒豆西部亞非利加原產之植物莖下部為木質葉為複葉由三小葉合成類似於菜豆花蝶形暗赤色排列為總狀花序實為莢果含二或三之扁平種子種子即藥為加剌拔兒豆供藥用能縮小瞳孔又



Pueraria Thunbergiana *Benth.*

Vicia Cracca *L.*
var. japonica *Miq.*

草藤。自生於山野。多年生草也。葉由多數小葉合成。為羽狀複葉。末端有卷鬚。卷絡他物。花青紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。

供家畜之飼料。

葛（漢）　荳科

葛。自生於山野。多年生之蔓草也。莖細長。葉以三小葉合成。為大形之複葉。互生。花赤紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實為扁莢。幼莖葉及果俱密生褐色之毛。

搗根取汁製粉。可供食用。又可製糊漿。粉中之最佳品質也。莖可代繩或編籃。纖維可織葛布。乾根可為葛根湯。

Aeschynomene indica *L.*

Lespedeza Buergeri *Miq.*

木蔾（日）　荳　科

木蔾都山地自生。為灌木。高五六尺。葉為複葉。由三小葉而成。形狀酷似胡枚子花。蝶形。白色有紫斑紋。

栽培之為觀賞用

合萠（漢）　荳　科

合萠自生於田野。為一年生草。高二三尺。葉合多數小葉而成。為羽狀複葉。互生。花黃白色。果實為細長莢。於每種子間有節。

栽培之供觀賞用

Indigofera pseudo-tinctoria *Matsum.*

馬棘 都自生於山野。為多年生草。高一二尺。叢成灌木狀。葉互生。為羽狀複葉。由多數小葉而成。花有紅紫或白色。花冠蝶形。類似萩花。排列為總狀花序。結實為莢。長六七寸。

栽培之為觀賞用。

Trifolium repens *L.*

脫里否里吳木里培恩斯(荷蘭) 荳科

歐洲原產。多年生草。莖細伏於地上。葉為複葉。由三小葉而成。有長柄互生。花小色白。具蝶形花冠。集為頭狀。

供家畜飼料。又可為肥料用。近年日本亦多栽此物。

Sophora flavescens *Ait.*
var. galegoides *Hemsl.*

苦參（漢）　莖科

苦參山野自生。河南四川產者最多。為多年生草。高三四尺。葉為羽狀複葉。由多數小葉而成。互生。花淡黃色。花冠蝶形。成長總狀序。實為細長莢。

有毒。莖葉煎汁。為農作物之驅蟲劑。根入藥。可治疥癬。及他寄生物。莖之纖維可取為織物。

Copaifera officinalis *L.*

骨湃波拔爾撒謨樹（日）　莖　科

南美原產之常綠樹也。高約二丈。葉為羽狀複葉。由四或十之卵形小葉而成。花具四萼片。無花冠。實為莢果。畧成楕圓形。含種子一枚。

幹穿深洞。流出樹脂。即骨湃波拔爾撒

Ptetocarpus Santalinus *L. f.*

紫檀產於熱帶地為東印度原產之常綠樹高五六丈葉為複葉以三小葉合成花為蝶形花冠果實具翼材赤色質堅重入水則沈製器具甚珍貴又可為染料

Caesalpinia sepiaria *Roxb.*

雲實（漢）　荳科

雲實自生於山野為落葉樹莖及葉有刺高丈餘葉為二回羽狀複葉由多數小葉合成花黃色畧具不整齊之花瓣排列為總狀花序實為莢果

有毒之植物也

Vigna sinensis *Hassk.*



Gleditschia japonica *Miq.*.

皂莢（漢）　荳科

皂莢。隨處產生。落葉喬木也。高三四丈。有銳針。葉為羽狀複葉。合多數小葉而成。花小。蝶形。呈黃綠色。結實為莢。長扁如刀。材供器具及薪炭之用。嫩葉可食。莢煎汁。用以洗濯。最能去垢。

豇豆　漢大角豆（日）　荳科

豇豆。多栽培於園圃。為一年生草。通常蔓性。葉為羽狀複葉。以三小葉合成。花淡青帶紫色。具蝶形花冠。結實成莢。長者或至二尺。

種子及嫩莢。可供食用。

Caesalpinia Sappan *L.*

蘇方木東印度原產之喬木也高約五丈莖有刺葉為羽狀複葉合多數小葉而成花美麗色黃枝去皮即販賣之蘇方削而煎之為紅色染料又根可採取黃色染料

Thermopsis fabacea *DC*

野決明黃華(漢)仙臺萩(日)荳　科

野決明自生於我國北部今處處有之為多年生草高二尺餘葉合三小葉而成為複葉基部有葉狀托葉花蝶形黃色排列為總狀花序實為莢果子入藥治目疾



Vicia hirsuta *Koch.*

Crotalaria sessiliflora *L.*

狸荳（日）　荳　科

狸豆都原野自生。一年生草。高一二尺。葉互生。為披針形。花外圍密生淡褐色毛。花冠蝶形。淡紫色。集生於莖之上部。

栽培之為觀賞用。

小巢菜（漢）雀豌豆（日）　荳　科

小巢菜者。自生於山野。蔓生之越年生草也。葉為羽狀複葉。合多數小葉而成。上端有卷鬚。花小。淡青色。具蝶形花冠。集生於花軸上部。果實為小形之莢。表面有毛。含種子二枚。

Abrus precatorius *L.*

Glycine hispida *Maxim.*

大豆。我國各省皆種之。東三省產額尤多。一年生草本。高二三尺。莖葉俱有毛。葉互生。為複葉。以三小葉合成。花小色白或帶紫色之蝶形花冠。結莢長寸餘。有毛。子可榨油。又可為甜醬醬油豆腐等各要品。莖葉為肥料及家畜之飼料。

相思子（漢）　荳科

相思子。亦名紅豆。東印度原產之蔓生木質植物。葉為偶數羽狀複葉。以多數小葉合成。花小蝶形。紅白色。排列為總狀花序。實為莢果。含鮮紅之種子。大如豌豆。亦有黑色或帶白色者。子供裝飾用。

Vicia Faba *L.*

Cassia acutifolia *Del.*

旃那（曰）　荳科

旃那都產生於熱帶亞非利加為灌木狀之植物葉為偶數羽狀複藥小葉長卵形而尖花黃色稍具不整齊之花瓣五實偏平為莢果葉可用為下劑

蠶豆（漢）　荳科

蠶豆多栽培於田圃越年生草莖方中空高二三尺葉為羽狀複藥以二或六之長橢圓形小葉合成基部有托藥花白帶紫色花冠蝶形有黑斑排列為短總狀花序結實為莢向上方

Rhynchosia volubilis *Lour.*

鹿藿。自生於田野。多年生之蔓草也。莖細長。卷絡於他物。葉為複葉。合三小葉而成。花蝶形。淡紫色。為短總狀花序。結實成小莢。通常含種子二枚。大如花椒。偏圓而黑。俗稱野綠豆。子可煮食。或磨麵作餅蒸食。入藥去疾有效。

Haematoxylon campechianum *L.*

勞孤　吳島樹（日）　荳科

勞孤吳島樹都中央亞美利加原產之常綠樹。高五丈。葉為羽狀複葉。小葉為倒心臟形。花黃色。著生於長軸。材之中心暗赤色。即勞孤吳島。可為收斂及強壯劑之藥用。又為最佳之染料。其色素稱為黑麻陶克喜。勞恩為赤色結晶體。更適用於顯微鏡實驗之染料。

Tamarindus indica L.

Mimosa pudica L.

含羞草（漢）　荳　科

含羞草。南美布拉日魯國原產之一年生草。莖葉有刺。葉為複葉。總葉柄之頂端生四枝。各枝有多數小葉。此葉因刺激而閉合。即下垂其葉柄。花淡紅紫色。集合為頭狀。結實為小莢。有刺。

栽培之為觀賞及實驗用。

羅望子（漢）答滿林度（日）　荳　科

羅望子者。熱帶亞非利加原產之喬木。葉互生。為偶數羽狀複葉。以多數小葉合成。花白。有赤色之線條。排列為總狀花序。實為莢果。

果實用為清涼藥。及緩下劑。

Desmodium podocarpum *DC.* var. *japonicum* *Maxim.*

Arachis hypogaea *L.*

落花生原產於熱帶亞美利加今隨處有之一年生草匍匐蔓延地上葉偶數羽狀複葉以四小葉合成花黃色蝶形子房於花後入地中生長成果實

種可供食並榨油及他用大落花生之種皮又可為造紙原料餅為肥料用

山菜豆（漢盜人荻）　荳　科

山菜豆自生於山野為雜草高二三尺葉互生為複葉合三小葉而成小葉長卵形端尖花蝶形淡紅紫色排列為總狀花序結實成莢通常含種子二枚各種子間畧細縮

Canavallia ensiformis *DC.*

Tolnifera Balsamum *L.*

篤留拔爾撒謨樹（曰）　荳　科

南美原產之喬木高七八丈葉互生奇數羽狀複葉花有不整齊之白花冠排列為總狀花序果實為莢

樹脂即篤留拔爾撒謨可治疥癬又為粉粧原料

刀豆（漢）　荳　科

刀豆多栽培於園圃一年生之蔓草也葉為大形複葉以三小葉合成花青紫色具蝶形花冠果實為大扁平莢長尺許子大如拇指頭淡紅色

實供食用可煮肉雜肉煮食尤美

Kraunhia floribunda *Taub.*

Cercis chinensis *Bge.*

紫荊　栽培於園圃為落葉灌木高丈餘叢生葉圓心臟形而尖花開於葉之先色紫甚細碎具假蝶形花冠數朵一簇或生於木身或附於根上枝下無花梗故又名為滿條紅結實成扁平之莢供觀賞用

荳　科

紫藤（漢）藤（俗）　紫藤自生於山野蔓生之木質植物也莖卷絡於他物葉互生為奇數羽狀複葉由長卵形小葉而成花紫色蝶形排列為總狀花序長一二尺下垂結實為長莢栽培之為觀賞用樹皮纖維可為織物種子及幼葉可供食

Albizzia Julibrissin *Boiv.*

Lespedeza bicolor *Turcz.*

合歡(漢)夜合花(中俗)　荳科

合歡都山野自生之落葉樹高丈餘葉為二回羽狀複葉由多數小葉而成至暮即合花小紅色美麗雄蕊多數甚長莢果亦長三四寸子如米粒

材可為器具之料又為觀賞用

胡枝子(漢)萩(中俗)　荳科

胡枝子都自生於山野為多年生之植物高四五尺下部木質上部草質葉合三小葉而成為複葉花有紅紫淡紫或白色數種具蝶形花冠

栽培之為觀賞用

Melilotus officinalis *Desr.*

Lotus corniculatus *L.* var. japonicus *Regl.*

百脈根　都山野自生。多年生草。高一尺餘。莖細長而傾斜。葉為羽狀複葉。由五小葉合成。基部二小葉為托葉狀。花黃金色。蝶形。實為莢果。

墨里老篤（日）　荳科

墨里老篤。歐洲原產之草本植物。有甘香氣。高二三尺。葉為複葉。合三小葉而成。花小而黃。有蝶形花冠。排列為總狀花序。採其花而乾之。即墨里老篤草。加於煙草有香氣。又為琵布劑用。

Myroxylon pereirae *Klotzsch.*

Dolichos Lablab *L.*

扁豆　鵲豆（漢）藤豆（日）　莧　科

扁豆。為亞非利加及東印度之原產。今人家多種之於籬垣。為一年生草。莖卷絡於他物。葉互生。為複葉。頗濶大。花白色或帶紫色。具蝶形花冠。排列為總狀花序。果實扁平。為鐮狀之莢。有黑白二種。嫩時可充蔬食。茶料。老則收子煮食。白者可入藥。

百露拔爾撒謨（日）　莧　科

百露拔爾撒謨者。中央亞美利加原產之喬木。高約五丈。葉為羽狀複葉。由七乃至十一小葉而成。花白色。為總狀花序。由皮裏採取樹脂。稱百露拔爾撒謨。治

Robinia pseudoacacia L.

洋槐。栽培之落葉樹。托葉變為刺。花開於四五月間。色白。有蝶形花冠。如豌豆狀。排列為總狀花序。具芳香之氣。此樹生長甚速。

材供種種之用。樹皮為染料。

Geranium eriostemon Fisch.

郡內風露(曰)　牻牛兒科

郡內風露者。高山自生之多年生草。高一二尺。葉分裂為掌狀。長柄互生。花甚美麗。呈淡紫赤色。

栽培之為觀賞用。

Lespedeza juncea *Pers.*
var. sericea *Hemsl.*

鐵掃帚(漢)著菽(日)　荳　科

鐵掃帚者山野自生。多年生草。高二三尺。葉互生。為複葉。以三小葉合成。形似倒卵而狹小。花白色。有紫斑紋之蝶形花冠。果實為短莢。一本凡生二三十莖。莖勁挺可為帚。

Astragalus gummifer *Labill.*

土拉格卡恩土護謨(日)　荳　科

產於西里亞及小亞細亞之灌木。葉為羽狀複葉。由四至八對小葉而成。花黃色。每三朵或五朵簇生。莖間浸出樹脂。乾燥之。即土拉格卡恩土護謨。與亞拉毘亞護謨有同一之效

Averrhoa Carambola *L.*



Oxalis corniculata *L.*

酢漿草　自生於原野之雜草莖伏卧於地葉合三小葉而成為掌狀複葉如浮萍有長柄互生小葉倒心臟形花黃色五瓣果實為蒴熟則綻裂飛散種子

五敛子　羊桃（漢）　酢漿草科

五敛子者原產於東印度今閩廣多有之常綠灌木高丈餘葉互生為羽狀複葉合多數小葉而成花完全構造似酢漿草實為漿果大如雞卵色青黃上有五稜作劍脊形果實供食用肉脆軟味酸甘蜜漬甚美

Geranium yezoense *Fr. et Sav.*

赤沼風露(曰)　牻牛兒科

赤沼風露春山野自生之多年生草也葉掌狀或三裂五裂以至七裂者有之花帶紫色花冠大於萼數倍栽培之供觀賞用

Geranium nepalense *Sweet.*

牻牛兒苗漢風露草(曰)　牻牛兒科

牻牛兒苗山野自生之多年生草莖細長有節蔓延於地上葉對生分裂為掌狀具長葉柄花五瓣白色或紅色每二朵集生酷似赤沼風露然其花小易區別之莖葉乾燥之可供藥用治痢疾最有效

Erythroxylon Coca *Lam.*

古加者。產於南美叱魯之灌木。高六尺餘。葉互生。為長稍圓形。花小。淡黃色。雌雄異株。

葉稱古加葉。以之製古加乙涅。行小手術時。可注射之。使局部麻醉。

Guajacum officinale *L.*

癒瘡木（日）　蒺藜科

癒瘡木者。西印度原產之常綠樹也。葉為羽狀複葉。由二對或三對之小葉而成。花帶紫藍色。簇生於枝之頂端。

材褐綠色。緻密堅牢。稱之為癒瘡木。供藥用。可治梅毒及流痲質斯等。又其材可作細工用。

Tropaeolum majus *L.*

金蓮花科

金蓮花（漢）

金蓮花原產於南亞美利加今直隸山西等省有之蔓生草本葉圓形有淺缺刻背面中部著長柄花美麗黃赤色瓣心鮮紅萼為合片有長距一

栽培之為觀賞用又茅及幼果供香味料

Linum usitatissimum *L.*

亞麻科

亞麻（漢）

亞麻培養植物中之最古者約五千年前東亞印度及埃及即栽培之為一年生草高三尺餘葉細為披針形互生花色青六七月時開

莖之纖維可供織物子可榨油稱亞麻仁油又可

Phellodendron amurense *Rupr.*

黃柏自生於山地。為落葉喬木。內皮色黃。高三四丈。葉為奇數羽狀複葉。小葉背面帶白色。花單性。色黃。雌雄異株。實色黑。大如黃豆。

內皮供染料及藥用。材可作器具。實亦入藥。

Citrus nobilis *Lour.*
var. microcarpa *Hassk.*

芸香科

金橘。金柑（漢）

金橘一名金柚。產贛浙川廣間。為常綠樹。高六七尺。葉橢圓形或卵形。有透明之小點。葉柄末端有關節。花五瓣。色白。實球形。大如指頭。嫩時色綠。熟則如黃金。故名。果實味酸甘而芳香。生食蜜漬皆佳。又栽培之可供觀賞用。

Aegle sepiaria DC.

Zanthoxylum schinifolium Sol. Z.

崖椒（漢）　芸香科

崖椒都自生於山野。為落葉灌木。高五六尺。莖有刺。葉為羽狀複葉。類似於山椒。而小葉數較多且有細鋸齒。花及果雖亦與山椒同。而惟發惡臭則異耳。

枸橘（漢）　芸香科

枸橘人家多種之為籬垣。落葉灌木也。高丈餘。多刺。葉合三小葉而成。為掌狀複葉。總葉柄具翅。花五瓣白色。果實黃色。成球形。內部構造類於柚子。葉刺橘核及樹皮俱入藥。

Evodia rutaecarpa *Benth.*

吳朱萸處處有之以產於吳地者為佳。落葉喬木高丈餘。葉為羽狀複葉。小葉橢圓形而厚。對生。花小。淡黃色。簇生於莖之頂端。結實纍纍紫赤色。

栽培之為觀賞用。又可為藥用。

Zanthoxylum piperitum *DC.*

山椒、秦椒(漢)花椒(中俗)　芸香科

山椒產山野自生。落葉灌木。有異香。高丈許。葉互生。羽狀複葉。葉柄旁有二刺。花單性。雌雄異株。實為乾果。熟則色赤裂開。現黑種子。

葉實及莖之皮部皆為香料。可供食用。材適於擂木與杖等用。

Citrus Aurantium L.

香橙（漢）九年毋（日）　芸香科

香橙適於暖地為常綠樹高丈許葉似柑而稍大柄端有節花亦似柑呈白色有香氣果實越歲成熟狀類柚而徑大約二寸許皮厚香烈味酸實可食並作盤中清供栽培之又為觀賞用

Orixa japonica *Thunb.*

常山（漢）　芸香科

常山自生於山野為落葉灌木高五六尺葉稍圓形有透明小點發惡臭甚烈花小淡黃色雌雄異株結實成蒴性有毒莖葉煎汁可截瘧並能殺牛馬蟲

Pilocarpus pinnatifolius *Lem.*

耶僕蘭曰（曰）　芸香科

耶僕蘭曰者南美布拉疾魯原產之灌木互生羽狀複葉小葉為全邊有透明小點花小而有柄集生於長花軸

葉稱為耶僕蘭曰葉（Folia jaborandi）用為發汗劑

Citrus nobilis *Lour.*

柑為亞細亞東南部之原產植物常綠灌木也高丈餘葉互生長卵形柄端具節花白色五瓣果實黃赤色為扁圓漿果具特殊香氣閩中謂之柑廣東稱甜橙而以蜜橘為柑變種甚多果實供食用果皮為香料製之入藥即陳皮去皮內白膜曰橘紅取實內纖維曰橘絡

Ruta graveolens *L.*



Citrus bigaradia *Duham.*

芸香科

臭橙(漢)代代花(中俗)

臭橙者東印度原產之常綠樹高丈餘葉互生卵形有透明小點葉柄具翼花白色五花瓣果實球形熟則黃赤色翌年夏變綠色

果實汁液搾代醋用果皮製油名橙皮油用為矯臭及矯味藥或加於水為飲料採花蒸餾之為橙花油亦可作矯臭藥或香水又栽培之為觀賞用

芸香科

芸香(漢)

芸香為歐洲南部原產之多年生草下部為木質莖高一二尺葉互生為羽狀複葉花黃綠色六月始開全部香氣強烈葉置書間席下可辟蠹蟲樹皮或樹脂雜諸香焚之可薰衣祛濕

Quassia amara *L.*

Picrasma quassioides *Benn.*

苦木科

括失亞都產於西印度之常綠樹高約二丈葉為羽狀複葉總葉柄有翅花色亦排列為總狀花序

材即稱為括失亞木入藥則用以健胃味甚苦

苦木科

苦楝子（漢）苦木（日）

苦楝子都自生於山野為落葉樹有苦味高二丈餘葉為奇數羽狀複葉由長卵形之小葉而成花為黃綠色有單性及兩性都

材供器具之用樹皮為染料枝葉煎汁可除植物之害蟲

Citrus medica L. var. acida Hook.

Citrus medica L. var. Limonum Hook.

芸香科

柚(漢)

柚產於閩廣。為長綠喬木。高丈餘。枝有刺。葉互生。長卵形。葉柄有翅。上端具節。花白色。五瓣。果實黃色。為扁圓漿果。皮甚厚。不易剝脫。香氣頗烈。

果皮及花蕾可為香料。又栽培之為觀賞用。

芸香科

里木子、宜母子(漢)檸檬(日)

里木子為前印度原產之常綠灌木。廣栽培於暖地。葉與花類柑或柚。果實橢圓形。兩端尖。色黃味酸而氣香。

果皮製揮發油。謂之里木子油。又作飲料。謂之檸檬水。肉含強酸味。取汁加石灰漿製造而得無色結晶。入水易溶。又謂之檸蒙腹。

Cedrela chinensis *Juss.*

Melia japonica *Don.*

楝（漢）　楝科

楝者自生於暖地為落葉樹高二三丈葉為重複葉由多數長卵形之小葉而成花淡紫色排列為圓錐花序果實稍圓形長五六分熟則呈黃色

材供建築及器具之料又栽培之為觀賞用

香椿（漢）　楝科

香椿者各地栽培之落葉樹高三四丈葉為大形羽狀複葉嫩時色紅香甘可食因名曰香椿花小色白結實為蒴果

嫩芽供食用材供器具用又供觀賞

Boswellia Carterii *Bird.*

橄欖科

乳香(漢)

乳香產於紅海沿岸為常綠喬木高約二丈葉為羽狀複葉小葉有鋸齒花小色白或淡赤色

由其莖浸出樹脂而凝固之稱乳香為薰物料又為藥品中最古者之一膏藥之混和料尚多用之

Balsamodendron Myrrha *Nees.*

橄欖科

密兒拉(日)

密兒拉者南部亞拉比亞及北部亞皮西尼亞原產之灌木葉為複葉通常以三小葉而成花萼花冠皆四片而小子房二室或三室結實為核果末端尖銳

由其莖滲出黃乳液乾之即密兒拉用

Polygala japonica *Houtt.*

Polygala senega *L.*

攝涅瓦（俄）　遠志科

攝涅瓦為北亞美利加原產之多年生草。高約尺許。葉互生。為披針形或長卵形。花小色白。排列為穗狀花序。

地下部即攝涅瓦根。供祛痰藥。

遠志（漢）　遠志科

遠志者。山野自生。陝西之綏德。河南之開封產者最多。為常綠草。高七八寸。葉卵形或楕圓形。互生於細莖。花如蝶形。色紫有不整齊之花冠。

地下部供藥用。富有祛痰之力。

Swietenia Mahagoni /

楝科

隅毫蛤尼樹（拉）

隅豪蛤尼樹。產於美洲中央之常綠樹。高八丈。餘葉為偶數羽狀複葉。小葉四對。為卵狀披針形。花序生於葉腋。簇聚多數。與楝花相似。

材供器具之料。

Polygala Reinii *Fed Sav.*

遠志科

柳葉草（日）

柳葉草者。自生於山野。為多年生草。高一尺餘。葉形類於柳葉。互生。花黃而不整齊。排列為總狀花序。

地下部可入藥。其效用畧同於遠志。

Aleurites cordata *Muell. Arg.*

Acalypha australis *L.*

大戟科

罌子桐。高約二丈。為落葉樹。日本亦多栽之。葉類桐而花為淡紅色。果實球形。含三四枚之種子。由種子榨油。稱為桐油。可塗紙與布等之用。又可製為假漆。番漉青等。惟有毒。不能食。材供木屐及其他器具之料。

榎木草編笠草（白）　大戟科

榎木草都自生於平野之一年生草。高約二尺。葉酷似朴樹之葉。花小。單性。雌雄同株。苞呈編笠狀。位於花序之下。故又稱為編笠草。

Hevea guyanensis *Aubl.*

巴拉護謨樹(巨)彈性護謨樹(巨)大戟科
產於南美之熱帶地。美麗喬木也。高六七丈。葉以三小葉而合成為複葉。有長柄互生。花小。無花冠。
傷其幹。流出乳液乾之。以製彈性護謨。可供種種之用。今各國所用者。大抵皆由此物採取之也。

Mallotus japonicus *Muel. Arg.*

赤芽槲(巨)　大戟科
赤芽槲。山野自生之落葉樹。高約三丈。以芽帶赤色。故有是名。葉大。為廣卵形。端稍尖。淺裂。呈微掌狀。花淡綠色。單性。雌雄異株。
此物多栽於庭園。其材供器具之用。

Phyllanthus Urinaria L.

葉下珠自生於平地之一年生草莖長三四寸至六七寸傾斜葉互生為小楕圓形花細微生於葉腋果實形小而扁圖

Ricinus communis L.

蓖麻（漢）唐胡麻（日）　大戟科

蓖麻為亞非利加原產之一年生草高六尺餘葉互生葉身大分裂成掌狀為楯形著長葉柄花單性排列為圓錐花序雌花位於上部雄花位於下部實為裂果子有黑斑紋

搾取種子油稱蓖麻子油用於緩下劑或加於印油中

Mallotus philippinensis *Muel. Arg.*

Croton Eluteria *Benn.*

加斯加利剌(曰)　大戟科

加斯加利剌產於西印度。為灌木高五六尺。葉長卵形而尖。有葉柄互生。花為單性而形小。雌雄同株。

樹皮即稱為加斯加利剌皮。為健胃藥。又混於煙草。有香氣。

加麻剌(曰)　大戟科

加麻剌產於濠州非律賓東印度等處。為常綠樹高約二丈。葉卵形有長柄互生。花單性無花冠。雌雄異株。果實為圓蒴。表面有赤褐色粉狀之腺。

此腺即稱加麻剌。入藥能驅除條蟲。又

Sapium sebiferum *Roxb.*

烏臼原產於熱帶亞細亞我國南方多有之為落葉喬木高二丈許葉廣卵形端尖花小單性黃白色

種子皮部含多量脂肪為肥皂及蠟燭原料其內仁壓取清油燃燈尤明

Croton Tiglium *L.*

巴豆(漢)　大戟科

巴豆今多生於巴蜀為東印度之原產常綠灌木高丈許葉卵形端尖基部有二蜜腺花小花叢之上部為雄花下部為雌花果實之外皮脫薄乾則裂開子出

子可榨油謂之巴豆油此油內用之為激烈之瀉下劑外用之為皮膚之引赤藥

Hevea guyanensis *Aubl*

Euphorbia pekinensis *Rupr.*

大戟科

大戟（漢）

大戟者山野自生多年生草高三尺餘葉互生呈披針形有細微鋸齒花小單性雌雄皆無花被生同處有四片苞狀之總苞圍繞有毒之植物也

彈性護謨樹（日）巴拉護謨樹（日）大戟科彈性護謨樹者產於南亞美利加之熱帶地木本植物高數十尺葉為複葉由三小葉而成花小單性傷其幹採白色乳樣液可製彈性護謨

Rhus vernicifera *DC.*



Coriaria japonica *A. Gr.*

木本黃精葉鈎吻自生於山野為落葉灌和高四五尺葉對生長卵形而尖無葉柄有三大脈花單性雌雄異株亦有同株者果實赤色甚美麗其肉部即生長花瓣有毒植物果實特含猛性

漆樹科

漆樹（漢）

漆樹產於湘鄂皖浙諸省為落葉樹有雄株雌株之別高約三丈葉為羽狀複葉小葉卵形或橢圓形而尖有全邊花小黃色排列為圓錐花序果實小而扁圓無毛皮內樹脂即漆可塗物漆觸空氣酸化變黑色實可取蠟供蠟燭用材可作器具

Daphniphyllum macropodum *Miq.*

交讓木（漢）石呆樹（俗）　大戟科

交讓木都自生於山地。為長綠樹。高丈餘。葉長楕圓形。互生。質厚有光澤。下面綠。背具白色之蠟質。柄赤。花小。單性。為總狀花序。雌雄異株。果實楕圓形。大三分許。色黑。新葉出後。舊葉凋落。故有交讓之名。

Empetrum nigrum *L.*

岩高蘭（漢）　岩高蘭科

岩高蘭自生於亞細亞歐羅巴及北美之高山。為常綠小灌木。莖卧地。葉小。為線形。密生於莖。花單性。雌雄異株。果實黑色。如豌豆大。為漿果樣之核果。有甘味。栽培之為觀賞用。又果實供食用。

Rhus semi-alata *Murr.*
var. Osbeckii *DC.*

鹽膚木　山野自生落葉樹高丈餘葉為奇數羽狀複葉由長卵形之小葉而成總葉柄具翼花小色白排列為圓錐花序實為核果密生白毛熟則外附白粉材為小細工資料樹皮為染料葉上有蟲巢成瘤狀謂之五倍子亦可為染料

Rhus succedanea *L.*

漆樹科

黃櫨（漢）櫨

黃櫨多產於豫蜀等省為落葉樹高丈餘葉為奇數羽狀複葉有光澤成於長卵形之小葉花小單性雌雄異株果實小而扁圓且堅

果實可採蠟材為小細工料又栽培之供觀賞用

Pistacia lentiscus L.

Rhus Toxicodendron L. var. radicans Miq.

野葛（漢）蔦漆（日）　漆樹科

野葛者。自生於山地。蔓生之木質性植物也。莖細長。自氣根而上昇。葉互生。以三小葉合成。花及果實皆似漆樹。

植物之有毒者。

乳香（漢）　漆樹科

乳香。為歐洲南部原產之常綠樹。生於紅海沿岸。高約一丈五尺。葉偶數羽狀複葉。小葉長卵形。花小。單性。色白。

由莖浸出樹脂而凝固之。稱乳香。溶於酒精或松香油中。可造為假漆。以溶於强酒精者填充齒穴。又齒乳香。則有强齒之效。又可用為薰香之料。

Ilex macropoda *Miq.*

Ilex crenata *Thunb.*

圓葉落霜紅。自生於山地。落葉喬木。高四丈。樹皮灰白色。稍帶綠。葉卵形。有鋸齒。時或叢生。花色白。集生於葉腋。實為球形漿果。色赤。

材充車物細工之用。嫩葉可食。並為茶之代用品。

犬黃楊（日）　冬青科

犬黃楊者。山野自生。為常綠樹。多灌木狀。然有高達二丈五尺者。葉橢圓形或倒卵形而厚。長約六七分。花小色白。果實小而圓。色黑。

栽培於庭園。供觀賞用。材可為圖版梳篦及他器具料。



Mangifera indica *L.*

Rhus trichocarpa *Miq.*

漆樹科

嗎恩孤樹（日）

嗎恩孤樹。為東印度原產之常綠樹。高數丈。葉互生。質厚。為廣披針形。花小黃色。排列成圓錐花序。實為核果。熟則變黃。長四五寸。

實供食用。熱帶果實中美味之一也。

漆樹科

山漆（日）

山漆。自生於日本之山地。為落葉喬木。高約三丈。葉為羽狀複葉。有毛。小葉長卵形。或長楕圓形。端尖。通常有全邊。花小黃色。排列成圓錐花序。果實小而扁圓。密生硬毛。

Ilex latifolia *Thunb.*

Ilex paraguayensis *Lambert.*

波羅樹。原植於廣州南海廟中。他處所有。皆從此分出。為常綠喬木。高二三丈。葉互生。為長橢圓形。質厚有鋸齒。花簇生而小。淡綠色。果實色赤。為橢圓形。

栽培之為觀賞用。材可為車輿等物細工。樹皮可製黐。葉可為茶之代用品。

巴拉辯阿以茶(日)　冬青科

巴拉辯阿以茶。南美巴拉辯阿以原產之常綠樹。高約三丈許。葉長橢圓形或長卵形。有鋸齒。花小色白。排列為有限花序。生於葉腋。

其葉如茶。可供飲料。亦含茶素。(Theine)

Ilex Sieboldi *Miq.*

Ilex pedunculosa *Miq.*

落霜紅（漢）　冬青科

落霜紅。自生於山地。為落葉灌木。高丈餘。葉為卵形。有鋸齒。花小而色白。果實小球形。赤色者多。白色者少。

栽培於庭園。供觀賞用。

冬青（漢）　冬青科

冬青者。自生於山地。為常綠樹。高二三丈。葉互生。為卵形。全邊而尖。質厚有光澤。花小色白。畧黃。為單性。雌雄異株。實如小豆大。赤色。

材為器具薪炭料。葉煎汁為渴[illegible]

Celastrus articulatus *Thunb.*

Euonymus oxyphylla *Miq.*

鈍花者山地自生之灌木高七八尺葉對生楕圓形有鋸齒花小淡綠色排列為聚繖花序果實為球形乾果裂開現被包種子

栽培之為觀賞用

衛矛科

蔓梅擬（日）

蔓梅擬者山野自生之落葉灌木莖細長生多數之傾斜枝葉互生楕圓形有鋸齒花小淡綠色實為球形乾果色黃裂開現黃赤色被包種子

栽培之為觀賞用

Euonymus alatas *K. Koch.*
var. subtriflora *Fr.et Sav.*

Ilex integra *Thunb.*

黐木（日）　冬青科

黐木者。自生於山野。為常綠樹。高二三丈。葉互生。為長橢圓形。質厚有光澤。花小。單性。有白色之花冠。雌雄異株。實球形漿果。色赤。

材為車物細工。及印版之料。莖之內皮可製鳥黐。又栽培之為觀賞用。

小桃葉衛矛（漢）　衛矛科

小桃葉衛矛者。山野自生之落葉樹。高丈許。葉對生。橢圓形。有鋸齒。花淡綠色四瓣。排列為聚繖花序。實為乾果。裂開現假種皮。子帶紅色。

栽培之為觀賞用。材可作細工。樹皮為

Euonymus europaea *L.*

Euonymus japonica *Thunb.*

桎者栽培於庭園之常綠樹高丈餘葉稍圓形有光澤對生花小色白觀賞用並栽植之為藩籬

桃葉衛矛（漢）　衛矛科

桃葉衛矛者山地自生之落葉樹高丈餘葉對生長橢圓形或長卵形端尖有鋸齒花小色白排列為聚繖花序材為器具料又可為觀賞用

Euonymus alatus *K. Koch.*

Euonymus japonica *Thunb.* var radicans *Miq.*

衛矛科

扶芳藤（漢）

扶芳藤自生於山野蔓生常綠之木質植物也莖以細短之氣根上昇於他物葉對生為楕圓形有鋸齒花小黃綠色排列為聚繖花序

栽培之為觀賞用

衛矛科

衛矛（漢）

衛矛者自生於山野為落葉樹高約丈許莖有刺狀突起葉對生為楕圓形有鋸齒花小黃綠色排列為聚繖花序實為裂果現赤色被包種子

材為小細工料樹皮為紙料又栽培之

Acer saccharinum *L.*

砂糖楓。北美原產之落葉喬木。高約四丈。葉三裂或五裂。背有白色細毛。花黃綠色。無花瓣。果實與槭樹相似。莖之汁液。可製砂糖。材可為器具料。

Aesculus turbinata *Bl*

七葉樹（漢）杤櫟（日）　七葉樹科

七葉樹者。自生於山地。為落葉喬木。高四五丈。葉對生。掌狀複葉。小葉形大。而其數為七。花有稍不整齊之瓣。色白而畧帶淡紅。為圓錐花序。實為裂果。含大形種子。子可食。材堅緻。可為器具。

Acer palmatum. *Thunb.*

Acer purpurascens *Fr.et Sav.*

槭樹科

構槭樹（日）

構槭樹者山地自生之落葉樹高約二三丈葉掌狀五裂淡綠色花序皆由側芽而生著赤色之花栽培之為觀賞用又為器具薪炭等料

槭樹科

槭樹（漢）

槭樹自生於山地為落葉喬木高數丈葉分裂為掌狀以葉柄對生經霜而丹性與楓類花小紫色藥亦帶紫實為乾果不裂開有二翅材供器具之料又栽吾之為觀賞用

Melicosma myriantha Sol. Z



Nephelium Litchi Camb.

荔枝。產於閩粵四川亦有之。為常綠喬木。高三四丈。葉為羽狀複葉。小葉銳頭有透明之點。花無瓣。果實被以鱗片。種子肉質。有假種皮。色白味甘多汁。為果品之美味者。

（上圖係荔枝果實下圖係龍眼果實）

泡吹科

泡吹（白）

泡吹者。山地自生之落葉樹也。高約四丈。此材著火則生泡。故名。葉類似於棗而面形較廣。花小色白。集為圓錐序。材供造車等細工之料。



Sapindus Mukurossi *Gaertn.*

Nephelium Longana *Camb.*

無患子科

無患子(漢)

無患子栽培於庭園。為落葉樹。高二丈餘。葉互生。為偶數羽狀複葉。小葉皆長卵形。花小黃色。排列為圓錐花序。實球形。有堅果皮。中含一子。色黑。

材供器具料。果皮煎汁為洗濯用。子可為念珠。日人又以其球果為毽子。

無患子科

龍眼(漢)桂圓(中俗)

龍眼產於閩廣。又以出福建興化者最良。為常綠喬木。高數丈。葉為羽狀複葉。花五瓣。色白。果實圓如彈丸。外被剛毛。子具假種皮。肉白如荔枝。味甘。鮮乾皆可食。(參照荔枝圖)

Berchemia racemosa S.et Z.

熊柳。多生於山地。為落葉喬木。高丈餘。葉互生。為楕圓形或卵形。花小色白。排列為圓錐花序。

供燃薪料。

Rhamnus japonicus Maxim.
var genuina Maxim.

鼠李（漢）　鼠李科

鼠李。自生於山野。為落葉喬木。高丈許。枝梢有針。葉互生。為楕圓形。花小。為淡黃微綠色。果實大如小豆而黑。

入藥為瀉劑。實之嫩者。取汁可染綠色。

其材為薪炭料。

Impatiens Balsamina L.

Subia japonica Maxim.

泡吹科

清風藤(漢)

清風藤。生台州天台山中。木質之蔓生植物。幼莖呈綠色。葉卵形。秋至則脫落。惟葉柄宿存為針狀。花黃色。生於葉腋。栽培之供觀賞用。又可入藥。愈風疾。

鳳仙花(漢)指甲桃(申俗)　鳳仙花科

鳳仙花原產於東印度。今人家多植之。為一年生草。高尺餘。葉長橢圓形或廣披針形。互生。花生於葉腋。不整齊。有紅紫白等色。實為裂果。熟則裂開。子散婦孺多以花染指甲。故亦稱指甲花。

Parthenocissus tricuspidata *Pl.*

Vitis Thunbergii *S. et Z.*

蘡薁。山野自生。為蔓生植物。以卷鬚纏絡於高樹。葉掌狀。背面密生白色之毛。花小。黃綠色。結紫黑色之球形小漿果。此物酷似山葡萄。以其葉小而異之。

實可食。味酸。詩。六月食薁。即此。

地錦（漢）爬山虎（中）俗為夏為（日）葡萄科

地錦。田野階砌間皆有之。多年生之蔓生植物。莖具吸盤之卷鬚。上絡於他物。葉互生。分裂為掌狀。花小。黃綠色。集生於葉腋。結實成球形。為黑漿果。味辛。

栽培之為觀賞用。葉至秋呈美紅色。漸乃脫落。

Zizyphus vulgaris *Lam.* var. mermis *Bge.*

Hovenia dulcis *Thunb.*

鼠李科

枳椇（漢）

枳椇生於山野之落葉喬木。高三四丈。葉互生。卵形。有三大脈。花小色白。果實具肥大之肉。簇柄畧如雞爪。故俗稱雞爪子。味甘如蜜。

材可為器具料。果實之柄供食用。

鼠李科

棗（漢）

棗有南北二種。北棗產於直隸山東等省。南棗產於浙江金華。為落葉喬木。高二丈餘。葉互生。卵形。花小黃綠色。實為核果。熟則呈赤褐色。

北棗南棗俱供食用。



Vitis vinifera *L.*

葡萄原產於西域今我國皆栽植之而北方尤多蔓生之木質植物也莖以卷鬚上升於他物葉互生分裂成掌狀幼時有棉狀之毛花小淡綠色生於葉腋列為圓錐花序花瓣不開而落實為漿果紫綠色果實甘美可食又可釀酒惟其植物變種頗多

Corchoropsis crenata *Sieb. Z.*

田麻（漢）　田麻科

田麻自生於原野為雜草高二三尺葉為卵形互生花生於葉腋有黃色之五花瓣實為細長蒴果

Cissus japonica *Willd.*

Ampelopsis heterophylla *S. et Z.*

蛇葡萄（漢）　葡萄科

蛇葡萄者。山野自生。多年生之蔓草。莖以卷鬚纏絡於他物。葉分裂為掌狀。以長葉柄而互生。花小。有黃綠色五花瓣。實為球形漿果。青藍色。不可食。

烏斂莓（漢）老鴉眼（中俗）　葡萄科

烏斂莓。山野自生。蔓生之雜草。莖以卷鬚而纏絡於他物。葉互生。為掌狀複葉。以五小葉分歧而成。花小。黃綠色。四瓣。排列為聚繖花序。頂平。

根莖可入藥。

Althaea officinalis *L.*

Tilia Miqueliana *Maxim.*

田麻科

菩提樹產於日本者。與我國種類不同。此為落葉樹。高丈餘。葉互生。為不等邊之心臟形。有鋸齒。背面密生白色之毛。花序生於葉狀細長苞中。花淡黃白色。

栽培於庭園。為觀賞用。莖之皮部。可採取纖維。

錦葵科

亞爾答亞(拉)

亞爾答亞。歐羅巴及亞細亞北部產之。為多年生草。全部有粗毛。葉為卵形。或心臟形。三裂。花大。淡紅色。集生於葉腋。根可入藥。內用於呼吸器病。為鎮咳之劑。

Corchorus capsularis *L.*

Tilia cordata *Mill.*
var. japonica *Miq.*

科木（日）　田麻科

科木者。自生於山地之落葉樹。高二三丈。葉為心臟形而尖。有鋸齒。以長柄互生。花黃白色。有香氣。花枝出於細葉狀苞之中央。

材為器具及薪炭料。樹皮可作繩絲等。

黃麻（漢）　田麻科

黃麻。多產於北地。今江浙亦有植之者。為一年生草。高五六尺。葉互生。為長卵形。端尖。花生於葉腋。黃色五瓣而小。

剝莖之皮。取其纖維。可製繩袋及地毡等用。

Malva sylvestris L.

錦葵。為歐洲原產之越年生草。或多年生草。高二三尺。葉淺裂為掌狀。有長柄。互生。花淡紫色。瓣有深紫色線紋數條。栽培之為觀賞用。

Althaea rosea Cav.

錦葵科

蜀葵（漢）

蜀葵。自生於歐羅巴之東南部。為越年生草。高五六尺。葉互生。畧似心臟形。五裂至七裂。花大。梗短。有紅紫白等色。亦有重瓣者。頗美麗。栽培之為觀賞用。

Abutilon Theophrasti *Medic.*

Abutilon megapotamicum
St. Hil. et Naud.

苘麻（漢）　錦葵科

苘麻。一作蕳麻。即白麻。田園栽植之。為一年生草。高五六尺。葉圓。為心臟形。端尖。有長柄。花小。色黃。生於葉腋。果實由多數輪生之雌蕊而成。熟則乾燥裂開。子扁黑。莖輕虛潔白。採其纖維。可作繩。亦織為布。類於麻絲。但其質脆弱。根及子俱入藥。

阿不起羅米格哀波塔米苦母（拉）　錦葵科

熱帶原產之小灌木。高三四尺。葉長卵形。端甚尖。花色紅而美麗。雄蕊及雌蕊甚長。俱突出於花冠之外。栽培之為觀賞用。

Hibiscus coccineus *Walt.*

Hibiscus syriacus *L.*

木槿。栽培於庭園。為落葉灌木。高七八尺。葉互生。為卵形。三裂。花開於夏秋之交。有紫紅白等色之瓣。朝開暮落。人家多種之。以為藩籬。或觀賞用。莖之內皮可取纖維。閩之汀洲人。取其花拌麪煎食。因呼為麪花。

紅葉葵(日)　錦葵科

紅葉葵。北美原產之多年生草。高六七尺。葉互生。深裂為掌狀。具長柄。花有紅色之大瓣五。栽培之為觀賞用。

Hibiscus mutabilis L.

Hibiscus Manihot L.

黃蜀葵(漢)　錦葵科

黃蜀葵。俗名秋葵。栽培於園圃。為越年生草。高三四尺。有肥大之長根。葉互生。深裂成掌狀。花大如盌。五瓣。黃色。結實如姆指大。長二寸許。熟則色黑。栽培之為觀賞用。又其根之粘液。可供製紙之糊料。

木芙蓉(漢)　錦葵科

木芙蓉。我國原產之落葉灌木。高三四尺。葉淺裂成掌狀。長柄。互生。花大。生於葉腋。花冠美麗。有紅白等色。栽培之為觀賞用。取樹皮之纖維。可作蓑衣。

Ceiba pentandra *Gaertn.*

Sterculia platanifolia *L.*

木棉產於閩廣熱地。為常綠樹。高者七八丈。莖帶刺葉為掌狀複葉。由五小葉而成。花白色。結長形之實。中有白色軟毛。隨風飛散。狀如柳絮。

木棉可作裀褥。不能紡織。

梧桐（漢）青桐（日）　梧桐科

梧桐。栽培於庭園中。為落葉喬木。高三丈許。幹枝色綠。葉濶大。掌狀。互生。背有毛。花小黃色。單性。雌雄同株。果為膏葖。熟則裂開為葉狀。緣部附有種子。

栽培之為觀賞用。其材可製器具。子可食。樹皮可取油。含多量粘液。富於收斂性。

Gossypium herbaceum *L.*

Adansonia digitata *L.*

草棉（漢）　錦葵科

草棉。原產於印度。唐時始入中國。一年生草。高二三尺。葉分裂成掌狀。長柄。互生。花黃色。五瓣。實為裂果。種子外被白色長毛。俗呼為棉花。

草棉為織物之大宗。子可榨油。供燈及他用。其渣滓搗成花餅。為飼牛及肥田之料。

拔惡拔勃（曰）　木棉科

熱帶非洲原產之常綠樹。高六丈餘。幹之直徑約二丈五尺。葉掌狀。花大。色白。每葉腋生一花。結實細長。質似蒲蘆之果。果皮可為水及酒等之容器。果實之髓。味美可食。樹皮纖維可作織物。嫩葉可食。長成之葉可葺屋。樹皮入藥。為解熱劑。此樹壽命最長。可

Eurya ochnacea *Szysz.*

Actinidia polygama *Miq.*

木天蓼山野自生蔓狀之落葉灌木葉互生楕圓形而尖恒變為白色花開於五六月五瓣色白畧似梅花故有夏梅之名實大如指頭而尖

果實可生食亦可以鹽漬之味辛嫩葉並供食用材之構造及效用同獼猴桃莖可供束物此植物甚為猫所喜玩亦所喜食

山茶科

楊桐（漢）榊（日）

楊桐自生於暖地又栽培於庭園為常綠樹高三丈餘葉全邊質厚有光澤互生花色白而小五六月始開萼瓣俱五片雄蕊多數雌蕊一體實為球形熟則變為黑色含濃紫色之汁液

有細葉長葉圓葉等種類日本古來植之於神社採其枝以供於神前或懸白紙於枝稱為玉串用以祭神故名為榊

Theobroma Cacao *L.*

加加阿木(旦)考考凹木(旦)喬考來島木(旦)梧桐科加加阿木自生於美洲熱帶他熱帶亦栽培之為常綠樹高一丈餘葉橢圓形而尖花赤色果實亦橢圓形長三寸餘有肉質果皮含多數種子炒去種皮碎仁為粉末加同量砂糖及少量巴尼拉黃色素稱喬考來島以之製菓子可溶於湯為飲料炒種子全部或仁為粉末稱考考凹可加白糖牛乳澱粉等亦溶於湯為飲料

Actinidia arguta *Pl.*

獼猴桃科

獼猴桃(漢)

獼猴桃山地自生為蔓生落葉灌木葉互生橢圓形或心臟形而尖質堅有光澤花開於五六月瓣色白藥帶黑色果實橢圓形熟則多汁味甘酸

果實可生食樹皮可綯為繩而用以繫筏切其莖以滴出之樹液飲之可止渴材有多數

Stewartia pseudocamellia *Maxim.*

Thea japonica *Nois.*

山茶產於南方各省雲南尤著名常綠喬木也高二丈餘。葉平滑無毛。葉長橢圓形。端尖質厚有光澤。花大而美麗。自十月開至二月。子房平滑。

變種甚多。花有大小紅白斑單瓣重瓣之別。日本稱為名花。輸出於歐美諸國。為觀賞用。材為挽物細工原料。及農具工具之柄。子可榨油。為食點燈防銹理髮及製漆油等用。

夏椿（日）　山茶科

夏椿。自生於山地。為落葉樹。高約二丈樹皮平滑。赤褐色。葉互生。為橢圓形。花開於六月。色白。似山茶。故有夏椿之名。萼具細毛。存於果實基部。不隨花脫落。實如珠而頂尖。熟則裂開。散布種子。

栽培於庭園。為觀賞用。其材堅實。可為農具工具之柄。或為挽物細工原料。

Thea Sasanqua *Nois.*

Thea sinensis *L.*

山茶科

茶梅（漢）

茶梅。暖地自產之常綠樹。諸部之形。雖似山茶。而幼莖及子房。皆密生毛。且葉小。花美麗。開於十一月之間。

變種甚多。其花有淡紅白斑。及單瓣重瓣等之別。材及種子油之効用。概同於山茶。

山茶科

茶名（漢）

茶。亦稱茗。江淮以南諸省皆產之。為常綠灌木。高五六尺。葉長橢圓形。有鋸齒。花開於九十月。色白有梗。果實扁圓。三稜形。熟則裂開。現出種子。

葉可煮為飲料。種類不一。製法亦異。大



Thonabo japonica *Szysz.*

厚皮香。自生於暖地。為常綠樹。高二三丈。葉全邊。質厚。長二寸餘。互生於枝梢。花白色。有長梗。實小。為球形。冰存夢。至冬成熟。果皮甚厚。色紅。裂開則種子外露。

栽培於庭園。為觀賞用。材堅緻。可為梳櫛及文房具床柱等。或為鏤作原料。樹皮為茶褐色染料。

Hypericum erectum *Thunb.*

金絲桃科

小連翹（漢）

小連翹。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉為長卵形。無柄而對生。有黑小點。花黃色五瓣。瓣具黑色小點。雄蕊數個。分為三束。

採其上部。可為金創及打傷之藥。

Eurya japonica *Thunb.*

柃（日）　山茶科

柃者。山野自生之常綠樹。高丈餘。葉卵形。或倒卵形。有鋸齒。緣邊不外反。花小。紫白色。單性。雌雄異株。果實黑色。為球形。變種有圓葉長葉細葉斑葉及果實白色等之別。可代用為楊桐。供於神前。木灰汁為染物之媒料。日本九州名之為灰汁柴。其材可為細小工用。

Stewartia monadelpha *S. et Z.*

小夏椿（日）　山茶科

小夏椿。山地自生之落葉喬木。高三丈。樹皮平滑。赤褐色。各部頗類夏椿。惟葉及花果皆小。其葉為楕圓形。互生。花開於五六月間。色白。花梗上部。對生二大苞。植於庭園。供觀賞。材為床柱及裝物細工原料。又製為木炭。最適於磨染器之

Hypericum Ascyron *L.*

Mesua ferrea *L.*

鐵刀木。為東印度原產之平滑大木。有直立之幹。葉對生。為狹披針形。質厚有光澤。花大。白色。四瓣。有多數之雄蕊。材以其質堅著名。當以其香氣強烈而賞用之。

巴草（日）　金絲桃科

巴草者。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉對生。廣披針形。無葉柄。花大。有黃色之五花瓣。具五色雄蕊。甚為美麗。栽培之為觀賞用。

Hypericum patulum *Thunb.*

Garcinia morella *Desv.*

金絲梅（海）　金絲桃科

金絲梅。山地自生。又栽培於庭園。為小灌木。高三四尺。類金絲桃。然金絲桃葉無腺點。雄蕊長。花柱末端分離。此則葉有腺點。雄蕊短。花柱離生。以此別之。其花色黃。果實裂開。散多數種子。供觀賞用。

藤黃海藤（漢）　金絲桃科

藤黃。即海藤。產東印度及暹羅等處。為落葉喬木。高五六丈。葉對生。橢圓形。花單性。結漿果。

以刀斫樹皮。浸水中。滲出黃色樹脂。即稱藤黃。可入藥。並用為繪具顏料。然有毒。著色於食品。足以致死。繪畫時如口吮其筆。則舌腐爛。

Dryobalanops camphora *Colebr.*



Shorea robusta *Roxb.*

婆羅樹。東印度原產之喬木。高十餘丈。葉平滑。長卵形。端尖。花有淡黃花瓣。排列為圓錐花序。

材為建築及器具料。在東印度為次於起苦樹之重要植物。又樹脂為澄青之代用。

龍腦香科

龍腦（漢）

龍腦一名龍腦香。產於閩廣及婆羅洲蘇門答臘等處。為常綠喬木。高十餘丈。葉卵形。全邊而尖。有托葉。花有佳香。萼生長於花後。果實含一種子。

取龍腦之結晶。供於藥用。謂之冰片。又曰梅片。吾國甚貴重之。

Garcinia mangostana L.

Hypericum chinense L.

金絲桃科

金絲桃(漢)

金絲桃栽培於庭園。為小灌木。高三四尺。以一株而叢生多數。細莖葉對生。長橢圓形。全邊無柄。花濃黃色。雄蕊多數。數花并如金絲。然其基部合着為五體。雌蕊為一體。具五柱頭。實為裂果。裂則散出多數種子。

觀賞用之植物。

金絲桃科

嗎恩孤斯他恩(拉)

此植物為麻拉格原產之常綠樹。高約二丈。葉卵形。長約六寸許。花似薔薇。每朵單生於花軸。實為球形。徑約三寸。果肉富於汁液。有芳香味美。

此為美味果實中之一。絕無有害成分。不論如何病者皆可食之。又形態甚美。足供觀賞。

Viola Patrinii *DC.* var. typica *Maxim.*

白花菫(日)

白花菫自生於山野。為多年生草。高三四寸。葉長卵形。或長楕圓形。有長柄。叢生。花莖生於葉叢中間。莖端著一花。有白色不整齊之瓣五。其一瓣特生長距。近似於紫花地丁。而花色白。

菫菜科

栽培之供觀賞用。

Viola tricolor *L.*

三色菫者。歐洲原產之草本植物。高七八寸。葉有托。托復分裂為羽狀。花通常有三色之瓣。

變種甚多。栽培之為觀賞用。

iola hirta *L.* var. japonica *Maxim.*

Tamarix chinensis *Lour*

御柳檉柳(漢)紅荊條(俗)　檉柳科

御柳。即檉柳。一名觀音柳。又俗稱西湖柳。為落葉亞喬木。高丈餘。枝細長。密生小鱗狀之葉。夏月由枝梢出花軸。著淡紅色小花。至秋又開。其特性然也。栽培之為觀賞用。

葵菫(日)　菫菜科

葵菫者。自生於山野之多年生草。葉圓。為心臟形。密生細毛。有長柄。花分二種。一紫青色。開於地上。一在地中不開而結果實。栽培之供觀賞用。

Viola odorata L.

Viola verecunda A. Gr.

菫菜一名旱芹。山野自生之雜草。莖細長。匍匐於地上。葉為圓心臟形。有長柄。柄之基部。具細小不分裂之托葉。花白色。略帶青紫。五瓣不整齊。中一瓣有短距。莖葉味苦。淪之則甘而滑。可充蔬食。

菫菜科

匂菫(日)

匂菫。歐洲原產之多年生草。葉呈圓心臟形。叢生於根狀之莖。花有青白等色。時吐芳香。

栽培之為觀賞用。其花可製香水。浸出之汁。又可代用於里篤麻斯液。

Viola silvestris *Kit.*
var. grypoceras *A. Gr.*

Viola Patrinii *DC.*
var. chinensis *Ging.*

紫花地丁(漢)菫(日)　菫菜科

紫花地丁。自生於山野。為多年生草。高三四寸。葉長卵形。或長橢圓形。有長柄叢生。花莖生於葉叢中。頂著一花。花青紫色。有不整齊之五花瓣。中一瓣有長距。人家多栽之。供觀賞用。

立壺菫(日)　菫菜科

立壺菫。自生於山野。為多年生草。莖匍匐於地上。葉為圓心臟形。有鋸齒。分裂為羽狀之托葉。花青紫色。有不整齊之五花瓣。而一瓣具細長之距。

Begonia Evansiana *Andr.*



Carica papaya *L.*

蕃瓜樹產於熱帶之落葉喬木高二丈餘葉大分裂成掌狀果實多汁形似甜瓜實可食用汁葉為驅蟲及防腐劑全部含乳狀液有變化蛋白質為百弗啲之作用未熟之果實中其汁液之作用力更強故以此汁液煮肉類能使其肉易於柔軟

秋海棠科

秋海棠(漢)

秋海棠栽培於庭園為多年生草莖色微紅高二尺餘葉為心臟形而尖中肋之兩側成不等形花單性色粉紅雌雄同株供觀賞用莖有酸味

Stachyurus praecox *S.et Z.*

Idesia polycarpa *Maxim.*

椅科　椅(漢)

椅自生於山野。又栽培於庭園。為落葉喬木。高約二丈餘。葉為心臟形。緣邊有鋸齒。花由枝頭出軸。著生數十朵。雌雄異株。實為球形。色赤。纍纍下垂。似南天竹落葉後。珠呈美觀。

材可為細巧之器。

旌節花科　旌節花(漢)

旌節花。山地自生之落葉灌木。高丈許。葉橢圓形而尖。有鋸齒。花軸二三寸。簇生短花梗。花開於未出葉之先。花瓣黃色。果實球形。熟則現黑色。

此物多移植於庭園。而山間則又多用

Daphne pseudo-mezereum *A.Gr.*

夏坊主者山野自生之小灌木高三尺餘葉至冬季著生於莖夏至則脫落花淡綠白色狀似瑞香果實橢圓形色赤而美麗栽培之為觀賞用樹皮之纖維可為紙料又含有毒成分

Wikstroemia sikokiana *Fr.et Sav.*

瑞香科

雁皮(日)

雁皮我國謂之密蒙花產於日本暖地為落葉灌木高者一丈五尺葉卵形有毛互生花小集生於莖之頂端有四裂之花冠狀萼萼之裂片呈黃色其筒部為白色密生毛

樹皮纖維為製紙原料日本之薄葉紙即考卑紙純以此皮製之

Epiphyllum truncatum *Haw.*

Cereus multiplex *Pfeiff.*

開來吳司麻路題捕來可司(拉)仙人頭(中俗)　仙人掌科

美洲中央原產之多年生植物。莖色綠。稍圓形。通常有十三縱行。稜稜上叢生針。花淡紅色。生於莖之側面。

栽培之為觀賞用。

蟹仙人掌(日)　仙人掌科

蟹仙人掌。勃拉日魯原產之多年生植物。枝扁平色綠。呈葉狀。頂開淡紅色之大花。

栽培之為觀賞用。

Daphne Genkwa S. et Z.

Daphne odora Thunb.

瑞香。我國原產常綠之小灌木。高四五尺。枝葉繁茂。葉長橢圓形。質厚有光澤。花紅紫色或白色。為合片萼。頗美麗。香氣清遠。栽培於庭園。供觀賞用。

瑞香科

芫花(漢)

芫花。栽培於庭園之落葉灌木。高三四尺。葉橢圓形。全邊而小。花具紫筒狀之萼。節密生。開於葉未發之前。

性有毒。漁者煮之以投水中。魚死而浮出。故又名毒魚。入藥為消痰去水之劑。



Wikstroemia Ganpi *Mazim.*

Aquilaria Agallocha *Roxb.*

沉香(漢)伽羅(日)　瑞香科

沉香。產於東印度。為常綠亞喬木。高數丈。葉為披針形。或倒披針形。互生。花色白。排列為纖形花序。

材可為香料。最著名。

小雁皮。犬雁皮(日)　瑞香科

小雁皮。山野自生。落葉之小灌木。高二三尺。葉為卵形。而互生。花小。有紅色之筒狀萼。

樹皮為紙料。

Elaeagnus pungens *Thunb.*

Elaeagnus longipes *A. Gr.*

木半夏。自生於山野。為落葉灌木。高八九尺。葉長橢圓形。或長卵形。密生銀色之鱗花。具白色之合片萼。每一葉腋只生一花。有長梗。實為漿果。赤色橢圓形。果實味甘酸微澁。可食。

胡頹子（漢）　胡頹子科

胡頹子。栽培於庭園。為常綠灌木。高丈餘。葉橢圓形。厚而深綠。背密生褐色及銀色之鱗。緣邊波狀。花有白色之合片。萼實為長橢圓形。色赤。

栽培之供觀賞用。果實可食。

Edgeworthia chrysantha *Lindl.*

結香黃瑞香(漢)三股(日)　瑞香科

結香自生於希馬拉亞山。我國各處亦栽培之。為落葉小灌木。高六七尺。莖通常為三叉狀分枝。葉互生。呈廣披針形。花有黃筒狀萼。排列為頭狀花序。枝柔韌可綰結。故以為名。

莖皮之纖維可製紙。

Elaeagnus umbellata *Thunb.*

秋胡頹子(日)　胡頹子科

秋胡頹子。山野自生之落葉樹。高丈餘。葉呈卵形。有淡褐銀色之細鱗。幼莖亦具此細鱗。花小。白色。集生於葉腋。果實畧成球形。色亦其細鱗亦銀色。

實可供食用。

Punica Granatum L.

安石榴。地中海沿岸原產之落葉灌木。高八九尺。葉平滑。為長橢圓形。花有赤萼及深紅色之瓣。果實為球形。熟則裂開。現紅肉之種子。

子之肉可食。根皮為驅蟲藥。變種甚多。栽培之為觀賞用。

Rhizophom mucronata *Lam.*

紅樹科

嗎恩古羅布（曰）

嗎恩古羅布。自生於東印度。及其他熱帶之海岸。為常綠樹。葉橢圓形或卵形。有微凸頭。質厚有光澤。花瓣有毛而短於萼。列成聚繖花序。種子於果實未脫落時。即發芽而突出其幼根。

此樹生於海岸潮流平滿時。觀之如海中森林。因此著名。

Lagerstroemia indica *L.*

紫薇百日紅(漢)　千屈菜科

紫薇。為東印度原產之落葉樹。高丈餘。莖皮平滑。葉對生或互生。卵形或橢圓形。花紫紅色或白色。瓣多皺褶。夏日始開。秋季方罷。故又名百日紅。

栽培之為觀賞用。

Lythrum virgatum *L.*

千屈菜(漢)　千屈菜科

千屈菜。自生於山野。為多年生草。生於淺水或濕地。高二三尺。葉對生。為披針形。花簇生於葉腋。有淡紅之花瓣。

栽培之為觀賞用。又用之於佛事。

Jambosa Caryophyllus *Ndz.*

此為模拉哈原產之常綠樹高二丈餘葉對生呈長橢圓形全邊花有淡紅花瓣數朵叢生

花芽可為芳香性調味藥蒸餾之可製揮發油即丁香油是也治齒痛有特效附於他物生芳香

Rhodomyrtus tomentosa *Wight.*

桃金孃科

桃金孃（漢）

桃金孃為栽培常綠灌木葉對生呈橢圓形質厚花有淡紅花瓣具下生子房觀賞用

Quisqualis indica *L.*

使君子科

使君子(漢)

使君子。自生於山野及水岸。閩蜀多栽培之。為常綠木本之蔓生植物。長約二丈。葉卵形。對生。花軸出於莖之頂端及葉腋。簇生成穗狀。實長寸許。有稜。老則紫黑。為兒科聖藥。俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此藥。後醫家因號為使君子也。

Melaleuca leucadendron *L.*

桃金孃科

加耶布的(日)

加耶布的。產於東印度及馬來隅等處。為常綠樹。高約一丈五尺。葉互生。為披針形。花白。排列為穗狀花序。取新葉及枝而蒸餾之。則得油。即稱為加耶布的油。用於興奮藥及驅蟲劑。

Epilobium parviflorum *Fr. et Sav.*

柳葉菜（漢赤花）（日）　柳葉菜科

柳葉菜為山野水邊自生之多年生草高約二尺葉有鋸齒呈卵形無柄對生帶紫赤色花有甚長之下生子房及呈淡紅色之四花瓣實為乾果熟則開裂析出種子子頂有長毛易為風吹散

Eucalyptus globulus *Lab.*

此樹為濠洲東南部原產之常綠喬木高約三十丈葉有小點呈卵形或披針形全邊花生於上部葉腋具多數雄蕊

此樹生長甚速吸收地中水分甚多能乾燥富於病原之潮濕地故熱地廣栽之樹皮及葉可用為間歇熱之解熱劑採新生葉蒸餾之可製揮發油用於殺菌劑及香水原料木材有堅實耐久性適於建築

Jambosa vulgaris *DC.*

Psidium guajava *Rudd.*

蕃石榴（漢）　桃金孃科

蕃石榴原產熱帶亞美利加常綠樹也葉對生葉橢圓形結黃色漿果形如倒卵果實味美供食用或栽植以作觀賞

蒲桃（漢）　桃金孃科

蒲桃為東印度原產常綠樹也高二丈五尺葉為披針形有光澤對生花大而白具長雄蕊果類林檎實供食用又栽培之以為觀賞

Trapa natans L.

uchsia macrostemma Ruiz. et Pav.

夫苦席阿原產智利為灌木狀植物高約三尺葉長卵形平滑緣有鋸齒花美麗下垂萼色白者花冠呈赤色或紫色反之萼赤色或紫色者花冠呈白色

供觀賞用

菱　芰實（漢）　柳葉菜科

菱為水生植物莖及細裂根狀之藁漂流水中葉菱形有鋸齒浮於水面花白色四瓣單生於葉腋實為堅閉果具角狀突起

種供食用

Oenothera biennis *L.*
var. Lamarckiana *Ser.*

Epilobium japonicum *Hassk.*

岩柳葉菜（日）　柳葉菜科

自生於山地濕地。為多年生草。高達二三尺。葉細長或長橢圓形。對生。花及果實酷似柳葉菜。

月見草（日）　柳葉菜科

月見草。為北亞美利加原產之一年生草。或越年生草。高達三四尺。葉互生。為長卵形。花大。有黃色四花瓣。日沒時開之。栽之以供觀賞。

Aralia cordata *Thunb.*

Acanthopanax spinosum *Miq.*

五加科

自生於山地。為落葉灌木。有刺。高達六七尺。葉呈掌狀複葉。由五枚無柄小葉而成。花小而白。列為繖形花序。幼葉供食用。栽植之用作籬籬。莖皮可供藥用。

五加科

土當歸（漢）

土當歸山地自生。多年生草。高五六尺。葉大。為二回羽狀複葉。由楕圓形小葉而成。小葉端尖。花小而色白。列為繖形花序。由五雄蕊結合。具花柱五。幼莖及葉皆供食用。根入藥。

Haloragis micrantha *R. Br.*

Oenothera odorata *Jacq.*

待霄草（日）　柳葉菜科

待霄草。為南美原產之草本植物。高達二三尺。葉呈披針形。有粗鋸齒。花大。有黃花。至開於夕刻。觀賞用。

蟻塔草　蟻塔草科

蟻塔草。為山野自生之多年生草。高約五六寸。葉小。作楕圓形或卵形。有鋸齒。對生。花小。呈黃褐色。下向散生於長花軸。

Aralia sinensis *L.*

楤木。自生於山野。為落葉樹。高丈餘。莖葉有銳刺。葉為二回羽狀複葉。由多數卵形小葉而成。花小色白。排列為圓錐花序。幼葉供食用。木材為小器具及木筏料。

Amlia papyrifera *Hook.*

通脫木　通草（漢）　五加科

通脫木。為產於暖地之木本植物。莖實軟。含白色大髓。葉分裂如掌狀。具長柄。叢生於莖之上部。花器似土當歸。將莖髓作薄片。可代紙用。或以之製裝飾品。入藥為利尿劑。

Dendropanax japonicum *Seem.*

隱蔓、甜醬蓋唐三手、三手、(日)五加科
自生於日本暖地、為常綠灌木、高二丈餘、葉呈卵形而厚、多三裂、花小而色綠、排列為繖形花序、
供觀賞用、

Ainslinea apiculata *Sch. Bip.*

常春藤(漢)　五加科
常春藤、山野自生、蔓生之常綠樹也、常以小氣根攀緣他物而生、葉為卵形、全邊或分裂為掌狀、花小而色黃綠、排列為繖形花序、
供觀賞用、又為發汗劑、

Acanthopanax ricinifolium *S. et Z.*

Helwingia ruscifloru *Willd.*

青英葉。自生於山野。為落葉灌木。高達七八尺。木分雌雄。葉為楕圓形。有鋸齒。花開於葉面中部。作淡綠色。雄花有四花瓣及四雄蕊。雌花亦有四花瓣。但又有四柱頭之雌蕊。花後結黑色果實。春季取幼葉以供食用。

刺楸（漢）　五加科

刺楸。自生於山野。為落葉樹。高達數十尺。莖有刺。葉互生。分裂如掌狀。有長葉柄。花呈小形。作黃白色。排列為繖形。材作小細工船具及木履之用。幼葉可食。

Panax ginseng *C. A. Mey.*

人參(漢)　五加科

原產我國北部及朝鮮與北美。為多年生草。根形畧似人體。葉為掌狀複葉。與七葉樹葉相似。花小似五加花。根為東洋著名藥品。能回復身體及神經疲勞。且有健胃之力。但西醫謂其根

Aralia repens *Matsum.*

土參(漢)　五加科

山地自生。多年生草。高二尺餘。地下有根狀莖。形與竹類之根狀莖相似。葉為掌狀複葉。似七葉樹之葉。花小而白。排列為繖形花序。

根狀莖供藥用

Seseli Libanotis *Koch.*

Ferula asa foetida *L.*

阿魏（波斯）

阿魏為波斯阿富汗原產多年生草本高約二三尺葉類胡蘿蔔葉花小色黃相聚為複繖形花序

此草被傷時浸出其乳液乾燥之可為驅風藥祛痰藥及通經藥等

邪蒿（漢）

繖形科

邪蒿為自生於山野之雜草高二三尺葉為二回羽狀複葉下部小葉分裂為羽狀花白而形小排列為複繖形花序

Dorema ammoniacum *Don.*

Fatsia japonica *Dene. et Plane.*

八角金盤（漢）　五加科

八角金盤。自生於山野暖地。為常綠灌木。高可七八尺。葉分裂成掌狀。以長葉柄而互生。質厚有光。花小色白。排列為繖形花序。

有毒。祇可觀賞。

安母尼亞屈謨（拉）　繖形科

安母尼亞屈謨。為波斯原產之多年生草。高七八尺。葉狀如羽。生於莖之上部。花小而色白。且為圓繖形花序。

從此草採得之脂稱為安母尼亞屈謨。可作祛痰藥。並可加於藥膏中。

Apium graveolens *L.*

Carum Petroselinum *Benth.*

荷蘭芹。為歐洲原產之二年生草。有芳香。高及二尺餘。葉為重複葉。由三裂之小葉而成。花小色白。排列為複繖形花序。幼葉及根。可供食用。

荷蘭鴨兒芹（日）　繖形科

荷蘭鴨兒芹。歐洲原產之二年生草。亦香氣甚強。高二尺餘。葉為羽狀複葉。由三裂小葉而成。花小色白。排列為複繖形花序。其幼葉及多肉之根。皆供食用。

Foeniculum officinale *All.*

Sanicula sinensis *Bge.*

繖形科

茴香（漢）

茴香為地中海沿岸原產之多年生草高及五六尺葉大有細裂成絲狀裂片花小色黃排列為複繖形花序實為乾果香氣甚強

果為健胃藥驅風藥又為香味料能附香氣於食物幼莖及葉皆可食用

繖形科

變豆菜（漢）

變豆菜山野自生多年生草高二三尺葉深三裂呈掌狀兩側裂片通常再分二裂花小數枚簇生

其根與莖皆有利尿之効

Hydrocotyle rotundifolia *Roxb.*

Chamaele tenera *Miq.*

繖形科

此草為自生於陰地之雜草高約一尺葉為重複葉畧似水芹葉花莖生於葉叢間莖頂著花形小色白排列為複繖形花序

繖形科

血止草（日）

血止草山野自生為多年生草莖細長莫延葉有長柄葉身為圓心臟形淺裂成掌狀花小色白排列畧為頭狀之繖形花序

Oenanthe stolonifera DC.

Coriandrum sativum L.

胡荽（漢）　繖形科

胡荽。為地中海沿岸自生之一年生草。高二尺餘。葉為羽狀複葉。細裂且互生。花小。排列為繖形花序。周圍之花大。花瓣色白。不整齊。果圓形無翅。實可為香味料。又供藥用。

水芹　水斬（漢）　繖形科

自生於水田濕地。為多年生草。有特殊香氣。具匍匐莖。葉互生。為二回羽狀複葉。花小色白。排列為複繖形花序。無論自生者或栽培者。皆可食用。



Daucus carota *L.*

胡蘿蔔。為歐羅巴原產之越年生草。高達四五尺。根赤色。為長大肉質。葉為重複葉。有長葉柄。花小色白。排列為複繖形花序。根及幼葉。皆供食用。

Phellopterus littoralis *Fr. Schm.*

濱防風　八百屋防風（目）繖形科

濱防風。為自生於海濱之草本。高達尺餘。葉互生。為複葉。花小色白。排列複繖形花序。此草有特殊香氣。且具辛味。其幼葉供食用。

Cicuta virosa L.

毒芹（曰）繖形科

毒芹自生於濕地或淺水間草本高達三四尺地下莖中空有節稍類竹葉為二回或三回之羽狀複葉畧似水芹葉花小色白排列為複繖形花序有毒之植物也

Conium maculatum L.

毒人參（曰）毒蘿蔔（曰）繖形科

毒人參原產歐洲為越年生草高三尺餘葉為重複葉由分裂如羽狀之小葉而成花小色白排列為複繖形花序為有毒植物

Marlea platanifolia *S. et Z.*

瓜木。山地自生。為落葉樹。高及丈餘。葉似梧桐。葉。花白色。花瓣向外反卷。



Cornus ignorata *C. Koch.*

考阿奴司依古撓拉他（拉）山茱萸科此為自生山野之落葉樹。高達丈餘。葉為長卵形而尖。對生。花小色白。排列為聚繖花序。

材作薪炭。亦可製器具。裁之可供觀賞用。

Aucuba japonica *Thunb.*

Cryptotaenia japonica *Hassk.*

繖形科

鴨兒芹(漢)三葉芹

鴨兒芹山野自生多年生草高二三尺葉為複葉成於三枚小葉互生下部之葉具長柄花小色白排列為繖形花序全部供食用

山茱萸科

桃葉珊瑚(漢)青木(日)

桃葉珊瑚山地自生之常綠灌木也高達五六尺葉呈長橢圓形先端尖銳有鋸齒長達五六寸花為單性花雌雄生於異株實呈橢圓形色赤而美麗此木為觀賞用日本及歐美諸國多栽

Pirola elliptica *Nutt.*

Monotropa uniflora *L.*

鹿蹄草自生於山野陰地多年生之常綠草也葉為楕圓形有長葉柄由地下部叢生花莖生自葉叢中央長七八寸上部生數花花白色向下

現供觀賞但昔時用為止血及愈創等之收斂藥

水晶蘭（漢）　鹿蹄草科

水晶蘭自生於山地為白色平滑之寄生植物高達四五寸葉為鱗片狀互生於莖花單生於莖之頂端稍稍傾斜

Cornus officinalis S. et Z.

Clethra barbinervis S. et Z.

山茱萸科　山茱萸(漢)

山茱萸。常栽培於庭園。為落葉樹。高達丈餘。葉對生。為卵形而尖。未葉先花。花為黃色小形。數朵集生。果赤色。作長楕圓形。味甘酸。為觀賞用植物。果為強壯劑。供藥用。

令法科　令法(日)

山地自生。為落葉樹。高達丈餘。葉互生。為楕圓形或倒卵形。有鋸齒。花為小形白色。排列為總狀花序。材可作床柱挽物細工及薪炭料。幼葉可食。

Epigaea asiatica *Maxim.*

Andromeda japonica *Thunb*

梫木。為山地自生常綠樹。高約二丈。葉長卵形而尖。花白色。呈壺狀。排列為總狀花序。開於早春。

栽於庭園。供觀賞用。材作挽物細工。性劇毒。以葉煎汁。可作殺蟲藥。

岩梨（日）

石南科

岩梨。山地自生。為常綠小灌木。高二三寸至五六寸。葉為卵形。緣邊及中肋生褐色刺毛。花小。色紅。有如筒狀之花冠。果為肉質。作小球形。有強酸味。果供食用。

Gaultheria adenothrix *Maxim.*

格吳路梯里亞阿帶抗陶里茲拉石南科
此為山野自生之常綠小灌木高四五寸
至一尺葉與莖皆帶赤色葉呈卵形互生
果實色赤肉部由萼生成
實供食用

Vaccinium japonicum *Miq.*

巴苦喜牛姆加波你苦謨拉石南科
此為山地自生之落葉灌木高約四五尺
葉為卵形互生花帶赤色有五裂花冠花
冠裂片頗長實為漿果
果供食用

Rhododendron quinquefolium *Bisset Mre.*

Rhododendron indicum *Sw.* var. obtusum *Maxim.*

石巖爲自生於山地之灌木。通常高四五尺。葉爲長倒卵形。互生。花有紅色合瓣花冠。

供觀賞用。

石南科

五葉山躑躅（日）

五葉山躑躅者乃山地自生之灌木。高八九尺。葉爲楕圓形。每五枚簇生。花有白色合瓣花冠。

供觀賞用。



Arctostaphylos uva ursi *Spr.*

Leucothoe Keiskei *Miq.*

岩南天竹（日）　石南科

岩南天竹山地自生。為常綠灌木。高一二尺。葉為長卵形而厚。有光澤。花有筒狀之白花冠。

供觀賞用

烏華烏爾天（日）　石南科

烏華烏爾天北半球自生之常綠小灌木也。莖匍匐長及三尺餘。葉為全邊倒卵形。其質厚。花排列為短總狀花序。色白或淡紅。有壺狀花冠。

葉稱烏華烏爾天。葉為尿道諸病收斂

Rhododendron Metternichii *S. et Z.*

Rhododendron indicum *Sw.*
var. macranthum *Maxim.*

杜鵑花庭園多栽之為常綠灌木高達三四尺葉為橢圓形作深綠色有毛花白或作紫紅狀似山躑躅但此開於六月中栽培之為觀賞用

石南（漢）

石南科

石南為深山自生之常綠灌木高七八尺葉厚為長橢圓形下面成淡褐色花有淡紅色之合瓣花冠狀與山躑躅花相似觀賞用

Vaccinium Vitis-idaea L.

越橘（漢）　石南科

自生於亞細亞歐羅巴及北美之高山或寒地。為常綠小灌木。高達五六寸。葉為楕圓形或倒卵形。質與黃楊葉相似。花有淡紅色鐘狀合瓣花冠。排列為總狀花序。果如球形。為鮮紅漿果。直徑長二三分。果供食用。

Vaccinium Oxycoccos L.

蔓苔桃（日）　石南科

蔓苔桃。自生於高山濕地。為常綠多年生植物。莖細長蔓延。葉互生。形楕圓。其質頗厚。花小作淡紅色。有裂片外反之合瓣花冠。實為球形。乃赤色之漿果。也大如豌豆。實供食用。

Seluzecodon soldanelloides *S. et Z.*

Leucothoe Grayana *Maxim*

木蔂蘆。自生於山野。為落葉灌木。高達三四尺。葉互生。為卵形。花有白色壺狀合瓣花冠。排列為總狀花序。

為有毒植物。碎葉為粉。入鼻則發嚔。

岩鏡（日）　岩梅科

岩鏡。自生於深山。為多年生草。高三四寸。其葉生於地下部。為鈍頭心臟形。有長葉柄。上面有光。緣邊具齒。花莖由葉叢中央而生。上部開數花。花多淡紅色。白色者不多。鬼花冠上緣分裂為絲狀。

And romeda nana mat.

Enkianthus japonicus *Hook.*

咹克阿恩祖司。加保尼苦司。(拉)石南科

為栽培於庭園之落葉灌木。高七八尺。葉橢圓而尖。數枚叢生。花有白色壺狀向下之合瓣花冠。

栽之供觀賞用。葉至秋末。變為紅色。呈美觀。後乃脫落。

米葉拇櫻(日)　石南科

自生於高山。為常綠小灌木。高僅二三寸。葉小。呈橢圓形。三片輪生。花白。呈壺狀。生於枝頂。

觀賞用。

Lysimachia vulgaris *L.*

山地自生。為多年生草。高三四尺。葉為披針形。輪生或對生。花有黃色五裂合瓣花冠。排列為圓錐花序。

觀賞用。

Primula japonica *A. Gr.*

櫻草科

九輪草（日）

九輪草。自生於山中濕地。多年生草也。高二三尺。葉為長橢圓形。長六七寸。花之構造。似櫻草花。作赤紫白諸色。常數花輪生。成階梯形。

栽之以供觀賞。其汁液有刺激性。皮膚觸之即發腫。

Ardisia crenata *Sims.*

Ardisia japonica *Bl.*

砂砂根（漢）　紫金牛科

砂砂根。為生於深山中之常綠灌木。高二三尺至七八尺。葉互生。為長楕圓形。有鈍鋸齒。花小帶白色。果為赤色球形。殆與豌豆同大。觀賞用。根入藥。治咽喉腫痺。

紫金牛（漢）數柑子（日）　紫金牛科

紫金牛。自生於山野。為常綠小灌木。高自四五寸至八九寸。不等。葉互生。為長卵形。有鋸齒。花有白色。合瓣花冠。通常每二枚集生。果球形。色紅。觀賞用。

Lysimachia clthrodies *Duby*.

珍珠菜。山野自生。多年生草。莖高二三尺。葉互生。為長卵形或廣披針形。花白色。排列為總狀花序。花序畧呈尾狀。供觀賞用。

Pilaquium Gutta *Burck*.

「倭答百兜加樹（日）」　赤鐵科

倭答百兜加樹。為馬來半島原產之常綠喬木。有互生長倒卵形之葉。花小。每數朵叢生於葉腋間。其幹有乳狀液。取出乾之。稱倭答百兜加。可製器具。並可用以療病。

Primula cortusoides *L.*

Lysimachia japonica *Thunb.*

小茄（日）　櫻草科

小茄。為山野自生之雜草。高六七寸。斜卧於地上。葉對生。呈卵形。上部各葉腋各生一花。有黃色合瓣花冠。實為圓形。畧似茄果。

櫻草（日）　櫻草科

此為原野自生多年生之草。高六七寸。葉橢圓形。有長葉柄。叢生。花莖生於葉叢間。多數之花開於花莖上部。花各有梗。具紅紫色或白色花冠。

供觀賞用。其汁液有毒。能使皮膚發腫。

Diospyros Lotus *L.*

Styrax benzoin *Dryand.*

君遷子。自生於山地。為落葉樹。高達二丈餘。葉互生。為長橢圓形。花有淡黃色壺狀合瓣花冠。果為球形或橢圓形漿果。徑六七分。

材可為器具。人多用之。生果可取澁汁。熟供食用。

安息香（日）　齊墩果科

產於「史襪脫而來」「暹羅」等處。落葉樹也。葉為卵形而尖。花帶赤色。排列為總狀花序。將此樹幹部浸出樹脂。乾燥之。稱安息香。為祛痰藥。又可作薰香料及香油料。

Diospyros Kaki *L. f.*

Diospyros peregrina *Gürke.*

柿　柿（漢）　柿樹科

柿樹。我國多栽之。為落葉樹。高達二三丈。葉為橢圓形或卵形。且互生。花有黃色合瓣花冠。果為黃赤色漿果。形狀種種不同。果供食用。由澁柿取出之汁。可塗於紙及網等。材可作器具及裝飾品。樹心黑色部。名曰黑柿。用途最廣。

烏木（漢）　柿樹科

烏木。產於東印度及馬來半島。為常綠樹。高達二丈餘。葉互生。為長橢圓形。面平滑。花單性。有淡黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。果為球形。作赤黃色。直徑約一寸五分。其材色黑質堅且美麗。故器具多用之。果供食用。由未熟之果所採澁汁。可共金網及船具之用。



Fraxinus longicuspis S. et Z.

小葉梣。為山地自生之落葉樹。高達數十尺。葉為奇數羽狀複葉。通常由五枚或七枚之小葉而成。花排列為圓錐花序。色白。有倒披針形之四花瓣。

其材供器具薪炭之料。或栽培之為觀賞用。

Ligustrum Ibota Sieb.

水蠟樹（漢）　木犀科

水蠟樹。為自生山野之灌木。高約十四尺。葉橢圓形。全邊。對生。冬不脫。葉花色白而形小。排列為小圓錐花序。果為橢圓狀。色黑而小。

栽培之供觀賞用。由小蟲生於樹枝之白粉狀物。可製白蠟。

Halesia hispida *B.et H.*

Styrax japonica *S. et Z.*

齊墩果科

齊墩果(漢)

齊墩果為山野自生之落葉樹高約二丈葉為卵形互生花白色花梗頗長材可為傘橋種可榨油亦有栽於庭園中者

大葉白辛樹　毛白辛樹(日)齊墩果科

此為山地自生之落葉樹高約四丈葉大呈長卵形互生花白色與齊墩果花相似果為細長乾果全面密毛叢生供觀賞用材可製器具兼有作薪用者

Jasminum grandiflorum L.

Jasminum odoratissimum L.

素馨(漢)　木犀科

素馨原產東印度常綠灌木枝高達三四尺葉為羽狀複葉由五個乃至九個卵形小葉而成花有白色合瓣花冠排列為聚繖花序發芳香供觀賞用

黃素馨為麻的拉原產之常綠灌木枝有纏繞他物之性葉為複葉由三个乃至五个卵形小葉而成通常互生花排列為有限花序有黃色之合瓣花冠發芳香觀賞用

Ligustrum medium Fr.et Sav.

大葉水蠟樹（漢）　木犀科

大葉水蠟樹者原野自生之落葉樹也高達丈餘葉為卵形互生花小色白排列為圓錐花序果形小色黑果實有毒食之致死

Olea europaea L.

阿列布（日）　木犀科

阿列布為歐洲南部原產之常綠樹高約十五尺葉呈披針形或長橢圓形全邊淡綠色花小色白花冠四分實為核果含種子一果供食用又以之榨油稱阿列布油此油供食用藥用燈用及石鹼原料為葡

Osmanthus Aquifolium *B. et H.*

Osmanthus fragrans *Lour.*

木犀科

枸骨自生於我國暖地為常綠樹高達丈餘葉對生為卵形有銳鋸齒質厚有光花為小形白色每數朵生於葉腋材可為算珠櫛又栽培之以供觀賞

木犀科

木犀岩桂(漢)

木犀都栽培於庭園之常綠樹也高及丈餘葉對生呈長橢圓形而尖花叢生於葉腋有小形黃赤色之合瓣花冠發特殊芳香觀賞用

Ligustrum japonicum *Thunb.*

女貞（漢）　木犀科

女貞為山野自生之常綠樹。高約丈餘。葉為卵形。其質厚。畧似山茶葉。花有四裂白色。合瓣花冠。排列為圓錐花序。果實色黑。呈長橢圓形。炒其種子。作咖啡之代用品。又栽之以供觀賞用。

Fraxinus Bungeana *DC.* var. pubinervis *Wy.*

梣（漢）　木犀科

梣為山野自生之落葉樹。高二丈餘。葉為奇數羽狀複葉。由長橢圓形或長卵形大小之小葉而成。花小而有四細萼片。無花冠。實為翅果。材可作器具。又有植於路旁者。

Syringa vulgaris L.

紫丁香各地栽培之為落葉灌木葉高七八尺皮平滑節稍隆起葉呈心臟形無缺刻對生花為圓錐花序之代表呈紫白色四瓣狀如高盃萼呈褐色筒狀雌雄離生實為乾燥裂開之蒴觀賞用又為香水料

Buddleia japonica *Hemsl.*

馬錢科

醉魚草(漢)

醉魚草為山野自生之落葉灌木高三四尺莖節間有縱行翅葉對生為廣披針形有鋸齒花有帶紫色不整齊之筒狀花冠排列為穗狀花序

有毒碎其枝葉投入水中能使魚醉而易於捕獲

Jasminum nudiflorum Lindl.

Forsythia suspensa Vahl.

連翹（漢）　木犀科

連翹庭園栽培之。為落葉灌木。莖及枝之上部。畧如蔓狀。葉對生。為卵形。有鋸齒。花開於早春。有黃色合瓣花冠。供觀賞用。

迎春花（漢）黃梅（日）　木犀科

迎春花者。栽培於庭園之小灌木也。上部之莖。稍呈蔓狀。幼莖呈綠色。概垂下。長五六尺。有葉絲可愛。如柳條。莖節隆起。葉為複葉。成於三小葉。無托葉。對生。花有具光澤。呈高盆狀之黃色合瓣花冠。每葉腋輪生數朵。只二朵發育為對生狀。開於早春。



Limnanthemum nymphoides *Link.* var. japonicum *Miq.*



Limnanthemum indicum *Griseb.*

龍膽科

莕菜者。池沼自生之多年生草也。葉呈圓心臟形。浮於水面。花生於葉腋。出水上而開。花冠五裂。呈黃金色。緣有多數毛狀突起。

供觀賞用。葉莖之幼者可食。

金銀蓮花（漢）

龍膽科

金銀蓮花。為自生於水中之植物。有細莖。葉為橢圓狀心臟形。長四五寸。浮於水面。花數朶叢生。各具長花梗。花冠白色五裂。有毛狀突起。

Strychnos nux vomica *L*

馬錢科

馬錢子番木鼈(漢)

馬錢子者東印度原產之常綠樹也高約十五尺葉有三至五之肋對生呈卵形花為有限花序聚小花冠為長筒狀實為黃漿果大如中等西洋木檎之果種子扁圓有密毛直徑約五六分由此種子所成之粉末越幾斯或丁幾可用於胃加答兒神經痲痺等症又可用以毒殺鼠類有非常激烈性故使用時切勿失其適量若中其毒速服濃厚咖啡

Swertia bimaculata *Clark.*

龍膽科

樟牙菜(漢)

樟牙菜自生於山野水邊為多年生草高達二三尺葉為長卵形有三條大脈花白色五裂有紫黑小點



Swertia chinensis *Franch.*

自生於山野。為一年生草。高約一尺。有強苦味。葉對生。為披針形。花生於莖之上部。有淺紫色之合瓣花冠。乾此莖葉以供藥用。有健胃之効。

龍膽科

Gentiana frigida *Haenk.* var. algida *Pal.*

當藥龍膽（日）

當藥龍膽。都自生於高山之多年生草也。高約一尺。下部之葉。如倒披針形而長。上部之葉。如廣披針形而短。花開於莖頂。呈白色。略帶黃色。且有綠細點。有苦味。為健胃藥。

Gentiana lutea L.

健質亞那(拉)　龍膽科

健質亞那產於阿魯普斯山及歐洲南部高山為多年生草高達三四尺葉為楕圓形帶青綠色花有五裂黃色之合瓣花冠其根甚苦可用為健胃劑

Erythraea centaurium *Pers.*

慎答吳里吳木(拉)　龍膽科

此為歐洲原產之一年生草或越年生草高達一尺餘葉對生作長卵形通常有大脈五花有肉紅色或白色之合瓣花冠集生於莖之上部

其莖葉供藥用有健胃解熱之効

Strophanthus hispidus *DC.*

此為產於熱帶非洲之蔓生木質植物葉對生橢圓形或卵形花有漏斗狀花冠花冠外部色白內部及基部色黃且具紫點種子為心臟強壯藥及利尿劑

Trachelospermum jasminoides *Lemaire*

絡石（漢）　夾竹桃科

絡石者自生於山野常綠蔓生之木質植物也莖以氣根上昇於他物葉對生為長橢圓形其質強靭有光澤花有白色合瓣花冠排列為聚繖花序栽培之為觀賞用

Gentiana scabra *Bge.*
var. Buergeri *Maxim.*

龍膽(漢)世龍膽　龍膽科

龍膽為山野自生之多年生草。高約一二尺。葉對生。為廣披針形或長卵形而尖。無葉柄。花有青色筒狀合瓣花冠。生於莖頂及上部葉腋。

供藥用有健胃之効。又栽之以供觀賞。

Nerium odorum *Soland*

夾竹桃(漢)柳葉桃(中俗)　夾竹桃科

夾竹桃為東印度原產之常綠喬木。高及丈餘。葉為披針形輪生。花或紅或白。似山躑躅花。有毒。祇可觀賞。

Metaplexis Stauntoni *R. et S.*



Vincetoxicum japonicum *Morr.et Dec.*

蘿摩科

蘿摩（漢）

蘿摩自生於原野為多年生蔓草以其莖纏繞他物葉為長心臟形而尖以長葉柄而對生花小叢生於葉腋而生花軸之上端花冠為合瓣五裂外面灰白內面淡紫有白毛果含生長毛之種子種子之毛可為棉之代用品莖可束物皮富纖維

伊預蔦自生海邊山野之多年生蔓草以莖卷絡於他物葉呈卵形或橢圓形對生花序成於葉腋所生少數之花花小色白稍帶黃綠雄蕊有花粉塊實細長而尖為乾果熟則開裂而出帶毛之種子

Cynanchum caudatum *Maxim.*

Vinca rosea *L.*

日日草(日)　夾竹桃科

日日草。為西印度原產之多年生草。莖直立。葉對生。為楕圓形。花冠呈淡紅紫色或白色。有細筒部。栽之以供觀賞。

牛皮消(漢)　生馬(日)　蘿摩科

牛皮消。有自生於山野。多年生之蔓草也。葉為心臟形。頂尖。對生。花序為繖形。生於葉腋。花色白而形小。雄蕊有花粉塊。果實為紡錘狀。乾果。成熟則裂出具白色長毛之種子。

Pharbitis hederacea L.

Pyenostelma chinensis bge.

蘿摩科

徐長卿。為原野自生之多年生草。莖高一二尺。葉對生。而細長似柳葉。無鋸齒。七八月間。葉腋開多數小花。結狹長果實。內含種子甚多。而種具長毛。栽之以供觀賞。

旋花科

牽牛子。(漢)朝顏(日)

牽牛子。我國南部及日本臺灣產之。為一年生蔓性之纏繞草。葉通常三裂。呈心臟形。有毛。互生。葉柄長。花冠呈漏斗狀。五片結合。而為整齊之合瓣花冠。彩色美麗。早朝開放。受日光則萎閉。故有朝顏之名。萼五片。綠色。有毛。花序近於總狀。實為球形。有三室。各室藏二種子。花形種種變種極多。栽培之以供觀賞。種子有毒。

Hoya carnosa *R. Br.*

Vincetoxicum sublanceolatum *Maxim*

鷗蔓（日）　蘿摩科

鷗蔓自生於山野。為多年生之蔓草也。以細莖纏繞於他物。葉為廣披針形。對生。花小有暗紫色。合瓣花冠。雄蕊合花粉塊。實為蒴而長。種子一端叢生棉狀長毛。

毬蘭（漢）　蘿摩科

毬蘭者。東印度原產多年生之蔓草也。葉呈橢圓形而厚。為肉質。花小。作淡紅色。形狀稍類櫻花。具長花梗。排列為繖形。栽培之為觀賞用。

Exogonium purga *Benth.*

Calystegia sepium *R. Br.*

旋花科

旋花為自生山野之多年生蔓草葉細長常卷絡於他物葉如戟形以長葉柄而互生花作淡紅白色有漏斗狀合瓣花冠其形狀似牽牛子花地下部供食用

旋花科

藥刺巴（日）

藥刺巴都墨西哥原產之蔓草纏絡於他物葉呈心臟形花為漏斗狀亦似牽牛花其根為球形含多量樹脂稱為藥刺巴根瀉劑用之

Ipomoea batatas *Lam.*

甘藷紅薯(漢)山芋　旋花科

甘藷者中央亞美利加原產之多年生草也莖細長常匍匐於地上葉為卵形或心臟形有長葉柄互生花有漏斗狀之合瓣花冠酷似牽牛子花

廣栽培於暖地其多肉之根可供食用又可以之釀酒

Cuscuta japonica *Chois.*
var. thyrsoidea *Engelm*

菟絲子(漢)　旋花科

菟絲子者寄生於薔薇及他植物之蔓草也無綠葉莖細長纏絡於宿主植物葉小呈鱗狀帶赤色

種子為強壯藥



Alkanna tinctoria *Trusch.*

阿路坑那都歐洲南部所栽之多年生草
也全部有毛高一尺五寸花長楕圓形而
互生形小而類紫草花為盤旋花序
其根皮紅色色素稱為鴨而開你音可
作染料溶解於油及酒精而不溶於水

Cynoglossum furcatum *Wall.*

大瑠璃草（日）　紫草科

大瑠璃草為自生於山地之雜草高達二
三尺葉為廣披針形有粗糙之毛花青色
花冠上部有小舌排列為總狀花序實為
小堅果生刺甚多

Quamoclit vulgaris *Chois.*

旋花科

蔦蘿（漢）

蔦蘿多栽於庭院。為一年生蔓草。莖細長而卷絡於他物。葉互生。細裂為羽狀。花有紅筒狀之合瓣花冠。觀賞用。

Phlox paniculata *L.*

花葱科

草夾竹桃（日）

草夾竹桃為北美原產之多年生草。高達三尺餘。葉為廣披針形。全緣。對生。花作紅紫色或白色。排列為圓錐花序。栽培之為觀賞用。

Caryopteris divaricata *Maxim.*

Clerodendron tricotomum *Thunb.*

猶多自生於山野一種之雜草也有強臭氣莖方高達三四尺葉為卵形而尖有鋸齒對生花有唇形青紫色花冠

馬鞭草科

海洲常山（漢）

海洲常山乃自生於山野之落葉樹高達一丈五尺葉呈卵形而尖對生有特異臭氣花冠為合瓣白色有細長筒部萼帶赤色雄蕊突出於花外

栽培於庭園幼葉供食用

Lithospermum officinale *L.*

Trigonotis peduncularis *Benth.*

雞腸草(漢)田平子(日)　紫草科

雞腸草者乃自生於園圃之越年生草也。高僅七八寸。葉互生。呈倒卵形。其面粗糙。花有小形青色之合瓣花冠。花軸上部為旋回狀。為春季觀賞草之一種。

紫草(漢)　紫草科

紫草者自生於山野之多年生草也。高達二尺餘。葉為長楕圓形或長卵形。互生。有粗糙之面。花為小形。帶白色。生於莖之上部。乾根可為紫色之染料。



Tectona grandis L.

Vitex Negundo L.

柚木(印)

起苦樹產東印度原產之常綠樹也高約百尺幹直立有灰白色之皮葉長一二尺為倒卵形對生下面帶白色花小色白有香氣

其材含硅酸甚堅固永不腐朽故稱亞洲第一良材最適於建築兼為製船料

牡荊(漢)　馬鞭草科

牡荊為東印度原產之灌木高達四五尺葉為掌狀複葉小葉有鋸齒花小而色青排列為圓錐花序

栽培之以供觀賞其新鮮之葉供藥用有利尿通經之效

Caryopteris Mastacanthus *Schauer.*

Verbena officinalis *L.*

馬鞭草科

馬鞭草(漢)

馬鞭草。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉分裂為羽狀。對生。花小。有淡紫色唇形花冠。排列為長穗狀花序。此植物為著名之發汗藥。亦有栽培之以供觀賞用者。

馬鞭草科

蘭菊(日)

蘭菊。多栽培於庭園。為多年生草。高達三四尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。花簇生於上部葉腋。有青紫色。不整齊之合瓣花冠。

栽培之為觀賞用。

Salvia japonica *Thunb.*
var. pinnata *Fr. et Sav.*

Plectranthus longitubus *Miq.*

香茶菜。為山野自生之多年生草。高二三尺。莖作方形。葉呈橢圓形。兩端尖。對生。花冠紫青色。呈唇形。筒部甚長。具四雄蕊。二長二短。

栽培之供觀賞用。

鼠尾草（漢）　唇形科

鼠尾草。乃山野自生之多年生草。高達二三尺。莖為方形。葉為羽狀複葉。對生。花序類於紫蘇。花冠為淡紫色。呈唇形。雄蕊二個。

Callicarpa japonica thunb.

Lippia citriodora H.B.

防臭木(日)　馬鞭草科

防臭木為南美智利原產之灌木葉輪生呈披針形有多數之腺又有似於里木子之香氣花小帶青白色其乾葉有香氣可用為食物香料

紫珠(漢)　馬鞭草科

紫珠為山地自生之落葉樹葉對生為楕圓形有鋸齒端稍尖花小其唇形花冠呈淡紫色密生於葉腋果小而呈紫色其材可用以作球

Prunella vulgaris *L.*

Thymus Serpyllum *L.* var. vulgaris *Benth.*

此為自生於山野之多年生小草。莖高一尺。葉小而為長卵形。對生。小花集生於枝之上端。有淡紅紫色或白色之唇形花冠。及二強雄蕊。

栽培之供觀賞用。或作香料加於食物。又為興奮藥及殺菌劑。

滁洲夏枯草（漢）　唇形科

滁洲夏枯草。山野自生。為多年生草。高一尺。葉呈長卵形。有葉柄。花為穗狀排列於莖之頂端。花冠如唇形。為淡紫色或白色。雄蕊四個。二個獨長。子房四裂。

為收斂藥之最有效者。

Mosia punctata *Maxim.*

Stachys aspera *Michx.*
var. japonica *Maxim.*

石薺薴（漢）　唇形科

石薺薴。為原野自生之雜草。高達二三尺。莖為方形。生枝甚多。葉為長卵形。有鋸齒。對生。花生於莖枝上部。為總狀花序。花冠淡紅色。為唇形。具强雄蕊二。

犬胡麻（日）　唇形科

犬胡麻。為自生於山野之雜草。高達二三尺。莖為方形。密生粗毛。葉為披針形。有鋸齒。以短柄對生花叢生於莖之上部葉腋。花冠為唇形。作淡紅紫色。有二强雄蕊。為有毒植物。昔時供藥用。

Plectranthus excisus *Maxim.*

Lophanthus rugosus *Fisch.*

排草香自生於山野為多年生草有強香氣莖為方形高達四五尺葉為長心臟形而尖有鋸齒由葉柄對生花叢生於莖頂有青紫色唇形花冠雄蕊四個二長而二短

栽培之為觀賞用

龜葉草（日）

唇形科

龜葉草自生於山地為多年生草有方莖高達二三尺葉為卵形有不整齊之鋸齒先端作龜尾狀花有帶紫色之唇形花冠雄蕊四個子房四裂

Nepeta Glechoma *Benth.*

Lamium album *L.*

唇形科

野芝麻（漢）

野芝麻。為原野自生之多年生草。有方莖。高達一二尺。葉為卵形或心臟形而尖。有鋸齒。由長葉柄對生。花叢生於葉腋。有白色或帶紫色之唇形花冠。雄蕊四個。二長二短。子房四分。

唇形科

垣通積雪草治癇草（日）

垣通。為曠野自生之多年生草。莖作方形。匍匐於地上。葉為心臟形。有鋸齒。由葉柄對生。花生於葉腋。有青紫色之唇形花冠。雄花四個。二長二短。

小兒服其汁液。則能治癇。又為強壯劑。治慢性肺

Ajuga pygmaea *A. Gr.*

Salvia nipponica *Miq.*

琴柱草自生於山地多年生草也有方莖高達二尺餘葉如戟形而尖稍類琴柱之形對生花有黃色唇形花冠具二雄蕊幼葉供食用其酷似琴柱草具紅紫色之唇形花冠都為秋桐

地獄釜蓋（日）

地獄釜蓋乃自生於山野之雜草也莖長二三寸不直立對生之葉有缺刻花生於莖之頂端及葉腋有青紫色之唇形花冠雄蕊四個

Lycopus europaeus *L*
var. parvifolius *Miq.*

小白根（日）　唇形科

小白根自生於濕地為多年生草高達二三尺葉對生呈長橢圓形有鋸齒花小簇生於葉腋有白色唇形花冠具二個雄蕊

Calamintha chinensis *Benth.*

風輪菜（漢）　唇形科

風輪菜自生於山野為多年生草有方莖高達二尺餘葉對生為長卵形花有赤紫色之唇形花冠簇生於莖上葉腋果類紫蘇

昔時供藥用

Perilla nankinensis *Decne.*

紫蘇園圃多栽之。為一年生草。高達二尺餘。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。下面呈紫紅色。花小。有白色或淡紅色之唇形花冠。集為穗狀之總花序。

葉及果實可食。栽於歐美為觀賞用。其葉帶綠色者稱青紫蘇。葉及果實俱供食用。並入藥。

Chelonopsis moschata *Miq.*

鈴子香（漢）　唇形科

鈴子香。自生於山地。為多年生草。有方莖。高達二三尺。葉對生。為長橢圓形。其端尖。有鋸齒。葉之基部呈凹形。花有淡紅紫色之唇形花冠。簇生於葉腋。有似於麝香之香氣。栽培之供觀賞用。

Salvia officinalis *L.*

撒爾維亞（拉）　唇形科

撒爾維亞。為歐洲之原產多年生草。高三尺餘。下部為木質。葉呈廣披針形。有皺襞。花生於莖之上部。呈穗狀。有青色唇形花冠。

葉作藥用。有收斂性。又有興奮性。

Calamintha gracilis *Benth.*

塔花（日）　唇形科

塔花。為原野自生之雜草。有方莖。高一尺餘。葉作卵形而對生。有鋸齒。花小。有帶紅色之唇形花冠。花軸開多數之花。呈階段狀。又似塔形。

Ajuga decumbens *Thunb.*

Stachys Sieboldi *Miq.*

草石蠶多栽培於園圃。為多年生草。有方莖。高達二尺餘。葉對生。有鋸齒。下部之葉為長心臟形。上部之葉為長卵形。花開於上部葉腋。有淡紅紫色之唇形花冠。地下連球狀之莖。可供食用。

唇形科

筋骨草（漢千二單（日））　唇形科

筋骨草。為山野自生之雜草。有方莖。高達六七寸。葉對生。為長橢圓形。有鋸齒。花有白質淡紫色之唇形花冠。叢生於莖上部葉腋。

Scutellaria indica *L.* var. japonica *Maxim.*

Lycopus europaeus *L.*

白根(日)　唇形科

白根自生於濕地。為多年生草。高達三四尺。葉對生。為長楕圓形。其端尖銳。有鋸齒。花小。有白色唇形花冠。叢生於葉腋。根狀莖之肥大部。可供食用。

司苦台拉里阿(寅)　敵卡、加保尼卡(拉)　唇形科

為山野自生之雜草。有方莖。高及尺餘。葉對生。呈心臟形。花有青紫色或白色之唇形花冠。排列為總狀花序。

Rosmarinus officinalis *L.*

迷迭香　歐洲南部原產之常綠小灌木也葉為線形革質也花呈淡黃色生於莖上部葉腋

其葉用作通經藥又蒸溜其枝葉可採迷迭油供於外用及內用但有毒性故用過量則致死

Lavandula vera *DC.*

唇形科

刺賢垤爾（白）

刺賢垤爾為地中海沿岸原產之常綠灌木有狹披針形之葉開如穗狀而呈青色之小花花冠為唇形有四雄蕊

蒸餾其花可採強芳揮發油稱刺賢垤爾油可為藥及香水料之用

Lamium amplexicaule *L.*.

Mentha arvensis *L.*
var. piperascens *Holmes.*

唇形科

薄荷（漢）

薄荷自生於山野或栽培於庭園為多年生草高達尺餘有特殊芳香葉對生作卵形其端尖銳有鋸齒花小有紫色唇形花冠集生於葉腋

乾其莖葉可製薄荷腦用於治痛神經痛又有殺菌之效薄荷油用於健胃驅風及興奮藥

唇形科

佛座（日）

佛座為原野自生之一年生草或越年生草高及七八寸下部之葉為圓卵形或心臟形有葉柄上部之葉無葉柄緊抱莖中花有紫色細長之唇形花冠

Lycium chinense *Mill.*



Lycopersicum esculentum *Mill.*

茄科

赤茄。為南美白露原產之一年生草。高五六尺。葉為不整齊羽狀複葉。小葉亦分裂。為羽狀。花黃色。其構造似茄花。實為漿果。多赤色。

果實供食用。

枸杞（漢）　茄科

枸杞多生於我國各地。為灌木。高及丈餘。葉為長橢圓形。互生。或叢生。花有紫色。合瓣花冠。果作卵形而尖。赤漿果也。

幼葉可食。又可代茶。藥用以果為強壯劑。枸杞之變生物。有莖針者。名鬼枸杞。其功用與枸杞同。

Solanum nigrum L.

Chamaesaracha japonica Fr. et Sav.

刺酸漿（日）　茄科

刺酸漿。為山野自生之雜草。高及二三尺。葉呈卵形而尖。全邊。花生於葉腋。帶黃白色。其形小。萼有刺毛。生長於花後。所以包果實也。

狗酸漿（漢）　茄科

狗酸漿。為原野自生之一年生草。高及二三尺。葉全邊。呈卵形。花小色白。排列為繖形。果為黑色球形漿果。大畧等於碗豆之種子。

性有毒。以莖葉煎汁。可治頑癬。

Nicotiana tabacum L.

Capsicum longum L.

煙草（漢）　茄科

煙草為南亞美利加原產之一年生草高達四五尺葉互生為卵形而尖花有淡紅紫色漏斗狀之合瓣花冠排列為圓錐花序

其乾葉為製煙原料

蕃椒為一年生草多栽培者高達二三尺葉為卵形而尖有長葉柄互生花有白色合瓣花冠具長花梗果細長熟呈赤色有辛味

果實為辛味料葉為食用又栽之以供觀賞

Physalis angulata *L.*

Solanum tuberosum *L.*

馬鈴薯（漢）　茄科

馬鈴薯為南美智利原產之多年生草。高達二三尺。地中生塊狀莖。為羽狀複葉。由大小兩種之小葉而成。花有白色或青紫色之合瓣花冠。集生於莖之上部。塊狀莖可供食用。又以之取澱粉。或供酒精原料。由塊狀莖所生之幼枝有毒。不可食。

苦蘵（漢）　千成酸漿（日）　茄科

苦蘵為北美原產之多年生草。高約一尺。葉為卵形。緣邊有粗鋸齒。具長葉柄。花小。作淡綠黃色。其實為綠黃色漿果。萼生長於花後。有十稜之囊以包果實。果實為女兒玩物。同於酸漿。

Scopolia japonica *Maxim.*

莨菪自生於山地。為多年生草。高達尺餘。葉互生。為長橢圓形而尖。每葉腋開一花。具花梗。有鍾狀淡紫色合瓣花冠。此物有毒。其全部可製莨菪越幾斯及莨宕丁。幾鎮痙鎮痛之要藥也。

Hyoscyamus niger *L.*

茄科

菲沃斯（曰）

菲沃斯為歐洲原產之越年生草。全部有毛。高約三尺。葉緣有缺刻。基部抱莖。花無花梗。花冠呈黃色。有紫色之脈。為麻醉性之毒草。可用以鎮痛。

Solanum Melongena *L.*

Datura alba *Nees.*

曼陀羅花(漢)大麻子.喇叭花(中俗)朝鮮朝顏(日)　茄科

曼陀羅多栽培於庭園為一年生草高達三四尺葉卵形有缺刻花大有白色漏斗狀合瓣花冠實為裂果其面生刺有毒之植物也將其葉加於煙草有鎮咳之効然用之過多足以致死

茄(漢)　茄科

茄為一年生草多栽培於園圃高達二三尺葉互生為卵形花有紫色合瓣花冠實為大形漿果呈暗紫色果供食用其莖可製牙籤



Physalis Alkekengi L.

酸漿。為歐洲南部原產之多年生草。高及二三尺。葉為卵形而尖。花有淡綠色之合瓣花冠。實為赤漿果。有囊狀帶赤色之萼片被之。

栽之以供觀賞。果為女兒玩物。又為藥用。有解熱之効。

Lindernia crustacea F. v. M.

林待路尼挨古路司塔開亞(拉)玄參科

田野自生。一年生草。高僅二三寸。葉為卵形。對生。花有淡紫色唇形花冠。具雄蕊四。二個特長。此物形狀雖與通泉草相似。而通泉草混生互生葉。

Atropa belladonna *L.*

Solanum lyratum *Thunb.*

蜀羊泉（漢）鼈上戶（曰）　茄科

蜀羊泉。自生於原野。多年生之蔓草也。莖細長有毛。卷絡於他物。葉為長卵形。基部有大缺刻。花小色白。其構造類茄花。實呈赤色球形之漿果也。

為有毒植物。

別刺敦那（拉）　茄科

別刺敦那為歐羅巴及西部亞細亞原產之多年生草。葉卵形而互生。由葉腋生暗紫色之花。實黑色漿果。

此草之葉。稱別刺敦那葉。根稱別刺敦那根。主用於亞篤羅必涅之製造。亞篤羅必涅。外用於病眼。

Linaria japonica *Miq.*

柳穿魚。自生於海邊。為多年生草。高約一尺。葉帶白色。呈橢圓形。全邊。無葉柄。通常三葉輪生。花有黃色假面狀花冠。下唇具距。

栽培之為觀賞用。



Veronica Buxbaumii *Ten.*

大婆婆納（日）　玄參科

大婆婆納。為歐洲原產之一年生草。高只四五寸。葉為卵形。有短葉柄。花作青色。每一葉腋。祇生一花。

此草日本近年亦輸入之。東京附近。已有野生者。

Lindernia angustifolia *Wetts.*

Veronica agrestis *L.*

婆婆納（漢）

婆婆納。自生於原野。為一年或越年生草。長三四寸至七八寸。葉為卵形。有鋸齒。最下之葉對生。其餘互生。花為小形淡紅色。每由葉腋發生。果小而扁。有二淺裂。

玄參科

畦蕃椒（日）

畦蕃椒。為一年生小草。田畝之畦畔自生之。莖斜生於地上。葉為長楕圓形。對生。花生於葉腋。有長梗。花冠帶白色。呈唇形。具雄蕊四。二長二短。實細長而小。形類蕃椒。

玄參科

Ambulia sessiliflora *H. Bn.*

菊藻自生於水田濕地。雜草也。葉輪生。分裂為羽狀。花生於葉腋。有帶紫色之唇形花冠。

Paulownia tomentosa *H. Bn.*

桐白桐泡桐（漢）　玄參科

桐為落葉樹。高達三丈。葉大對生。花排列為圓錐花序。花冠為紫色或白色唇形。其材可造箪笥琴箱等類。但歐洲栽培之而為觀賞用。

Scrophularia kakudensis *Fr*

天山玄參(漢)　玄參科

天山玄參。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉大。為長卵形。而尖。有鋸齒。花有暗紫色唇形花冠。排列為圓錐花序。種子有似實芝荅里斯葉之効用。葉治瘰癧最有効。

Veronica Anagallis *L.*

水苦蕒(漢)　玄參科

水苦蕒。自生於水田小川等處。為越年生草。高達一尺餘。莖平滑。葉為廣披針形。無柄。有鋸齒。對生。花為小形。帶紫白色。排列為總狀花序。幼莖與葉。皆供食用。

Euphrasia officinalis *L.*

粉米草者。山地自生之一年生草。高及六七寸。葉對生。為卵形。有大鋸齒。花呈白色。有紅紫色之唇形花冠。常寄生於禾本科植物之根株間。

Scrophularia Oldhami *Oliv.*

玄參（漢）　玄參科

玄參。為自生於山野之多年生草。其莖方。高達五六尺。葉對生。為長卵形。而尖。有鋸齒。花有綠黃色唇形花冠。具四雄蕊。排列為細長圓錐花序。

地下部供藥用。

Veronica virginica L.

Antirrhinum majus L.

金魚草(日)　玄參科

金魚草。為地中海沿岸原產之多年生草。高達二三尺。葉為披針形或長橢圓形。全邊。花大而美。排列為總狀花序。花冠有紫赤白三色之分。呈假面狀。無距。栽之以供觀賞用。

草本威靈仙(漢)九蓋草。九階草(日)玄參科

草本。威靈仙。自生於山地。為多年生草。高達三四尺。葉為廣披針形。輪生。花有青紫色。合瓣花冠。具二雄蕊。排列為長總狀花序。栽培之為觀賞用。亦可以之治腳氣及

Rehmannia lutea *Maxim.*

地黃為我國之多年生草。高僅六七寸。葉呈長楕圓形。互生。花作黃白色。有帶紫色之唇形花冠。排列為總狀花序。

根為強壯藥。

Pedicularis resupinata *L.*

玄參科

鹽竈草（日）

鹽竈草都自生於山野之多年生草也。高達二三尺。葉互生或對生。為長卵形。其花有紅紫色之唇形花冠。生於莖之上部。為觀賞用之植物。

Mazus rugosus *Lour.*
var. macranthus *Fr. et Sav.*

Phtheirospermum chinense *Bge.*

小鹽竈　玄參科

小鹽竈(日)

小鹽竈都山野自生之多年生草也高及二三尺葉為羽狀複葉對生花生於葉腋或短花軸之頂具紫紅色之唇形花冠

通泉草(漢)　玄參科

通泉草都原野自生之小草也互生匙狀之葉亦有對生者花有白色或帶紫色之唇形花冠

栽培之為觀賞用

Sesamum indicum *L.*

Catalpa Kaempferi *S.et Z.*

梓為栽於園圃之落葉樹高約二丈葉形似桐葉而小花有淡黃色帶紫色斑紋之唇形花冠果實細長形狀畧似豇豆材為木履及他料花為觀賞用

胡麻（漢）芝麻（俗）　胡麻科

胡麻為東印度原產之一年生草高達三四尺葉為長橢圓形對生或互生花生於葉腋有淡紫白色筒狀之唇形花冠實為長乾果易裂開種子小而扁其數多黑者稱黑油麻白者稱白油麻此草人多栽之以榨油而供食用

Digitalis purpurea *L.*

寶芝荅里斯（拉）　玄參科

寶芝荅里斯者。歐洲原產之越年生草。高三四尺。下部葉為卵形。或廣披針形。有長柄。上部葉無柄。或有柄而短。花紅紫色。或白色。有大唇形花冠。列為總狀花序。葉為著名心臟强壯藥。兼有利尿之効。又栽培之為觀賞用。

Tecoma grandiflora *Loisel.*

凌霄花（漢）　紫威科

凌霄花。多栽培於庭園。木質之蔓生植物。莖由小形之氣根上昇於他物。葉為奇數羽狀複葉。對生。小葉為卵形而尖。有鋸齒。花有大形黃赤色。稍不整齊之合瓣花冠。

Conandron ramondioides *S.et Z.*

苦苣苔常生於山中濕岩上為多年生草通常一株一葉葉雖畧似煙草而有多數鋸齒花梗長五六寸花生於頂端為繖形花序作淡紫色亦有白色者栽培之供觀賞用其葉可食

Utricularia vulgaris *L.*

狸藻科

狸藻(曰)

狸藻屬草本生於水中有細長之莖葉為絲狀有多數分枝枝之各處具小囊花莖抽出於水上開數多之花花有黃色不整齊之合瓣花冠

其生於葉上之小囊能捕蟲故甚著名



Boschniakia glabra C.A. Mey.

保斯苦尼阿疾阿孤拉不拉(拉)列當科

生於高山為寄生植物多寄生於赤楊類之根莖為黃褐色肉質呈短柱狀長尺餘葉為黃褐色鱗狀互生花與葉莖同色叢生於莖之上部有唇形花冠乾之可作強壯劑



Aeginetia indica Roxb.

野菰(漢)　列當科

野菰屬草本常以根寄生於他植物高達七八寸有鱗片狀之葉每頂開一花花有帶赤色唇形花冠

Plantago major *L.* var. asiatica *Dene.*–

Justicia procumbens *L.*

爵牀都自生於山野之雜草也高達一尺餘葉為長橢圓形或廣披針形對生花小集為穗狀花冠為淡紫色唇形具二雄蕊其莖葉液汁治充血有効

車前（漢蝦蚓葉）（日）車前科

車前為自生山野之多年生草葉為廣卵形通常有五肋具長葉柄由地下部叢生花莖由葉叢之中央而生長約七八寸花小排列為穗狀花序萼與花冠及雄蕊皆由四片而成幼葉供食用種子為刺激緩和藥

Pinguicula vulgaris *L.*

蟲捕堇(日)　狸藻科

蟲捕堇者乃自生高山之食蟲草高只三四寸葉為長橢圓形或長卵形而叢生葉面分泌粘液花單生於花莖之頂有紫色之唇形花冠

葉面有粘液小蟲來時緣邊向上反卷蟲即為其所捕故有此名

司土落卿郎梯斯加波尼苦斯(拉)

Strobilanthes japonicus *Miq.*

爵林科

此為暖地自生之小灌木高達一二尺葉為長橢圓形而對互生花有紫青色唇形花冠

栽之以供觀賞用



Damnacanthus indicus *Gaertn.*

虎刺為自生於暖地之常綠灌木。生刺甚密。莖高二三尺。葉為卵形而硬。花白有漏斗狀花冠。實為赤色漿果。

栽培之供觀賞用。

Pseudopyxis longituba *Fr.et Sav.*

浦嗷依島皮克斯羅己祖巴(拉)

茜草科

此為山地自生之雜草。高達三四寸。葉為卵形。對生。花白兼帶紅色。有漏斗狀花冠。

Rubia cordifolia *L.* var. Mungista *Miq.*

茜草科

茜草(漢)赤根(日)

茜草者。山野自生之多年生蔓草也。葉呈長心臟形。或卵形。四枚輪生。莖形方有下向之刺。花小。呈淡黃白色。根可作赤色染料。又昔時以此根作利尿藥及強壯劑。

Oxyceros gambir *Baill.*

茜草科

阿仙藥(日)

阿仙藥。東印度。馬來。日牙巴斯麻土拉等處產之。蔓生。為木質之常綠植物。長約十尺。葉呈長卵形。對生。花小。作淡紅色。集數個球形而成。此物枝葉之煎汁。稱阿仙藥。供藥用及

Galium verum *L.*
var. lacteum *Maxim.*

河原松藥自生於山野為多年生草高達二三尺葉細長而數枚輪生花小而色白排列為圓錐花序根為赤染料昔時以此凝固牛乳而作乾酪

Cinchona succirubra *Pav.*

規那(日)　茜草科

規那者亞美利加原產之常綠樹也高達七八丈葉為卵形或橢圓形而對生其花不大有筒狀合瓣花冠排列為圓錐花序其樹皮稱規那皮用以解熱及強壯藥其有効之成分即規泥涅聖古尼涅等是也

Uncaria rhynchophylla *Miq.*

鉤藤（漢）　茜草科

鉤藤自生於暖地為蔓生植物以葉液曲鉤攀於他物而生葉為卵形而尖且對生花小作黃褐色花序為球形乾其曲鉤可作收斂藥用

Rubia chinensis *Ryl.et Maack.*

盧比阿起南塞斯（拉）　茜草科

為山地自生之雜草高及二三尺葉為長卵形而尖有葉柄四葉輪生花小帶綠白色排列為圓錐花序

Asperula odorata *L.*

車葉草。自生於山野。為多年生草。高尺餘。葉輪生。為長橢圓形。或廣披針形。開花小色白。有漏斗狀合瓣花冠。

乾燥此物。即為苦馬鈴。由苦馬鈴採芳香性之物質。用之以製香水。

Coffea arabica *L.*

咖啡（漢）　茜草科

咖啡者。自生於東部亞非利加。又栽培於熱帶各地。為常綠樹。高約二十尺。葉長卵形而尖。花白而香。實為肉質。含二種子。將種乾之。即為咖啡。炒作粉末。以熱湯浸之。為良好飲料。

Gardenia florida L.

Galium boreale L.
var. japonicum Maxim.

砧草（日）　茜草科

砧草自生於山地。為多年生草。其莖方。高達一二尺。葉為長卵形而尖。無葉柄。每四葉輪生。其花不大。排列為圓錐花序。花冠白色四裂。具雄蕊四。

梔子。黃梔花（漢）　茜草科

梔子為自生於暖地之常綠樹。高達十尺餘。葉為橢圓形。全邊對生。花大色白。脫落之前變為淡黃色。實為黃色橢圓形。具五六縱稜。

栽培之為觀賞用。乾其果實。可作黃色

Galium aparine *L.*

Lonicera gracilipes *Miq.*

猪殃殃者。山野自生之雜草也。蔓延於地上。莖細長。有刺毛。葉為倒披針形。通常每八枚輪生。花小而色白。

羅尼開拉、格拉克里派司。(拉)忍冬科

此物自生於山地。為落葉灌木。高達四五尺。葉為卵形或橢圓形。對生。花帶紅色。有稍不整齊之花冠。實為肉果。作赤色。

栽培之供觀賞用。

Rubia tinctorum L.

茜草科

西洋赤根（目）

西洋赤根。為歐洲原產之多年生草。高達一二尺。每六葉輪生。花為小形黃綠色。能結黑色漿果。根為肉質。作圓柱形而長。外部呈赤褐色。內部之材作黃色。研碎其根。加於稀薄亞硫酸液中。浸出其赤色素。煮沸之。蒸去亞硫酸。即得赤色素。此赤色素稱阿里撒林。可作染料。以此所染之木棉。稱赤根木棉。

Uragoga Ipecacuanha J. Baill.

茜草科

吐根（目）

吐根。為不拉日魯西部原產之小灌木。高約一尺。為楕圓形或倒卵形。花小色白。多集於總苞之上。實為漿果。作黑青色。其根稱吐根。碎為粉末。或為丁幾。可用以祛痰。

Viburnum odoratissimum *Ker.*

Lonicera Morrowii *A. Gr.*

為自生於山野之落葉樹。高達六七尺。葉卵形而對生。有稍不整齊之合瓣花。冠花冠始白後黃。故有金銀木之名。實為紅色漿果。畧似瓢簞形。

栽之以供觀賞。

珊瑚樹　木珊瑚（日）　忍冬科

珊瑚樹者。乃栽培於庭園之常綠樹也。高達二十餘尺。葉對生。為長橢圓形。質厚有光。花色白而形小。集為圓錐花序。實美麗呈赤色。作橢圓形。

栽培之為觀賞用。

Viburnum Opulus *L.*

Viburnum dilatatum *Thunb.*

莢蒾（漢）　忍冬科

莢蒾自生於山野為落葉樹高約二丈葉為廣橢圓形而尖對生花小而白排列為聚繖花序實赤色乃小形之漿果也栽培之為觀賞用其實可食

肝木（日）　忍冬科

肝木自生於山野為落葉樹高達八九尺葉為卵形三裂對生花白色排列為聚繖花序花序周圍之花其形大有雌雄蕊栽培之供觀賞用其材可作牙籤



Sambucus javanica *Bl.*

Diervilla japonica *DC.*

蒴藋（漢）　忍冬科

蒴藋。自生於山野。為多年生草。高達六七尺。葉對生。為羽狀複葉。由廣披針形之小葉而成。花小色白。排列為繖房花序。花間有杯狀黃色小體。

有毒之植物也。

楊櫨（漢）谷空木。紅空木。　忍冬科

楊櫨者。自生於山地之落葉樹也。高達六七尺。葉對生。為卵形而尖。有鋸齒。下面具毛。花有帶赤色之長合瓣花冠。數朵簇生。栽培之為觀賞用。

Sambucus nigra *L.*

Lonicera japonica *Thunb.*

忍冬科

忍冬（漢）

自生於山野。為多年生之纏繞植物。下部木質。葉對生。為卵形或橢圓形。凌冬不枯。故有忍冬之名。花生於葉腋。有帶紫白色不整齊之合瓣花冠。此花冠後變黃色。將其葉及花乾之。治瘡腫最有効。又乾其莖葉。可為茶之代用品。

忍冬科

西洋接骨木（日）

西洋接骨木。為歐洲原產之落葉樹。高達丈餘。葉為羽狀複葉。以大廣披針形或長卵形之小葉而成。花有小形白色之合瓣花冠。排列為繖房花序。果小色黑。花為發汗藥。

Viburnum tomentosum *Thunb.*

蝴蝶樹（注）　忍冬科

蝴蝶樹者。乃自生於山野之落葉樹也。高達丈餘。葉對生。為卵形或橢圓形而尖。有鋸齒。花白色。多數簇生。

觀賞用。

Patrinia villosa juss.

男郎花（日）　敗醬科

男郎花者。山野自生之多年生草也。莖葉俱有毛。高達四五尺。葉對生。緣邊分裂成羽狀。花小而白。

栽之以供觀賞。

Sambucus racemosa *L.*

Diervilla grandiflora *S. et Z.*

接骨木（漢）　忍冬科

接骨木。為山野自生之落葉樹。高達丈餘。葉對生。為奇數羽狀複葉。由長卵形之小葉而成。花小色白。排列為圓錐花序。實小色亦。其形如球。其花與實及莖。皆供藥用。又莖心可作顯微鏡試驗用之切片。

錦帶花（漢）　忍冬科

錦帶花。自生於山地。為落葉樹。高達七八尺。葉對生。為卵形橢圓形或倒卵形而尖。有鋸齒。花有淡紅色或白色之合瓣花冠。排列為聚繖花序。花冠之筒上部廣而下部細。

Scabiosa japonica *Miq.*

Dipsacus Fullonum *L.*

山蘿蔔科

山蘿蔔(漢)輪峯菊

山蘿蔔自生於山野為越年生草高達二三尺葉互生為羽狀複葉有細毛花生於花軸頂端排列成頭狀花叢外圍之花形稍大呈唇形作淡紫色中部之花其形小稍呈筒狀呈淡色花之外形類似菊花故有輪峯菊之名果實叢生為半球狀有紫色之刺毛栽培於庭園為觀賞用又採其嫩葉為浸物或和於飯以供食

山蘿蔔科

此種植物為歐洲原產之二年生草有刺高達六尺葉為廣披針形對生兩葉基部結合花帶紫色而形小排列為頭狀花序果實為橢圓形全部有鉤棘製造羅紗之際可用以搔出絲緒

Patrinia scabiosaefolia *Link.*

敗醬科

敗醬（漢）

敗醬為多年生草。自生於山野。高達四五尺。葉為羽狀複葉。或羽狀裂葉。對生。花小而色黃。栽培之為觀賞用。

Valeriana officinalis *L.*

敗醬科

纈草（日）

纈草者。亞洲之多年生草也。產於歐洲。高達一二尺。葉為羽狀複葉。對生。花形小。作淡紅色。狀似敗醬花。根狀莖可用作治神經病之鎮痙藥。

Actinost[illegible] racemosum *Maxim.*

Cucumis sativus *L.*

胡瓜（漢）　葫蘆科

胡瓜為東印度原產之一年生草。由卷鬚而上昇。葉為三裂或五裂。呈掌狀。以葉柄而互生。花單性。有黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為漿果之一種。有多數之刺。果供食用。

合子草（漢）　葫蘆科

合子草為自生於山野之蔓草。以卷鬚絡他物。葉互生。為長心臟形。花單性而形小。雌雄生於同株。果實為漿果。橫裂之。上部脫落。下部為椀狀。故有合器蔓之名。

Gynostemma pedata *Bl.*

絞股藍(漢)　葫蘆科

絞股藍。為原野自生之蔓草。有卷鬚。葉為掌狀複葉。通常成於五小葉。花為單性。雌雄生於異株。

葉可為土常山之代用品。

Trichosanthes cucumeroides *Maxim.*

王瓜(漢)烏瓜(日)　葫蘆科

王瓜。為蔓草。多年生。自生於平野。以卷鬚攀緣他物。葉為心臟形。淺裂而成掌狀。兩面粗糙。花單性。雌雄生於異株。花冠色白。而下部為筒狀。上部五裂。其緣邊分裂成絲狀。果實橢圓形。呈紅色。



Momordica Charantia *L.*

Cucurbita maxima *Duch.*

葫蘆科

番南瓜。世多栽培者。為一年生草。有卷鬚。葉為圓心臟形。有淺五裂。具長葉柄。互生。花為單性。有黃色大形之合瓣花冠。雌雄生於同株。實為大漿果。有數個縱溝。實供食用。

苦瓜（漢）　葫蘆科

苦瓜。園圃栽培之。一年生之蔓草也。莖細長。以卷鬚上昇。花單性。雌雄生於同株。有黃色合瓣花冠。實細長。外面有多數之疣狀突起。熟則變黃色而裂開。現其子。以紅肉被之。其被子紅肉。可供食用。

Citrullus colocynthis *Schrad.*

古魯聖篤草（日）　葫蘆科

古魯聖篤草者乃亞剌比亞小亞細亞及亞非利加北部所產之蔓草也。以卷鬚卷絡他物。其葉與花。酷似西瓜。實呈黃色球形。同於臭橙。其實乾者稱古魯聖篤果。於峻下劑用之。

Citrullus vulgaris *Schrad.*

西瓜（漢）水瓜　葫蘆科

西瓜。暖地多產之。為蔓生之一年生草。有卷鬚。葉三至七裂。花單性。有黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為大形漿果。果肉分黃赤白三種。實供食用。子亦可食。

Cucumis Melo *L.*

絲瓜（漢）　葫蘆科

絲瓜多栽培於園圃。為一年生蔓草。莖細長。以卷鬚卷絡他物。葉為圓心臟形。而尖分裂成掌狀。花單性黃色。雌雄同株。實為細長漿果。熟則果肉內生網狀強靭纖維。幼果供食用。纖維可作帽子心及抹布等。其莖中滴出之汁液。稱絲瓜水。供化妝用。

Luffa cylindrica *Roem.*

甜瓜（漢）香瓜　葫蘆科

甜瓜自生於亞細亞及亞非利加之熱帶地方。一年生之蔓草也。莖細長。由卷鬚卷絡他物。葉為圓心臟形。分裂成掌狀。花為單性。有黃色合瓣花冠。雌雄生於同株。實為漿果。有甘味。呈種種之形狀。果實供食用。

Lagenaria vulgaris Ser.

Benincasa cerifera Savi.

冬瓜（漢）　葫蘆科

冬瓜亞細亞及亞非利加諸國多栽培之為一年生蔓草莖以卷鬚上昇於他物葉為心臟形通常五裂為掌狀花單性雌雄生於同株有黃色花冠實為大形漿果生毛甚密至十分成熟其外面能分泌白蠟實供食用

蒲蘆（漢）　葫蘆科

蒲蘆園圃栽之為一年生之蔓草莖細長以卷鬚卷絡他物葉為圓心臟形而尖往往淺裂成掌狀花白色單性雌雄生於同株實為長漿果中部細縮成熟時除去其柔肉乾燥之可為酒器亦可作水

Lobelia sessilifolia *Lamb.*

山梗菜（漢）　桔梗科

山梗菜自生於山間濕地多年生草也高由二三尺至四五尺葉為披針形有鋸齒互生花生於莖之上部有青紫色不整齊之合瓣花冠有毒之植物也

Phyteuma japonicum *Miq.*

肥脫依馬加波你苦木拉　桔梗科

此種植物自生於山野為多年生草高達二三尺葉互生為長卵形花有紫色或白色之細長花瓣排列為總狀花序栽培之為觀賞用

Platycodon grandiflorus *DC.*

Lagenaria vulgaris *Ser.*

葫蘆科

瓠壺盧（漢）

瓠多栽培於園圃一年生之蔓草也莖以卷鬚卷絡他物葉為短心臟形淺裂成掌狀花單性有白色合瓣花冠雌雄生於同株實為細長漿果實供食用十分成熟時除去內部可為容器又一種稱圓瓠生圓果實其功用同瓠又有蒲蘆亦類似於瓠之植物也

桔梗科

桔梗（漢）

桔梗自生於山野為多年生草高達二三尺葉為披針形有鋸齒互生花形頗大生於莖及枝之頂端花冠為鐘狀五裂有青紫白色之分

栽培之為觀賞用幼莖及葉皆可食其



Lobelia inflata *L.*



Campanula punctata *Lam.*

山小菜　桔梗科

山小菜者山野自生之多年生草也高及二三尺葉互生為長卵形而尖有鋸齒花有長鐘狀合瓣花冠此花冠作淡紫色或帶白色具紫小點栽之以供觀賞

魯別利亞（拉）　桔梗科

魯別利亞為北亞美利加原產之一年生草高約二尺葉為長卵形有不齊之鋸齒其位於莖下部之葉有葉柄上部之葉無葉柄花呈紫色有不整齊花冠實如膀胱狀

此草全部於開花時乾燥之可為祛痰藥

Adenophora verticillata *Fisch.*
var. verticillata *Fr. et Sav.*

Adenophora remotiflora *Miq.*

蘑菇（漢）　桔梗科

蘑菇自生於山野為多年生草高達三四尺葉為長卵形而尖有鋸齒以長葉柄而互生花有淡紫青色之鐘狀花冠栽培之為觀賞用

沙參（漢）　桔梗科

沙參者自生於山野之多年生草也高達三四尺葉輪生為廣披針形或長卵形而尖花有青紫色或白色之鐘狀花冠排列為圓錐花序栽培之為觀賞用

Chrysanthemum indicum *L.*



Gnaphalium hypoleucum *DC.*

秋鼠麴草為山野自生之草本植物有白色細毛葉細長而尖花黃色全部由筒狀花冠而成

油菊（日）　菊科

油菊者山野自生之多年生草也生多數之枝高達三四尺葉似菊葉有深缺刻花黃色而為頭狀花序外圍之花有舌狀花冠中部之花有筒狀花冠果實無冠毛栽培之供觀賞用

Solidago Virgaurea *L.*

秋費菜（日）　菊科

秋費菜。為山野自生之多年生草。高二三尺。葉呈楕圓形卵形或披針形而尖。有明瞭細脈。花通常為黃色。白色者不多。實有冠毛。易為風吹散。

昔時以其花枝治腎病膀胱病等。

Lactuca brevirostris *Champ.*

山苦蕒（漢）　菊科

山苦蕒。自生於山野。為大形之草本植物。有乳狀液汁。高五六尺。葉呈大披針形。多有深缺刻。花作淡黃色。聚為頭狀花序。總苞由覆瓦狀之鱗片排列而成。

為有毒植物。

Arnica alpina *Olin.*

Leontopodium japonicum *Miq*

菊科

兎菊。自生於高山。為多年生草。高達一二尺。葉為倒披針形。數枚簇生。由其中央生花莖。花莖呈黃色。其花序周圍有舌狀花冠。中部有筒狀花冠。

觀賞用。乾之可作藥。其效用畧類亞爾尼亞。

薄雪草(日)　菊科

薄雪草。自生於高山。為多年生草。高約一尺。葉為鈍披針形。互生。下面有白毛。生於花序下之葉。兩面均為白色。花小。有筒狀花冠。

Erigeron linifolius Willd.

Arnica montana L.

愛里格羅里尼佛里務斯(拉)　菊　科

自生於山野。為一年生草。高及三四尺。莖葉有粗毛。葉為披針形。有不整齊鋸齒。花悉有筒狀花冠。具冠毛。

亞爾尼加(拉)　菊　科

亞爾尼加自生於歐洲中部。為多年生草。高約一尺。葉為卵形。全邊而對生。花酷似於兔菊之花。乾燥其花。可用於切疵挫傷等症。又可為興奮藥。但不多用。

Bellis perennis *L.*

Inula britanica *DC.*

延命菊（菊科）

延命菊。為歐洲原產之多年生草。高僅三四寸。葉呈長倒卵形或匙狀。多數簇生。由其中央出花莖。各花莖之先端。生一頭狀花序。花序周圍之花。有舌狀花冠。呈白色兼帶紅紫。中部花冠為筒狀。黃色居多。供觀賞用。

旋覆花（漢）小車　菊科

旋覆花。自生於原野。為多年生草。高達二三尺。葉為披針形。互生。乾燥之變黑色。花色黃。排列為頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部之花。有筒狀花冠。觀賞用。並入藥。

Ainsliaea dissecta *Fr.et Sav.*

Chrysanthemum chinense *Nees.*

翠菊（漢）　菊科

翠菊原生我國為一年生草或越年生草高達二尺有奇葉為卵形有鋸齒具葉柄花帶紫紅白三色為大形之頭狀花序花序外圍之花呈舌狀中部呈筒狀總苞由葉狀之鱗片而成

供觀賞用

遠州鬼督郵（日）　菊科

遠州鬼督郵自生於日本遠州之山野高達一二尺葉深裂為掌狀有長葉柄簇生於花莖下部花有筒狀花冠色白而畧帶紅色

供觀賞用

Xanthium strumarium L.

Crepis japonica Benth.

菊耳(泛)　菊科

菊耳者。原野自生之一年生草也。高達四五尺。葉為卵形而尖。有缺刻。互生。花單性。雌雄生於同株。雄花排列為小形頭狀花序。生於花軸上部。雌花亦為頭狀花序。結合而隱於囊狀總苞內。此總苞全面生刺。浸出其液。用為收斂藥。

苦來皮司加波尼卡(拉)　菊科

原野自生之雜草也。高達二尺餘。莖葉有毛。葉互生。頗似蘿蔔葉。有舌狀黃色花冠。排列為小形頭狀花序。果實具多數冠毛。易為風所吹散。

Artemisia japonica *Thunb.*

Atractylis ovata *Thunb.*

蒼术（漢）　菊　科

蒼术。自生於山野。為多年生草。莖高二三尺。下部木質。葉為單葉。作楕圓形。或深三裂。或為複葉。由三枚或五枚之小葉而成。互生。花有白色或淡紅色之筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞為葉狀。排列如覆瓦狀。之葉圍繞而成。由魚骨狀之根供食用。乾之可薰蚊殺菌。

牡蒿（漢）　菊　科

牡蒿。都山野自生之雜草也。高達二三尺。葉為楔形。上部有缺刻互生。其花酷似於艾。但得以形小而區別之。

Macroclinidium robustum *Maxim.*

山野自生。為多年生草。高達一二尺。葉為楕圓形而尖。有少數大鋸齒。葉柄長而互生。花白色。作筒狀。排列為頭狀花序。總包以數枚覆瓦狀之片。排列而成圓柱狀。

菊　科

Inula salicina *L.*

卞塞恩草（日）

菊　科

卞塞恩草。自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉呈廣披針形。多皺如乾燥狀。以其基部包莖。緣邊有小鋸齒。花色黃。排列為頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部則呈筒狀。供觀賞用。

Pieris hieracioides *L.*
var. japonica *Rgl.*

Pertya scandens *Sch. Bip.*
var. ovata *Maxim.*

高野帚（日）　菊科

自生於山野。為小灌木。高達二三尺。葉為卵形。互生。花有淡紅白三色之筒狀花冠。排列為頭狀花序。

莖可製帚。

毛蓮菜（漢）　菊科

毛蓮菜。自生於山野。為越年生草。高達二三尺。莖葉俱生硬毛。葉為披針形。有銳鋸齒。互生。花似蒲公英。花有黃色舌狀花冠。具白色冠毛。為頭狀花序。

Carpesium cernuum *L.*



Anaphalis yedoensis *Matsum.*

烟管頭草（日）　菊　科

烟管頭草自生於山野爲雜草之一種高達一二尺葉爲楕圓形而尖有鋸齒莖之分枝不多各枝頂端成彎曲形生一個之頭狀花序其狀頗如烟管頭故有此名花有黄色筒狀花冠

萩恒自生於河邊爲多年生草高達尺餘葉細長而尖其下面密生白毛其花形小而色黄排列爲頭狀花序總苞由多數白鱗片而成

Ammobium alatum *R. Br.*

Cacalia adenostyloides *Fr.et Sav.*

蟹蝙蝠(日)　菊科

蟹蝙蝠。為自生於山地之雜草。高達二三尺。葉形類蟹甲。緣邊有不整齊齒牙。花帶白色。悉有筒狀花冠。為小形之頭狀花序。

貝細工(日)　菊科

貝細工。為濠洲原產之一年生草。有綿狀之毛。高達二三尺。上部之葉為披針形。基部延長如翼狀。密著於莖。花有黃筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞成於銀白色之片。

Scorzonera hispanica *L.*

Chrysanthemum sinense *Sab.*

菊科

菊皆栽培而生。多年生草也。有木質性之莖。葉呈卵形。有缺刻。以葉柄互生。花為頭狀花序。周圍花為舌狀。中部花為筒狀。又因培養之結果。其頭狀花序之全花。往往變成舌狀花冠。

菊之變種甚多。栽培之為觀賞用。黃花中變種之一。其花可食。

斯可兒早奈拉席斯爬尼卡(拉)菊科

此為歐洲原產之多年生草。高達三四尺。葉細長而尖。互生。花為黃色。有舌狀花冠。排列為頭狀花序。根黑色細長。酷似牛蒡根。

根供食料。葉可養蠶。

Matricaria Chamomilla *L.*

加密兒列(日)　菊科

加密兒列者歐洲原產之植物也為一年生草葉細裂能發香氣花無冠毛其舌狀花冠呈白色筒狀花冠呈黃色

其乾花稱為加密兒列花為發汗劑用法與羅馬加密兒列同

Ainsliaea apiculata *Sch. Bip.*

阿寅斯利挨阿阿皮苦拉塔(拉)菊科

自生於山野為多年生草高達七八寸葉小以淺裂成掌狀叢生於莖之下部花白色有筒狀花冠排列為頭狀花序總苞狹長

Spilanthes oleracea *Jacq.*

荷蘭千日(日)千日菊(日)　菊科

荷蘭千日者。乃東印度原產之一年生草也。高達一二尺。葉呈卵形。對生。花有筒狀花冠。排列為卵形之頭狀花序。其未開放時。帶紅色。至十分開放。乃呈淡黃。

葉有辛味。可治齒痛。又有供觀賞以栽培者。

Calendula arvensis *L.*

金盞草(漢)　菊科

金盞草。為一年生或二年生之栽培植物。高尺餘。葉為廣披針形。互生。花色黃赤。排列為頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。實為乾果。作彎曲形。形小多刺。

供觀賞用。

Saussurea affinis *Spr.*

泥胡菜（漢）　菊　科

泥胡菜。自生於山野。為雜草之一。高達二三尺。葉大。分裂為羽狀。下面密生白軟毛。花紫紅色。皆有筒狀花冠。排列為頭狀花序。總苞為膜質鱗狀。排列如覆瓦。

Coreopsis Drummondii *Torr et Gr*

錦雞菊（日）　菊　科

錦雞菊。為北美合衆國原產之一年生或二年生草。高達尺餘。葉為複葉。由三枚至七枚小葉而成。小葉為卵形。其頭狀花序具長柄。周圍之花。有黃金色之舌狀花冠。中部則成筒狀。作紫褐色。

Aster trinervius *Roxb.* var. adustus *Maxim.*

馬蘭（漢）　菊科

馬蘭為山野自生之多年生草。高二三尺。葉為長卵形而尖。甚粗糙。有三大脈。具深鋸齒。互生。花類似雞兒腸花。因有多數冠毛。得以區別之。供觀賞用。嫩葉可食。

Gynura pinnatifida *DC.*

三七草（漢）　菊科

三七草。多栽培於庭園中。為多年生草。高約三尺。葉互生。形大。分裂成羽狀。花有黃色筒狀花冠。集為頭狀花序。以其葉液塗於毒蟲所刺處。有消毒之效。



Artemisia annua *L.*

黃花蒿(漢)　菊　科

黃花蒿。自生於原野。為一年生草。高達三四尺。葉為複葉。且細裂。花小而色黃。有筒狀花冠。排列為圓形之頭狀花序。撕碎其葉。則發惡臭。

Aretium Lappa *L.*

牛蒡(漢)牛房(日)　菊　科

牛蒡。到處產之。為越年生草。高四五尺。葉大如心臟形。有長葉柄。下面生白毛。花有紫色之筒狀花冠。花序呈頭狀。有由針狀鱗片而成之總苞。根及幼葉柄。皆供食用。

Aster trinervius *Roxb.* var. holophyllus *Maxim.*

Aster scabor *Thunb.*

東風菜（一）　菊科

東風菜。山野自生。為多年生草。高四五尺。下部之葉。為大心臟形。上部之葉。為長卵形。互生。花作白色。花序為頭狀。生於莖及枝之上部。周圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。葉能生茹。

白花除蟲菊（二）　菊科

為達虜馬其阿原產之多年生草。高二三尺。葉分裂為羽狀。有長葉柄。花白色。排列為頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部則成筒狀。

供觀賞用。其花之粉末。可以除蟲。

Chrysanthemum coronarium L.

Aster tataricus L.

紫苑（漢）　菊　科

紫苑。庭園栽培之。為多年生草。高達於六七尺。葉為大形。有鋸齒。葉面粗糙。花排列為頭狀花序。花序集生於莖及枝之上部。花序周圍之花有淡紫色之舌狀花冠。中部之花有黃色之筒狀花冠。為觀賞用之植物。

筒蒿（漢）春菊（日）蓬高菜（中俗）菊　科

筒蒿多栽培而生。一年或越年生草。高二三尺。葉互生。深裂成羽狀。花或黃或白。花序為頭狀。外圍花有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。供觀賞用。幼葉及莖可食。

Artemisia cina *Berg.*

Tagetes erecta *L.*

攝綿支奈支奈（日）　菊科

支奈者。乃中央亞細亞自生之半灌木也。高二尺餘。葉互生。其數不多。分裂為羽狀。花形頗小。集為小頭狀花序。與艾花序相似。而小尤過之。

昔時以其花煎汁。為驅蟲藥。近時以其花序製成撒恩土尼內。亦用以驅蟲。

萬壽菊（漢）金錢菊（中俗）　菊科

萬壽菊者。為亞非利加原產之一年生草。高達三四尺。葉為羽狀複葉。由帶鋸齒之小葉而成。花黃帶赤。排列為大形頭狀花序。外圍之花。有舌狀花冠。中部則成筒狀。栽培之為觀賞用。

Chrysanthemum cinerariifolium Bocc.

白蒿菜(目)　菊科

白蒿菜自生於山野為多年生草高達二三尺葉為廣披針形有三大脈葉面粗糙花色白為頭狀花序具冠毛周圍之花有舌狀花冠中部之花有筒狀花冠供觀賞用

Achillea millefolium L.

西洋鋸草(目)　菊科

西洋鋸草歐美自生為多年生草高二尺餘葉互生為羽狀複葉小葉亦分裂為羽狀花形小色白或淡紅色花序為頭狀周圍花有舌狀花冠中部花有筒狀花冠供觀賞用葉為藥用治肺結核有効

Eclipta alba *Hassk.*

鱧腸（漢）　菊科

鱧腸雜草也。自生於水邊。高達二尺餘。葉對生。為披針形。有鋸齒。其面粗糙。花小色白。排列為頭狀花序。外圍之花有舌狀花冠。中部之花為筒狀花冠。

Taraxacum officinale *Wigg.*

蒲公英（漢）　菊科

蒲公英。山野自生。為多年生草。高七八寸。葉叢生。畧呈倒披針形。有下向之大鋸齒。花莖生於葉叢間。其頂著一頭狀花序。花有黃色舌狀花冠。具冠毛。

幼葉供食用。又有健胃之效。

Bidens tripartita L.

Gerbera Anandria *Sch. Bip.*

大丁草(漢)千本鎗、紫蒲公英(回)　菊　科

大丁草。山野自生。為多年生草。高三四寸至一尺。葉類蒲公英。但有軟毛。花軸生於葉叢間。具一頭狀花序。於其頂花或白或淡紫。具淡褐色冠毛。花序外圍有舌狀花冠。中部有筒狀花冠。

狼把草(漢)田五加(日)　菊　科

狼把草。生於水田或濕地。為一年生草。高二三尺。下部之葉三裂或五裂。具粗鋸齒。上部之葉為廣披針形。亦有粗鋸齒。花有黃色筒狀花冠。排列為頭狀花序。此草能使白髮變黑。治肺結核亦有効。

Ligularia Kaempferi *S. et Z.*

Dahlia variabilis *Desf.*

橐吾（漢）　菊科

橐吾者自生於暖地海濱之草也屬多年生高二尺餘葉呈圓心臟形有長葉柄狀類款冬而質特厚且有光澤花呈黃色排列為頭狀花序周圍花有舌狀花冠中部花有筒狀花冠

供觀賞用葉柄可食

天竺牡丹（日）　菊科

天竺牡丹為墨西哥原產之多年生草高四五尺葉為羽狀複葉自卵形小葉而成花美麗色有種種排列為大頭狀花序周圍花有舌狀花冠中部花具筒狀花冠間有全部具舌狀者

供觀賞用

Lactuca sativa *L.*

萵苣（漢）　菊科

萵苣為歐羅巴原產之一年生或越年生草高達三尺餘上部之葉無柄而尖且抱莖下部之葉廣而長花有黃色舌狀花冠花序為頭狀葉供食用

Gnaphalium japonicum *Thunb.*

父子草（日）　菊科

父子草為自生於山野之雜草高達四五寸下部之葉為倒披針形而長上部之葉為披針形而短葉面呈濃綠色有光澤下面帶白色有毛花有小形帶紅色之筒狀花冠排列為小頭狀花序



Gnaphalium multiceps *Wall.*

Achillea sibirica *Ledeb.*

蓍(漢)鋸草(日)　菊　科

自生於山野。為多年生草。高達二三尺。葉互生而細長。分裂為羽狀。其狀似鋸。花或白或淡紅。排列為小形之頭狀花序。周圍之花。有舌狀花冠。中部花有筒狀花冠。供觀賞用。古以其莖用為占筮。

鼠麴草(漢)御形、母子草(日)菊　科

鼠麴草自生於山野。為草本。高達尺餘。葉互生。畧呈倒披針形。具白色軟毛。花有小形黃色之筒狀花冠。排列為小頭狀花序。以葉和餅。可供食用。

Artemisia absinthium *L.*

Lactuca Thunbergiana *Maxim.*

黃瓜菜（漢）苦菜（日）　菊　科

黃瓜菜。為山野自生之雜草。高達一二尺。葉細長。有不整齊之缺刻。花有黃色舌狀花冠。排列為頭狀花序。各花序通常成於五花果實為小形種子狀。具冠毛。其白色乳狀液有毒。

苦艾（日）　菊　科

苦艾者。歐洲原產之多年生草。亦芳香甚強。高約四尺。葉分裂為二回或三回羽狀。兩面密生絹絲狀白毛。花小。集為半球形之頭狀花序。葉及花序。為健胃劑。其實投於酒中。大有香味。



Lactuca debilis *Maxim.*

Helianthus annuus *L.*

向日葵（清）日迴（日）　菊科

向日葵。為墨西哥原產之一年生草。高六七尺。葉為卵形而互生。緣邊有鋸齒。葉面粗糙。花黃色。排列為大形之頭狀花序。周圍之花有舌狀花冠。中部之花有筒狀花冠。花托平坦。花序有向日傾斜之性。供觀賞用。或將其子榨油以點燈。

剪刀股（漢）　菊科

剪刀股。都山野自生之雜草。莖匍匐於地上。葉橢圓或長倒卵形。有長葉柄。往往具缺刻。花有黃色舌狀花冠。排列為頭狀花序。

Tragopogon porrifolius *L.*

土拉高泡個恩波路里否里吳斯(拉)　菊科

歐洲之原產二年生草。葉長而尖。根白色多肉。花作青紫色。根供食用。其味佳良。亦有栽之以觀賞者。

Coreopsis tinctoria *Nutt.*

哥來喔布席斯提痕苦土里阿(拉)　菊科

此種植物。多栽培於庭園。為一年生草。或越年生草。高達四五尺。莖葉平滑。下部之葉。為二回羽狀複葉。由細長之小葉而成。花排列為頭狀花序。外圍之花有舌狀花冠。中部之花有紫褐色之筒狀花冠。其舌狀花冠上部多黃色。下部多紫褐色。供觀賞用。

Carthamus tinctorius *L.*

Eupatorium chinense *L.*

藤袴（日）蘭草（漢）佩蘭葉　菊科

藤袴。山野自生。為多年生草。高三四尺。全部蓄香氣。葉平滑。具鋸齒。有光澤。下部葉有三裂。上部葉呈廣披針形或長橢圓形而尖。花淡紫色。有筒狀花冠。排列成頭狀花序。

觀賞用。

紅花（漢）　菊科

紅花多栽培於園圃。為越年生草。高四五尺。葉互生。為廣披針形。具銳鋸齒。畧似薊類之葉。花有紅黃色之筒狀花冠。排列成頭狀花序。總苞為葉狀。其緣邊由銳鋸齒片而成。

花冠製胭脂。種子搾油。幼莖供食用。

Zinnia elegans L.

百日草(白)秋羅　菊科

百日草。為墨西哥原產之一年生草。高二尺餘。葉對生。呈卵形或心臟形。花有紅紫青紫及白色之分。排列成大形頭狀花序。周圍花有舌狀花冠。中部花具筒狀花冠。總花托呈圓錐形。供觀賞用。

Petasites japonicus *Miq.*

款冬(漢藥　冬花)　菊　科

款冬。山野自生。為多年生草。高二尺餘。葉為圓腎臟形。具長葉柄。花莖互生長卵形之尖葉。頂有多數之頭狀花序。花有筒狀花冠。

葉柄及幼蕾。供食用。

Artemisia vulgaris *L.* var. indica *Maxim.*

艾（漢）　菊科

艾。自生於山野。為多年生草。高二三尺。葉互生。為長卵形。分裂成羽狀。下面密生灰白色毛。花有筒狀花冠。排列為小頭狀花序。花序周圍之花為雌花。中部則兩性皆有之。

幼葉和餅或團子中。可供食用。乾葉則以之製艾。

Lactuca virosa *L.*

刺苦丟葛傴謨（日）　菊科

歐洲原產之二年生草。發惡臭。形似黃瓜菜。上部葉無柄。以葉脚抱莖。莖長三尺。花有黃色舌狀花冠。

取莖中白乳狀之液而乾燥之。即為刺苦丟葛傴謨。內含麻醉性之成分。可為藥用。

Asteromnea indica *Bl.*

Erigeron annuus *Pers.*

噯里格羅恩喀奴司(拉)　菊　科

為北美原產之一年生草或多年生草高三四尺莖葉有毛葉為長倒卵形有粗鋸齒花排列為頭狀花序周圍花有白色舌狀花冠中部花有黃色筒狀花冠近年日本亦產此植物但為雜草蔓延各地呈日本固有植物之觀

雞兒腸(漢)　蝦菜(日)　馬來豆　菊　科

雞兒腸者山野自生之多年生草也高二三尺葉互生為長橢圓形而尖有大鋸齒花排列為頭狀花序周圍花有青紫色之舌狀花冠中部花具黃色之筒狀花冠全部無冠毛

幼莖供食用又為觀賞用

Viola verecunda A. Gr. ... ... 三五三
Vinca rosea L... ... 四一六
Viola Odorata L. ... 三五九
Viburnum tomentosum Thunb... ... 四七七
Viscunm album L. ... 一五四
Vitis Vinifera L. ... 三三一
Vitis Thunbergii S. et Z... ... ... 三二九
Vitex Negundo L... 四二七
Viburnum Opilus L... 四七二

W

Wikstroemia Sikokianum Fr. et Sar ... ... 三五七
Wikstrosmia Ganpi Maxim... ... ... 三五八
Woodwardia radicanssm Var. Orientalis fiirs. ... ... 一五

X

Xanthium Strumarium L... ... ... 四九七

Z

Zanthoxylum Piperitum DC. ... ... 二九五
Zantedeschia Aethiopica Spr... ... ... 七四
Zanthoxylum Schinnifolium S. et Z. ... 二九二
Zea Mays L... ... 五八
Zelkowa Acuminata Pl... ... ... 一四〇
Zephyranthes candida Herb ... ... 一〇七
Zingiber officinale Rosc ... ... 一一五
Zingiber mioga Rosc 一一六
Zinnia Elegans L... 五二〇
Zizania Aquatica L... 六三
Zizyphus vulgaris Lam Var. inermis Bge. ... ... 三二八
Zostera marina L. ... 四四
Zoysia Pungens Willd ... ... 五六

Centaurea Cyanus *L.*

羅馬加密兜列(曰)　菊　科

歐洲西部原產之多年生草。葉為細裂。有強香氣。花帶黃白色。無冠毛。

乾花即羅馬加密兜列。加水熱之。有發汗驅風之効。

Anthemis nobilis *L.*

矢車菊(曰)　菊　科

矢車菊。原產歐洲。為一年生或越年生草。高二三尺。葉莖皆具綿狀之毛。葉細長而尖。互生。花有筒狀花冠。排列為頭狀花序。其周圍之花。有青紫色紅色或白色之大形花冠。

共觀賞用

Tilia cordata Mill Var. japonica Miq. 三三二
Toluifera Balsamum L. 二八〇
Tofieldia japonica Miq 八四
Torreya nucifera S. et Z... ... ... 三一
Trachycarpus excelsa Wendl... ... ... 六九
Trachelospermum jasminoides Lemaire ... 四一五
Tragopogon porrifolius L... ... ... 五一八
Trapa natans L. ... 三六九
Trifelium repens L... 二七一
Trigonotis Peduncularis Benth.... ... 四二四
Trichosanthes cucumeroides Maxim ... 四八〇
Triticum Sativum Lam Var. Vulgare Hack 五五
Trillium Smallii Maxim... ... ... 八五
Trisetum cernuum Trin 五一
Tricyrtis Hirta Hook 一〇三
Trochodendron Araliioides S. et Z... ... 一八〇
Tropaeolum Majus L. 二九〇
Trollius Patulus Salisb 一八五
Tsuga Diversifolia Maxim.... ... ... 三七
Tsuga Sieboldi carr 三八
Tulipa Gesneriana L. 八四
Tulipa Edulis Bak ... 八三
Typha japonica Miq. 四三

U

Ulmus campestris Sm. 一四一
Ulmus Parvifolia Jacq 一三九
Ulmus montana Sm. Var. typica Maxim 一三九
Ulva Lactuca le. Jol. 三
Umbilicaria esculenta Mink ... ... 一三
Uncaria rhynchophylla Miq ... ... 四六六
Undaria Pinnatifida Sur. ... ... 五
Uragoga Ipecacuanha J. Baill... ... ... 四七〇
Urtica Thunbergiana S. et Z... ... ... 一五一
Utricularia vulgaris L. 四六一

V

Vaccaria vulgaris Host 一七四
Vaccinium japonicum Miq. ... ... 三八八
Vaccinium Vitis-idaea L... ... ... 三九二
Vaccinium Oxycoccos L... ... ... 三九二
Vanilla Planifolia Andrews. ... ... 一二三
Valeriana officinalis L. 四七八
Vallisneria Spiralis L. 四七
Veratrum nigrum L... 九七
Veratrum Stamineum Maxim... ... ... 九六
Veratrum Maximowiczii Bak. ... ... 八二
Verbena officinalis L. 四二六
Veronica Virginica L. 四五四
Veronica Anagallis L. 四五二
Veronica Buxbaumii Ten. ... ... 四五一
Veronica Agrestis L. 四五〇
Viola Hirta L. Var. japonica Maxim ... 三五〇
Victoria regia Lindl. 一七六
Vincetoxicum japonicum Morr et Dcne 四一七
Vicia Venosa Maxim. Var. Cuspidata Maxim... ... ... 二六四
Vicia Tetrasperma Moench ... ... 二六五
Viburnum Dilatatum Thunb ... ... 四七二
Vincetoxicum Sublanceolatum Maxim... 四一八
Vicia cracca L. Var. japonica Miq. ... 二六九
Vigna sinensis Hassk 二七二
Viburnum odoratissimum Ker. ... ... 四七三
Viola tricolor L. ... 三五一
Viola Patrinii Dc. Var. Typica Maxim ... 三五一
Vicia Hirsuta Koch 二七四
Viola Patrinii Dc. Var. chinensis Ginq. 三五二
Vicia Faba L... ... 二七六
Viola silvestris Kit. Var. Grypoceras A. Gr... ... ... 三五二

Smilax Herbacea L. Var. nipponica Maxim... ... ... 九五
Smilax medica Schlecht et cham 九四
Smilax china L. ... 九五
Solanum Lyratum Thunb ... ... 四四八
Solanum Melongena L. 四四六
Solanum tuberosum L. 四四四
Solanum nigrum L... 四四二
Solidago virgaurea L. 四九〇
Sophora Flavescens Ait Var. Galegoides Hemsl ... ... 二七〇
Sophora japonica L... 二六四
Spilanthes oleracea Jacq ... ... 五〇五
Spinacea oleracea Mill. 一六五
Spiraea Prunifolia S. et Z. ... ... 二四七
Spiraea japonica L. F. 二四八
Spiraea cantoniensis Lour ... ... 二四五
Spiraea Thunbergii Sieb ... ... 二四五
Spirodela Polyrhiza Schleid... ... ... 七七
Spirogyra arcta ... 二
Stachys Sieboldi Miq. 四三九
Stachyurus Praecox S. et Z... ... ... 三五四
Stachys Aspera Michx Var. japonica Maxim... ... ... 四三〇
Stauntonia Hexaphylla Dene. ... ... 一九五
Stellaria media Vill... 一七五
Stellaria aquatica Scop ... ... 一七二
Stemona Sessilifolia Miq ... ... 八一
Stephanadra Flexuosa S. et Z... ... ... 二四八
Sterculia Platanifolia L... ... ... 三三九
Stewartia Pseudocamellia Maxim ... 三四三
Stewartia monadelpha S. et Z... ... ... 三四四
Strobilanthes japonicus Miq. ... ... 四六二

Strophanthus Hispidus DC. ... ... 四一五
Strychnos nux vomica L... ... ... 四一〇
Styrax benzoin Dryand 四〇一
Styrax japonica S. et Z... ... ... 四〇二
Swertia chïnensis Franch.. ... ... 四一三
Syringa vulg ris L... 四〇九
Swertia bimaculata Clark ... ... 四一〇
Swietenia Mahagoni L. 三〇二

T

Tagetes erecta L. ... 五一一
Tamerindus indica L. 二七八
Tamarix chinensis Lour ... ... 三五〇
Taonabo japonica Szysz ... ... 三四五
Taraxacum officinale wigg ... ... 五一三
Tarus cuspidata S. et Z. 三〇
Tecoma Grandiflora Loisel ... ... 四五八
Tectona Grandis L... 四二七
Tetragonia expansa Ait, 一七〇
Thalictrum minus L. Var. elatum Lecoy 一八一
Thalictrum aquilegifolium L. ... ... 一八四
Thea japonica Nois... 三四三
Thea Sinensis L. ... 三四二
Thea Sasanqua Nois... 三四二
Thlaspi arvense L... 二一六
Theobroma cacao L... 三四〇
Themeda Forskali Hack Var. japonica Hack ... ... 六五
Thermopsis Fabacea DC. ... ... 二七五
Thesium chinense Turcy ... ... 一五二
Thuja orientalis L... 三六
Thuja japonica Maxim 三五
Thymus Serpyllum L. Var. Vulgaris Benth 四三一
Thujopsis dolabrata S. et Z. ... ... 三三
Tilia Miqueliana Maxim... ... ... 三三三

Rosa rugosa Thunb... 二五四
Rosa multiflora Thunb 二五四
Rosa Wichuraiana Crep ... ... 二五六
Rosa centifolia L... 二五一
Rosa indica L... ... 二三九
Rosmarinus officinalis L... ... ... 四四一
Rubia tinctorum L... 四七〇
Rubia chinensis Rql. et Maack ... ... 四六六
Rubia cordifolia L. var. Mungista Miq. 四六四
Rubus trifidus Thunb 二四〇
Rubus Palmatus Thunb ... ... 二四一
Rumex japonicus Meisn ... ... 一六〇
Rumex acetosa L. ... 一六一
Ruscus aculeatus L.... 一〇〇
Ruta Graveolens L... 二九六

S

Sabia japonica Maxim 三二六
Saccharomyces... ... 八
Saccharum officinarum L. 五五
Sagina Linnaei Presl. var. Maxima Maxim 一七五
Sagittaria Sagittifolia L. var. Longiloba Turcy ... ... 五四
Sagus Rumphii Willd. 六九
Sagittaia sagittifolia L. 四六
Salix babylonica L... 一二七
Salsola soda L... ... 一六四
Salvia japonica Thunb var. bitinnata Fr. et Sav. ... ... 四二九
Salvia nippoica Miq. 四三五
Salvia officinalis L... 四三六
Salvinia natnas Hoffm 二四
Sambucus racemosa L. 四七六
Sambucus javanica Bl. 四七五
Sambucus nigra L... 四七四
Sanicula Sinensis Bge. 三七八
Santalum album L... 一五三
Sapindus Mukurosi Gaertn... ... ... 三二四
Sapium Sebiferum Roxb ... ... 三〇九
Saponaria officinalis L. 一七四
Sarracenia Purpurea L 二二一

Sassafras officinale Nees ... ... 二〇八
Saussurea Affinis Spr 五〇四
Saxifraga Cortusaefolia S. et Z... ... 二三一
Saxifraga Sarmentosa L... ... ... 二三三
Scabiosa japonica Miq. ... ... 四七九
Sciadopitys Verticillata S. et Z. ... ... 三四
Scilla maritima L. ... 八八
Scirpus Lacustris L. Var. tabernaemontani Trautv... ... 六七
Schiyocodon Soldanelloides S. et Z. ... 三九五
Schiyophragma Hydrangeoides S. et Z... ... ... 二二八
Scrophularia oldhami oliv. ... ... 四五五
Scoryonera Hispanica L... ... ... 五〇三
Scopolia japonica Maxim... ... . 四四七
Scrophularia Kakudensis Fr. ... ... 四五二
Scutellaria indica L. Var. japonica Maxim... ... ... 四三八
Sedum Sieboldi Sweet 二二六
Sedum Purpureum Link ... ... 二二五
Sedum Lineare Thunb 二二四
Sedum kamtschaticum Fisch ... ... 二二五
Selaginella Kraussiana A. Br. ... ... 二八
Selaginella caulescens Sprinq ... ... 二八
Selaginella involvens Sprinq ... ... 二七
Seseli Libanotis Koch 三七七
Sesamum indicum L... ... ... 四五九
Setaria viridis Beauv 四九
Setaria italica Kth Var. Germanica Trin ... ... 四八
Silene Armeria L. ... 一七六
Shorea robusta Roxb 三四九

Prunus cerasus L... 二五八
Prunus Persica S. et Z. var. vulgaris Maxim... ... ... 二五七
Prunus tomentosa Thunb ... ... 二五八
Prunus Laurocerasus L... ... ... 二五七
Pseudopyxis Longituba Fr. et Sav. ... 四六五
Psidium Guajava Radd ... ... 三六六
Pteris Cretica L. ... 一八
Pteris Serrulata L. F. 一五
Pteridium Aquilinum Kuhn ... ... 一九
Pteris serrulata L. ...
Pterscarpus Marsupium Roxb... ... 二六七
Pterocarya Rhoifolia S. et Z... ... ... 一二九
Ptetocarpus Santalinus L. F. ... ... 二七三
Pueraria Thuubergiana Benth ... ... 二六九
Punica Granatum L. 三六三
Pyenostelma chinensis Bge. ... ... 四一九

Q

Quamoclit vulgaris chois ... ... 四二二
Quassia Amara L. ... 二九九
Quercus acuta Thunb 一三三
Quercus variabilis Bl. 一三三
Quercus Phyllireoides A. Gr... ... ... 一三四
Quercus Dentata Thunb ... ... 一三五
Quercus Serrata Thunb 一三五
Quercus Glandulifera Bl. ... ... 一三六
Quercus Suber L. ... 一三八
Quercus Glauca Thunb 一三七
Quillaja Saponaria Mol ... ... 二五九
Quisqualis indica L... 三六四

R

Ranunculus Pensylvanicus L. F. var. japonicus Maxim... 一八三

RanunculusAcerL.var. japonicus Maxim... 一八四
Ranunculus Sceleratus L... ... ... 一八九
Raphanus Sp... ... 二二一
Raphanus Satinus L. 二一八
Ravenala madagascariensis Sonn... ... 一一四
Reineckia carnea kth 八九
Rehmannia Lutea Maxim... ... ... 四五七
Rhamnus japonicus Maxim var. Genuina Maxim ... ... 三二七
Rhaphiolepis japonica S. et Z... ... ... 二四九
Rhedea japonica Roth 八六
Rheum officinale Baill 一六二
Rhizopogon rubescens Tul. ... ... 一二
Rhizophora mucronata Lam ... ... 三六三
Rhus vernicifera DC. 三一一
Rhododendron indicum Sw. var. obtusum Maxim ... 三九一
Rhododendron quinquefolium Biss. et Mre ... ... 三九一
Rhododendron indicum Sw. var. macranthum maxim... 三九三
Rhododendron Metternichii S. et Z. ... 三九三
Rhodotypas Kerrioides S. et Z... ... ... 二五〇
Rhodomyrtus tomentosa Wight... ... 三六五
Rhus trichocarpa Miq 三一四
Rhus succedanea L. 三一三
Rhus toxicodendron L. var. radicans Miq. 三一二
Rhus Semi—alata Murr. var. Osbeckii DC. ... ... 三一三
Rhynchosia volubilis Lour ... ... 二七九
Ribes Grossularia L. 二三〇
Ricinus communis L. 三〇七
Robinia Pseudoacacia L... ... ... 二八七
Roccella tinctoria DC. 一四

Pinus Pentaphylla Mayr ... ... 三六
Pinus densiflora S. et Z... ... ... 三二
Pinus thunbergii, Parl 三三
Piper nigrum L. ... 一二四
Piper cubeba L. ... 一二五
Pirola elliptica Nutt 三八七
Pirus spectabilis Ait 二三九
Pirus communis L... 二五二
Pirus malus L... ... 二五一
Pirus Sinensis Lindl. 二五三
Pistacia Lentiscus L. 三一二
Pisum Sativum L... 二六五
Pittosporum undulátum Vent ... 二三四
Pittosporum tobira Ait. ... ... 二三三
Plantago Major L. var. Asiatica Dene 四六三
Platycodon Grandiflorus DC. ... ... 四八六
Plectranthus Longitubus Miq. ... ... 四二九
Plectranthus Excisus Maxim... ... ... 四三三
Plygonum cuspidatum S. et Z... ... ... 一五七
Poa Annua L... ... 四八
Podocarpus Nageia R. Br. ... ... 三一
Podophyllum peltatum L... ... ... 一九八
Podocarpus chinensis Wall. ... ... 三二
Polygala Reinii Fr. et Sav... ... ... 三〇二
Polygala Senega L... 三〇三
Polygala japonica Houtt ... ... 三〇三
Polygonum virginianum L... ... ... 一六三
Polygonum orientale L. var. Pilosum Meisn ... ... 一五九
Polygonum thunbergii S. et Z... ... ... 一六二
Polygonum japonicum Meisn ... ... 一六〇
Polygonum nodosum Pèrs ... ... 一五九
Polygonum Bistorta L. 一五八

Polygonum Posumbu Ham var. Blumei Matsum. ... ... 一五八
Polygonum Perfoliatum L... ... ... 一五七
Polygonatum officinale Allo ... ... 八三
Polygonum tinctorium Lour ... ... 一五六
Polypodium tricuspe Sw. ... ... 一七
Polypodium vulgare L. var. japonicum Fr. et Sav... ... 一七
Polytrichum commune L... ... ... 一五
Populus balsamifera L. var. Swaveolens Loud ... ... 一二八
Porphyra tenera Kjellm... ... ... 六
Portulaca oleracea L. 一七〇
Portulaca Grandiflora Hook ... ... 一七一
Potamogeton crispus L... ... ... 四四
Potentilla Kleiniana W. et A. ... ... 二三八
Potentilla chinensis Ser. ... ... 二四一
Potentilla Fragarioides L... ... ... 二四四
Potentilla Fruticosa L 二四六
Pourthiaea villosa Dene ... ... 二四二
Primula japonica A. Gr. ... ... 三九七
Prinellia tuberifera Ten. ... ... 七四
Primula cortusoides L. 三九八
Prunella vulgaris L. 四三一
Prunus Amygdalus Stokes ... ... 二三六
Prunus Armeniaca L. var. Ansu Maxim 二三七
Prunus Mume S. et Z. 二三七
Prunus Pseudocerasus Lindi ... 二四六
Prunus communis Huds ... ... 二五〇
Prunus japonica Thunb ... ... 二五三

Ophiopogon japonicus Ker. ... ... 九六
Orchis militaris L... 一二一
Oreodoxa oleracea Mart ... ... 六八
Orixa japonica Thunb 二九四
Oryza Sativa L. ... 四九
Osmanthus Aquifolium B. et H. ... ... 四〇七
Osmanthus Fragrans Lour ... ... 四〇七
Osmunda regalis L. Var. japonica Milde 二三
Oxalis corniculata L. 二八九
Ourouparia gambir Baill ... ... 四六四

P

Paeonia Albiflora Pall 一八六
Paeonia Moutan Ait. 一九二
Palaquium Gutta Burck ... ... 三九九
Panax Ginseng C. A. Mey ... ... 三七四
Pandanus Odoratissimus L... ... ... 四三
Panicum Crus Galli L. 六〇
Panicum Frumentaceum Roxb... ... 六二
Panicum miliaceum L... ... ... 五三
Papaver Somniferum L... ... ... 二一〇
Papaver Rhoeas L... 二一二
Parnassia Palustris L. 二二九
Parthenocissus tricuspidata Pl. ... ... 三二九
Pasania cuspidata Oerst ... ... 一三七
Paspalum Thunbergii Kth. ... ... 五八
Patrinia villosa Juss 四七七
Patrinia Scabiosaefolia Link ... ... 四七八
Paulownia tomentosa H. Bn ... ... 四五三
Pedicularis resupinata L... ... ... 四五七
Pennisetum japonicum Trin ... ... 五九
Penicillium Crustaceum L... ... ... 七

Perilla nankinensis Dcne ... ... 四三七
Pertya Scandens Sch. Bip. Var. ovata. Maxim... ... ... 四九八
Petasites japonicus Miq. ... ... 五二〇
Phascolus vulgaris L. 二六二
Pharbitis Hederacea L... ... ... 四一九
Phascolus Mungo L. Var. Subtrilobata (Fr. et Sav.) Matsum 二六〇
Phellopterus Littoralis Fr. Schm ... ... 三八三
Phellodendron Amurense Rupr... ... 二九三
Phoenix Dactylifera L. 七一
Phlox Paniculata L. 四二二
Phormium tenax Forst ... ... 一〇三
Photinia Glabra Thunb 二四〇
Phragmites communis Trin ... ... 六四
Phteirospermum chinense Bge ... ... 四五六
Phyllostachys mitis Rir. ... ... 六二
Phyllostachys Puberula Munro ... ... 六一
Phyllanthus Urinaria L... ... ... 三〇七
Physalis Alkekengi L. 四四九
Physlis Angulata L... 四四四
Physosgma venenosum Balf ... ... 二六六
Phyteuma japonicum Miq ... ... 四八七
Phytelephas macrocarpa Ruiz... ... 六八
Phytolacca acinosa Roxb. Var. esculenta Maxim ... ... 一六九
Picris Hieracioides L. Var. japonica Rgl. 四九八
Picrasma quassioides Benn ... ... 二九九
Pilocarpus pinnatifolius Lem ... ... 二九七
Pinguicula vulgaris L. 四六二
Pinus koraiensis S. et Z. ... ... 三九

Magnolia Obovatia Thunb ... ... 二〇二
Magnolia Kobus DC. 二〇一
Mallotus Philippinensis Muel Arg ... 三〇六
Mallotus japonicus Muel Arg ... ... 三〇四
Malva sylvestris L... 三三五
Mangifera indica L. 三一四
Marchantia polymorpha L. ... ... 一四
Marlea Platanifolia S. et Z. ... ... 三八五
Marsilia quadrifolia L. 二四
Matricaria chamomilla L... ... ... 五〇二
Mazus rugosus Lour Var. macranthus Fr. et Sav ... ... 四五六
Medicago Denticulata Willd. ... ... 二六三
Melaleuca Leucadendron L... ... ... 三六四
Melia japonica Don... 三〇一
Melilotus officinalis Desr ... ... 二八五
Meliosma myriantha S. et Z... ... ... 三二五
Mentha arvensis L. var. piperascens Holmes... ... ... 四四〇
Mespilus canescens Matsum. ... ... 二四七
Mesua Ferrea L. ... 三四七
Metaplexis Stauntoni R. et S... ... ... 四一七
Michelia Compressa Maxim ... ... 二〇二
Mimosa pudica L. ... 二七八
Mirabilis Jalapa L. 一六九
Miscanthus tinctorius Hack ... ... 五二
Miscanthus Sinensis Anders... ... ... 五七
Momordica Charantia L... ... ... 四八三
Monotropa unifiora L. 三八七
Morus alba L... ... 一四五
Mosla Punctata Maxim... ... ... 四三〇
Musa Basjoo sieb ... 一一三
Musa Sapientum L... 一一三

Myristica Fragrans Houtt ... ... 二〇五
Myroxylon Pereirae Klotysch. ... ... 二八四
Myrica Rubra S. et Z. 一二八

N

Najas Major All. ... 四五
Nandina Domestica Thunb ... ... 一九七
Nanocnide japonica Bl. 一五一
Narcissus Tazetta L. Var. chinensis Roem 一〇七
Narcissus jonquilla L. 一〇六
Nasturtium montanum Wall ... ... 二一四
Nasturtium officinale R. Br... ... ... 二一五
Nasturtium Palustre DC... ... ... 二一七
Nelumbo nucifera Gaertn... ... ... 一七八
Nepeta Glechoma Benth ... ... 四三二
Nepenthes Rafflesiana Jack ... ... 二二二
Nephrolepis Cordifolia Presl. ... ... 二一
Nephrodium Filix-mas Rich ... ... 二二
Nephelium Longana Camb ... ... 三二四
Nephelium Litchi Camb ... ... 三二五
Nerium odorum Soland... ... ... 四一四
Nicotiana tabacum L. 四四五
Nuphar japonicum DC. ... ... 一七七
Nymphaea tetragona Georq Var. angustata Casp ... ... 一七九

O

Oenanthe stolonifera DC... ... ... 三八〇
Oenothera biennis L. Var. Lamarckiana Ser. ... ... 三六八
Oenothera odorata Jacg ... ... 三七〇
Olea europaea L. ... 四〇四

Ligularia Kaempferi S. et Z... ... ... 五一五
Ligustrum japonicum Thunb ... ... 四〇六
Ligustrum Ibota Sieb 四〇三
Ligustrum medium Fr. et Sav. ... ... 四〇四
Lilium Cordifolium Thunb ... ... 八五
Lilium japonicum Thunb ... ... 九四
Lilium tigrinum Gawl 八六
Lilium Speciosum Thunb ... ... 八九
Lilium avenaceum Fisch ... ... 九二
Lilium Maximowiczii Rql. ... ... 九三
Lilium Longiflorum Thunb ... ... 九九
Limnanthemum indicum Griseb ... ... 四一一
Limnanthemum nymphoides Link Var. japonicum Miq. ... ... 四一一
Lindernia crustacea F. V. M. ... ... 四四九
Lindera Praecox Bl... 二〇五
Lindernia angustifolia Wetts ... ... 四五〇
Lindera sericea Bl... 二〇七
Linaria japonica Miq. 四五一
Linum usitatissimum L... ... ... 二九〇
Lippia citriodora Kth 四二八
Liquidambar orientalis Mill. ... ... 二三五
Liquidambar formosanum Hce ... ... 二三五
Litsea Glauca Sieb ... 二〇九
Lithospermum officinale L... ... ... 四二四
Livistonia chinensis Br... ... ... 七一
Llium Auratum Lindl 一〇五
Lobelia inflata L. ... 四八九
Lobelia sessilifolia Lamb ... ... 四八七
Lolium temulentum L. 六三
Lonicera Gracilipes Miq. ... ... 四七一

Lonicera Morrowii A. Gr... ... ... 四七三
Lonicera japonica Thunb ... ... 四七四
Lophanthus rugosus Fisch ... ... 四三三
Dotus corniculatus L. var. japonicus Rgl. ... ... 二八五
Luffa cylindrica Roem ... ... 四八五
Luznla campestris DC. Var. capitata Miq. ... ... 八一
Lycopersicum esculentum Mill... ... 四四三
Lychnis coronata Thunb ... ... 一七三
Lycoris Sanguinea Maxim... ... ... 一〇六
Lycium chinense Mill 四四三
Lycopus europaeus L. Var Parvifolius Miq. ... ... 四三四
Lycopus europaeus L. ... ... 四三八
Lycopodium serratum Thunb ... ... 二六
Lycopodium clavatum L... ... ... 二七
Lycoris radiata Herb 一〇八
Lygodium japonicum Sw. ... ... 二三
Lysimachia Vulgaris L... ... ... 三九七
Lysimachia japonica Thunb ... ... 三九八
Lysimachia Clthrodies Duby ... ... 三九九
Lythrum virgatum L. 三六二

M

Machilus Thunbergii S. et Z... ... ... 二〇六
Macleya cordata R. Br. ... ... 二一一
Macroclinidium Robustum Maxim ... 四九九
Magnolia hypoleuca S. et Z. ... ... 二〇三
Magnolia conspicua Salesb ... ... 二〇三

Hypericum Ascyron L. 三四七
Hypericum Patulum Thunb ... ... 三四六
Hypericum erectum Thunb ... ... 三四五

I

Idesia Polycarpa Maxim... ... ... 三五四
Ilex crenata Thunb... 三一五
Ilex Sieboldi Miq ... 三一六
Ilex Pedunculosa Miq 三一六
Ilex Latifolia Thunb 三一七
Ilex macropoda Miq. 三一五
Ilex Paraguayensis Lambert. ... ... 三一七
Ilex integra Thunb... 三一八
Illicium anisatum L. 二〇二
Impatiens Balsamina L. 三二六
Imperata arundinacea Cyr. ... ... 五九
Indigofera Pseudo-tinotoria Matsum... 二七一
Inula Salicina L. ... 四九九
Inula britanica DC... 四九五
Ipomoea batatas Lam. 四二〇
Iris Laevigata Fisch. Var. Kaempferi Sieb. ... ... 一一二
Iris Sibirica L. Var. orientalis Thunb... 一〇九
Iris Laevigata Fisch 一一〇
Iris tectorum maxim 一一〇
Iris japonica Thunb... 一一一
Isatis tinctoria L. ... 二八一

J

Jambosa caryophyllus Ndz. ... ... 三六五
Jambosa vulgaris DC. 三六六
Jasminum odoratissimum L... ... ... 四〇五
Jasminum Grandiflorum L. ... ... 四〇五
Jasminum nudiflorum Lindl ... ... 四〇八
Jatrorrhiza Palmata 二〇〇
Juglans Sieboldiana Maxim... ... ... 一二九
Juniperus rigida S. et Z... ... ... 四〇
Juniperus chinensis L. 四一

Juniperus communis L... ... ... 三九
Juncus Prismatocarpus R. Br. Var. Leschenaultii F. Buch ... ... 八〇
Juncus effusus L. Var. decipiens F. Buch 八〇
Justicia Procumbens L. 四六三

K

Kadsura japonica Dun 二〇一
Kerria japonica DC. 二五八
Kochia Scoparia Schrad... ... ... 一六六
Kraunhia Floribunda Jaub ... ... 二八三

L

Lactuca brevirostris Champ... ... ... 四九〇
Lactuca sativa L. ... 五一四
Lactuca Debilis Maxim... ... ... 五一九
Lactuca Thunbergiana Maxim... ... ... 五一六
Lactuca virosa L. ... 五二三
Lagenaria vulgaris Ser 四八四
Lagenaria vulgaris Ser. ... ... 四八六
Legerstroemia indica L... ... ... 三六二
Lamium album L. ... 四三二
Lamium amplexicaule L... ... ... 四四〇
Laminaria japonica Aresch... ... ... 三
Larix Leptolepis Gord 四一
Laurus nobilis L. ... 二〇八
Lathyrus Davidii Hce 二六一
Lavandula vera DC... 四四一
Leontopodium japonicum Miq. ... ... 四九三
Lespedeza juncea pers Var. Sericea Hemsl 二八六
Lespedeza bicolor Turcy ... ... 二八二
Lespeeeza Buergeri Miq. ... ... 二六八
Leucothoe keiskei Miq 三九〇
Leucothoe Grayana Maxim... ... ... 三九五

Geranium Eriostemon Fisch ... ... 二八七
Gerbera Anandria Sch. Bip. ... ... 五一二
Geum japonicum Thunb ... ... 二五二
Ginkgo biloba L. ... 二九
Glaucidium Palmatum S. et Z... ... ... 一九一
Gleditschia japonica Miq. ... ... 二七二
Gleichenia Longissima Bl... ... ... 二二
Glycyrrhiza glabra L. 二六七
Glycine Hispida Maxim... ... ... 二七七
Gnaphalium multiceps Wall ... ... 五一七
Gnaphalium japonicum Thunb ... ... 五一四
Gnaphalium Hypoleucum DC. ... ... 四九一
Gomphrena globosa L... ... ... 一六八
Gossypium Herbaceum L. ... ... 三三八
Gracilaria Confervoides Grev. ... ... 六
Guajacum officinale L. 二九一
Gynostemma Pedata Bl... ... ... 四八〇
Gynura pinnatifida DC. 五〇七

H

Habenaria radiata Thunb ... ... 一二〇
Haematoxylon campechianum L. ... 二七九
Hagenia abyssinica Willd ... ... 二四三
Hamamelis japonica S. et Z. ... ... 二三六
Halorrhagis micrantha R. Br.... ... ... 三七〇
Halesia Hispida B. et H... ... ... 四〇二
Hedera Helix L. ... 三七二
Helescharis Plantaginea R. Br... ... 六六
Helianthus annuns L. 五一九
Heloniopsis brevicapsa Maxim... ... ... 九八

Helwingia rusciflora Willd ... ... 三七五
Hevea guyanensis Aubl ... ... 三〇八
Hevea guyanensis Aubl ... ... 三〇四
Hibiscus coccineus Walt ... ... 三三七
Hibiscus syriacus L... 三三七
Hibiscus mutabilis L. 三三六
Hibiscus manihot L... 三三六
Hirneola Polytricha Fr. Schroet... ... 一〇
Hnmulus japonicus S. et Z. ... ... 一四五
Hordeum Satinum Jess 五〇
Hosta Coerulea Tratt 九〇
Hosta Sieboldiana Engl 九七
Houttuynia cordata Thunb ... ... 一二四
Hovenia dulcis Thunb 三二八
Hoya carnosa R. Br. 四一八
Humulus Lupulus L. 一四九
Humulus Lupulus L. Var. Cordifolius Maxim... ... ... 一四六
Hyacinthus orientalis L... ... ... 一〇四
Hydrangea Hortensia DC. var. Azisai A. Gr. ... ... 二二六
Hydrangea Thunbergii Sieb. ... ... 二二七
Hydnum olidum Berk ... ... 一〇
Hydrilla verticillata Casp var. Roxburghii casp. ... ... 四六
Hydrosme Rivieri Engl. ... ... 七六
Hydrangea involucrata Sieb. ... ... 二三一
Hydrocharis Asiatica Miq. ... ... 四七
Hydrangea Paniculata Sieb ... ... 二三二
Hydrastis canadensis L... ... ... 一九七
Hydrocotyle rotundifolia Roxb ... ... 三八一
Hyoscyamus niger L. 四四七
Hypericum chinense L. 三四八

Erythronium Denscanis L. ... ... 八八
Erythroxylon Coca Lam ... ... 二九一
Erythraea centaurium Pers ... ... 四一二
Eranthis Pinnatifida maiim ... ... 一八八
Eucalyptus globulus Lab. ... ... 三六七
Euonymus europaea L. 三二一
Euonymus japonica Thunb ... ... 三二一
Euonymus Alatas K. Koch ... ... 三二〇
Euonymus japonica Thunb var. radicans Miq. ... ... 三二〇
Euonymus japonica Thunb var. radicans Miq. ... ... 三二〇
Euonymus Oxyphylla Miq. ... ... 三一九
Euonymus alatas K. Koch var. subtriflora Fr. et Sav ... 三一八
Eupatoriumchinense L. 五二一
Euphrasia officinalis L. 四五五
Euphorbia Pekinensis Rupr ... ... 三〇八
Euriale Ferox Salisb 一七七
Eurya japonica Thunb 三四四
Eurya ochnacea Szysy 三四一
Evodia rutaecarpa Benth ... ... 二九五
Exoascas cerasi Sadebeck ... ... 九
Exogonium Purga Benth ... ... 四二一

F

Fagopyrum esculentum Moench... ... 一六一
Fagus Sylvatica L. Var. Sieboldi Maxim... ... ... 一三八
Fagus japonica Maxim 一三四
Fatoua Pilosa Gaud Var. subcordata Rapr ... ... 一四六
Fatsia japonica Dene. et Planc. ... ... 三七六

Ferula asa Foetida L... ... ... 三七七
Ficus Wightiana wall 一四一
Ficus carica L... ... 一四二
Ficus Erecta Thuub. 一四三
Ficus retusa L. Var. nitida Miq... ... 一四四
Ficus Elastica L. ... 一四七
Ficus Elastica L. ... 一五〇
Ficus religiosa L. ... 一四九
Foeniculum officinale All. ... ... 三七八
Formes japonicus Fr. 一二
Forsythia Suspensa Vahl ... ... 四〇八
Fragaria virginiana Ehrh ... ... 二三八
Fraxinus Longicuspis S. et Z... ... ... 四〇三
Fraxinus Bungeana Dc. Var. Pubinervis Wg. ... ... 四〇六
Fritillaria Camtschatensis Gaud... ... 九二
Fuchsia macrostemma Ruitz. et Par ... 三八九

G

Galactodendron utile H. B. ... ... 一四七
Galium aparine L. ... 四七一
Galium verum L. Var. Lacteum Maxim ... 四六七
Galium boreale L. var. japonicum Maxim. 四六八
Garcinia morella Desv 三四六
GarciniaMangostanaL. 三四八
Gardenia Florida L... 四六八
Gaultheria Adenothriz Maxim ... ... 三八八
Gelidium cartilagineum Grev ... ... 七
Gentiana Lutea L... 四一二
Gentiana Frigida Haenk Var. Algida Pall. ... ... 四一三
Gentiana Scabra Bqe. Var. Buergeri Maxim... ... ... 四一四
Geranium nepalense Sweet ... ... 二八八
Gerenium yezoense Fr. et Sav ... ... 二八八

Daphniphyllum macropodum Miq. ... 三一〇
Datura alba Nees ... 四四六
Daucus carota L. ... 三八三
Davallia Bullata Wall 二一
Deinanthe bifida Maxim... ... ... 二二九
Dendrobium moniliforme Sw. ... ... 一二二
Dendropanax japonicum Seem ... ... 三七二
Desmodium Podocarpum DC. Var. japonicum Maxim 二八一
Deutzia Scabra Thunb 二二八
Dianthus Superbus L. 一七二
Dianthus chinensis L. 一七三
Dianella odorata Bl. 九二
Dianthus chinensis L. 一七三
Dianthus barbatus L. 一七一
Dicentra pusilla S. et Z... ... ... 二一一
Diervilla japonica DC. 四七五
Diervilla grandiflora S. et Z... ... ... 四七六
Digitalis purpurea L. 四五八
Dionaea muscipula L. 二二三
Dioscorea japonica Thunb ... ... 一〇九
Diospyros Lotus L. ... 四〇一
Diospyros Peregrina Giirke ... ... 四〇〇
Diospyros Kaki L. f. 四〇〇
Diphylleia Grayi Fr. Schm ... ... 一九六
Dipsacus Fullonum L. 四七九
Distylium racemosum S. et Z. ... ... 二三四
Disporum Smilacinum A. Gr.... ... ... 九九
Dolichos Lablab L. ... 二八四
Dorema ammoniacum Don. ... ... 三七六
Drosera rotundifolia L. 二二三
Drosera lunata Buch 二二二
Dryobalanops camphora coleb ... ... 三四九
Draba nemorosa L. var. Hebecarpa, Ledeb ... ... 二一四
Duchesnea indica Fock ... ... 二五五

E

Ecklonia bicyclis Kjellm... ... ... 四

Ecklonia cava Kjellm 四

Eclipta alba Hassk... 五一三

Edgeworthia chrysantha Lindl. ... 三六〇

Elaeagnus umbellata Thunb... ... ... 三六〇

Elaeagnus Pungens Thunb ... ... 三六一

Elaeagnus longipes A. Gr. ... ... 三六一

Elettaria cardamomum white et maton ... ... 一一六

Eleusine indica Gaertn... ... ... 六〇

Empetrum nigrum L. 三一〇

Enkianthus japonicus Hook ... ... 三九四

Enteromorpha compressa Grev... ... 二

Ephedra vulgaris Rick var. Helvetica H. et T. ... ... 四二

Epilobium pyruicholophum Fr. et Sav. 三六七

Epilobium japonicum Hassk ... ... 三六八

Epigaea asiatica Maxim... ... ... 三八九

Epimedium macranthum Morr et Dene 一九六

Epipactis Falcata Thunb ... ... 一一八

Epipactis erecta Thunb ... ... 一一九

Epiphyllum truncatum Hav ... ... 三五六

Equisetum arvense L. 二五

Equisetum Hiemale L... ... ... 二六

Eragrostis Ferruginea Beauv ... ... 五一

Erigeron annuns Pers 五二二

Erigeron Linifolius Willd ... ... 四九二

Eriocaulom nipponicum, Maxim. ... 七八

Eriobotrya japonica Lindl ... ... 二五五

Colchicum autumnale L... ... ... 九三
Convallaria majalis L. 九〇
Conandron ramondioides S. et Z. ... 四六一
Conium maculatum L. 三八二
Copitis quinquefolia Miq. ... ... 一八六
Copaifera officinalis L. 二七〇
Coptis japonica Makino ... ... 一九三
Corchoropsis crenata S. et Z... ... ... 三三一
Corchorus capsularis L 三三二
Coreopsis Drummondii Torr. et Gr... ... 五〇四
Coreopsis tinctoria Nutt ... ... 五一八
Coriaria japonica A. Gr. ... ... 三一一
Coriandrum sativum L.... ... ... 三八〇
Cornus ignorata C. Kock ... ... 三八五
Cornus officinalis S. et Z. ... ... 三八六
Cortinellus shiitake Henn ... ... 一一
Cortinellus edodes Henn ... ... 一一
Corton tiglium L... 三〇九
Cortinellus edodes Henn ... ...
Corydalis incisa Pers. 二一二
Corylus Heterophylla Fisch ... ... 一三一
Corylus rostrata Ait Var. Sieboldiana Maxim... ... ... 一三一
Crataeva religiosa Forst ... ... 二一三
Crepis japonica Benth 四九七
CrotalariaSessilifloraL. 二七四
Crocus sativus L ... 一一一
Croton Eluteria Benn 三〇六
Cryptomeria japonica Don. ... ... 三八
Cryptotaenia japonica Hassk ... ... 三八四
Cucumis Sativus L... 四八一
Cucurbita maxima Duch ... ... 四八三

Cucumis nelo L. ... 四八五
Cunninghamia sinensis R. Br... ... ... 三五
Curcuma longa L. Var macrophylla Miq. ... ... 一一四
Cuscuta japonica Chois Var. thyrsoidea Enqelm... ... 四二〇
Cyathea Spinulosa Wall ... ... 一六
Cycas revoluta thunb. 二九
Cydonia vulgaris Pers. 二五六
Cydonia japonica Pers. Var. Pygmaea Maxim... ... ... 二四三
Cydonia sinensis Thouin... ... ... 二四四
Cymbidium Ensifolium Sw. ... ... 一二二
Cymbidium virens Lindl ... ... 一二三
Cynanchum caudatum Maxim... ... ... 四一六
Cynodon Dactylon Pers. ... ... 五三
Cynoglossum furcatum Wall ... ... 四二三
Cyperus amuricus Maxim Var. japonica Maxim ... ... 六六
Cyperus tegetiformis Roxb ... ... 六七
Cypripedilum japonicum Thunb ... ... 一一九
Cystophyllum fusiforme Harv ... ... 五
Cypripdilum macranthum Sw. Var. ventricosum Rchb. f... 一一七
Cytisus Scoparius Link ... ... 二六三

D

Damnacanthus indicus Gaertn... ... ... 四六五
Dahlia variabilis Desf 五一五
Daphne Genkwa S. et Z... ... ... 三五九
Daphne odora Thunb 三五九
Daphne Pseudo-meyereum A. Gr... ... 三五七

Castanea vulgaris Lam Var. japonica DC... 一三六
Catalpa kaempferi S. et Z. ... ... 四五九
Cedrela chinensis Juss 三〇一
Ceiba pentandra Gaertn... ... ... 三三九
Celastrus articulatus Thunb ... ... 三一九
Celosia cristata L. ... 一六七
Celtis Sinensis Pers... 一四〇
Centaurea cyanus L... 五二四
Cephalotaxus drupacea S. et Z. ... ... 三〇
Cercidiphyllum japonicum S. et Z... ... 一八〇
Cereus multiplex Pleiff 三五六
Ceratophyllum demersum L... ... ... 一七九
Cercis chinensis Bge.. 二八三
Cetraria islandica Ach 一三
Chamaecyparis obtusa S. et Z. ... ... 四〇
Chamaecyparis pisifera S. et Z... ... 三七
Chamaele tenera Miq. 三八一
Chamaesaracha japonica Fr. et sav. ... 四四二
Chelidonium Majus L. 二一〇
Chelonopsis moschata Miq. ... ... 四三七
Chenopodium album L. 一六三
Chlorophytum comosum Bak ... ... 八七
Chloranthus serratus R. et S. ... ... 一二七
Chloranthus brachystachys Bl. ... ... 一二五
Chloranthus japonicus Sieb ... ... 一二六
Chloranthus inconspicuus Sw. ... ... 一二六
Chrysanthemum indicum L... ... ... 四九一
Chrysanthemum sinense Sab. ... ... 五〇三
Chrysanthemum coronarium L. ... ... 五〇八
Chrysanthemum cinerariifolium Bocc... 五一〇
Cimicifuga foetida L. Var. simplex Huth 一八七

Cinchona succirubra Pav ... ... 四六七
Cinnamomum Camphora Nees... ... 二〇六
Cinnamomum Cassia Bl. ... ... 二〇七
Cinnamomum Loureirii Nees ... ... 二〇九
Cissus japonica Willd 三三〇
Citrus nobilis Lour ... 二九七
Citrus nobilis Lour Var. microcarpa Hassk ... ... 二九三
Citrus Aurantium L. 二九四
Citrus medica L. Var. acida Hook... ... 二九八
Citrullus Colocynthis Schrad... ... ... 四八二
Citrullus vulgaris Schrad... ... ... 四八二
Citrus bigaradia Duham... ... ... 二九六
Citrus medica L. Var. Limonum Hook ... 二九八
Cicuta Virosa L. ... 三八二
ClavicepsPurpureaJul. .....九
Cladrastis amurensis B. et H. Var floribunda maxim ... 二六二
Clematis heracleifolia Dc. ... ... 一八五
Clematis Paniculata Thunb ... ... 一八九
Clematis florida Thunb 一九〇
Clematis apiifolia Dc. 一九四
Clematis Patens Morr. et Dene. ... ... 一八三
Clerodendron tricotomum Thunb... ... 四二五
Clethra barbinervis S. et Z. ... ... 三八六
Cocculus Thunbergii Dc. ... ... 一九九
CochleariaarmoraciaL. 二一七
Cocos nucifera L. ... 七二
Coffea arabica L. ... 四六九
Coix lacryma L. ... 六一
Coix agrestis Lour... 五六
Colocasia antiquorum Schott ... ... 七五
Commelina Communis L... ... ... 七九

B

Bacillus vulgaris mig. 一
Balsamodendron Myrrha Nees ... ... 三〇〇
Bambusa Veitchii carr. 六四
Begonia Evansiana Andr. ... ... 三五五
Beggiatoa alba ... 一
Belamcanda punctata Moench. ... ... 一一二
Bellis perennis L... 四九五
Benincasa cerifera Savi 四八四
Berberia Thunbergii DC. ... ... 一九九
Berberis nepaleniss Spreng... ... ... 一九八
Berchemia racemosa S. et Z... ... ... 三二七
Beta vulgaris L. ... 一六五
Beta vulgaris L. Var. Rapa Dmrt... ... 一六四
Betula alba L. Var. vulgaris DC... ... 一〇三
Bidens tripartita L. 五一二
Bletilla hyacinthina Rchb f... ... ... 一二一
Blechnum Spicant Roth ... ... 二〇
Boehmeria japonica Miq. Var. tricuspis Hce ... ... 一五〇
Boehmeria nivea Bl. 一五二
Boschniakia glabra C. A. Mey ... ... 四六〇
Boswellia Carteri Bird 三〇〇
Brassica campestris L... ... ... 二一三
Brassica campestris L. 二一五
Brassica cernua (Thunb) ... ... 二一六
Brasenia purpurea Casp ... ... 一七八
Brassica oleracea L. 二二〇
Briza maxima L. 五四
Broussonetia Kasinoki Sieb... ... ... 一四三
Broussonetia papyrifera vent ... ... 一四四
Buckleya, Quadriala B. et H. ... ... 一五三
Buddlea japonica Hemse ... ... 四〇九

C

Cacalia adenostyloides Fr. et Sav. ... ... 五〇〇
Caesalpinia Sappan L. 二七五
Caesalpinia sepiaria Roxb ... ... 二七三
Calanthe discolor linde 一一八
Calamus rotang L. ... 七〇
Calendula arvensis L. 五〇五
Callicarpa japonica Thunb ... ... 四二八
Calamintha gracilis Benth ... ... 四三六
Calamintha chinensis Benth ... ... 四三四
Callistephus chinensis Nees ... ... 四九四
Calycanthus praecox L. 二〇四
Caltha palustris L. Var sibirica Rge... ... 一八二
Calystegia Sepium R. Br. ... ... 四二一
Campanula punctata lam ... ... 四八九
Canavallia eniformis DC. ... ... 二八〇
Canna indica L. ... 一一七
Cannabis Sativa L. ... 一四二
Capsicum Longum L. 四四五
Capsella Bursa Pastoris Moench. ... 二一九
Carex dispalatha Boott 六五
Cardamine Hirsuta L. Var. Silvatica Link 二一九
Cardiandra alternifolia, S. et Z... ... ... 二三〇
Carica Papaya L. ... 三五五
Carludovica palmata R. et P. ... ... 七三
Carpesium cernuum L... ... ... 五〇一
Carpinus japonica Bl. 一三〇
Carum petroselinum Benth ... ... 三七九
Carthamus tinctorius L... ... ... 五二一
Caryopteris Mastacanthus Schauer ... 四二六
Caryopteris divaricata Maxim... ... ... 四二五
Cassia mimosoides L... 二六六
Cassia acutifolia Del... 二七六

Andromeda japonica Thunb ... ... 三八九
Anemone nikoensis Maxim... ... ... 一八一
Ancilema Keisak Hassk ... ... 七九
Anemone cernua Thunb ... ... 一八二
Anemone japonica S. et. Z. ... ... 一八六
Anemone Hepatica L. 一八八
Anemone Flaccida Fr. Schm ... ... 一九二
Anona squamosa L. 二〇四
Antirrhinum majus L. 四五四
Anthemis nobilis L. 五二四
Apium graveolens L. 三七九
Aquilegia flabellata S. et Z. ... ... 一九三
Aquilaria agallocha Roxb. ... ... 三五八
Aralia Cordata Thunb 三七一
Aralia sinensis L... 三七三
Aralia papyrifera Hook ... ... 三七三
Aralia repens Natsum 三七四
Arachis hypogaea L. 二八一
Arctium Lappa L. 五〇六
Arctostaphylos uva urs Spr. ... ... 三九〇
Ardisia Crenata Sims 三九六
Ardisia japonica Bl. 三九六
Arethusa japonica A. Gr. ... ... 一二〇
Arenga saccarifera Labill ... ... 七〇
Areca catechu L. ... 七二
Arisaema japonicum Bl... ... ... 七七
Aristolochia kaempferi Willd. ... ... 一五五
Arisaema Thunbergii Bl. ... ... 七三
Aristolochia debilis S. et Z. ... ... 一五四
Arnica montana L... 四九二
Arnica alpina olin... 四九三
Artemisia annua L... 五〇六
Artemisis cina Berg. 五一一
Artemisia Vulgaris L. Var. indica Maxim... ... ... 五二三

Artemisia absinthium L. 五一六
Artemisia japonica Thunb ... ... 四九六
Arthraxon Ciliare Beauv ... ... 五四
Artocarpus integrifolia, Forst... ... 一四八
Artocarpus incisa Forst ... ... 一四八
Asarum Blumei Duch 一五五
Asarum caulescens Miq ... ... 一五六
Asparagus officinals L. 八七
Asparagus lucidus Lindl. ... ... 九一
Aspergillus Oryzae Wehm ... ... 八
Asperula Odorata L. 四六九
Aspidistra elatior Bl. 一〇二
Aspidium decursive-pinnatum kze. ... 一九
Asplenium japonicum Thunb ... ... 二〇
Astilbe chinensis Maxim. Var japonica Maxim... 二二七
Aster trinervius Roxb. Var. Adustus Maxim... ... ... 五〇七
Aster tataricus L... 五〇八
Aster scaber Thunb. 五〇九
Asteromaea indica Bl. ... ... 五二二
Aster trinervius Roxb Var. holophyllus Maxim... ... ... 五〇九
Astilbe chinensis Maxim. Var. japonica Maxim ... 二三二
Astragalus gummifer Labill ... ... 二八六
Atractylis ovata Thunb ... ... 四九六
Atropa belladonna L. 四四八
Aucuba japonica Thunb ... ... 三八四
Avena Sativa L... 五二
Averrhoa Carambola L.... ... ... 二八九
Azolla pinnata R. Br. Var africana, Baker ... ... 二五

A

Abies balsamea mill... 三四
Abies firma S. et Z.... 四二
Abrus precatorius L... 二七七
Abutilon theophrasti Medic ... ... 三三四
Abutilon megapotamicum St. Hil. et Naud 三三四
Acacia catechu willd. 二六〇
Acacia senegal willd. 二六一
Acanthopanax spinosum mip ... ... 三七一
Acalypha australis L. 三〇五
Acanthopanax ricinifolium S. et Z. ... 三七五
Acer palmatum Thunb 三二二
Acer saccharinum L. 三二三
Acer purpurascens Fr. et sav ... ... 三二二
Achyranthes bidentata B. l. var. japonica miq ... ... 一六七
Achillea millefolium L... ... ... 五一〇
Achillea sibirica Ledeb 五一七
Acorus calan us L. ... 七五
Acorus gramineus Ait 七六
Aconitum fischeri Reich ... ... 一九〇
Actinidia polygama Miq ... ... 三四一
Actinostem ma racemosum Maxim ... 四八一
Actinidia arguta pl.... 三四〇
Adansonia digitata L. 三三八
Adenophora remotiflora Miq ... ... 四八八
Adenophora verticillata Fisch. var. verticillata Fr. et sav... 四八八
Adiantum pedatum L. 一八
Adonis davurica Ledeb 一九一
Aeginetia indica Roxb 四六〇
Aegle sepiaria Dc. ... 二九二
Aesculus turbinata Bl. 三二三
Aeschynomene indica L... ... ... 二六八
Agave Americana L. 一〇八
Agrimonia pilosa Ledeb ... ... 二四二
Ainsliaea dissecta Fr. et Sav ... ... 四九四

Ainsliaea apiculata Sch. Bip. ... ... 五〇二
Ajuga decumbens Thunb ... ... 四三九
Ajuga pygmaea A. Gr. 四三五
Akebia quinata Dene. 一九四
Akebia lobata Dene... 一九五
Albizzia julibrissin Boir ... ... 二八二
Aldrovanda vesiculosa L... ... ... 二二四
Aleurites Cordata Muell Arq. ... ... 三〇五
Alkanna tinctoria Tausch... ... ... 四二三
Allium ledebourianum Schult ... ... 八二
Allium Opa L... ... 九八
Allium odorum L. ... 一〇〇
Allium scorodoprasum L... ... ... 一〇一
Allium fistulosum L... 一〇一
Allium nipponicum Fr. et Sav ... ... 一〇二
Allium bakeri Rge ... 一〇四
Alliarla wasabl prante 二二〇
Alnus japonica S. et Z. 一三二
Alnus firma S. et Z... 一三二
Aloe vera L... ... 一〇五
Alopecurus fulvus L. 五七
Alpiniachinensis Roscoe ... ... 一一五
Althaea rosea Car. ... 三三五
Althaea officinalis L. 三三三
Amarantus blitum L. 一六六
Amarantus gangeticus L... ... ... 一六八
Ambulia sessiliflora H. B. n. ... ... 四五三
Amelanchier asiatica C. Kock ... ... 二四九
Ammobium alatum R. Br. ... ... 五〇〇
Ampelopsis heterophylla S. et Z. ... 三三〇
Ananas sativus Lindl. 七八
Anaphalis yedoensis Matsum ... ... 五〇一
Andromeda nana Mat. 三九四
Andropogon nardus L. Var. Goeringii Hack ... ... 五〇

中華民國九年七月初版

（實用植物圖說全一冊）

定價大洋二元
（外埠酌加運費郵費）

譯著者　恩縣孫雲臺
訂正者　奉化江起鯤
校閱者　奉化胡朝陽周葆初
同校者　奉化莊紀慶
發行及印刷者　新學會社

總發行所　上海棋盤街交通路　新學會社
分發行所　甯波日新街濟南后宰門　新學會社
代售處　奉天科學儀器館　南京共和書局
廣東共和書局　北京鄔生記
各省大書坊

新學會社版權所有

上海新學會社發行

各種植物類書

植物表解	胡朝陽譯	一冊二角
顯花植物分類檢索表	王本祥譯	一冊一角五分
植物生理學	吳棫譯	一冊四角
花卉栽培法	羅適丹編	一冊三角五分
中西花卉盆栽法	胡朝陽編	一冊八角
實用果樹園藝學	張賡韶潘繼文合譯	一冊一元六角五分

上海新學會社發行

影印康熙內府藏本耕織圖

（冊頁）每卷一元五角

（屏畫）每堂六元五角

此乃耕織圖中之一幅練絲圖也。上面題的是一首詩。叫做『連郤煮繭香。解事誰家娘。盈盈意媚籠。拍拍手探湯。上盆好顏色。轉軸頭緒長。晚來得少休。女伴語隔牆。』你看那何等的整暇。何等的風趣。而且圖中的布景。形形色色。又是幽雅絕倫底。圖凡四十六幅。耕織各半。所以屏畫要拆開買也可。使得這種物事。即使自己沒的地方來掛。買了送送人。當作禮物。豈不是無上的妙品麼？諸君請仔細想想看……罷。